

Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

70162

✠ THEOPHRASTI ✠
SPARSE DE PLANTIS
SENTENTIAE IN CONTINUATAM
SERIEM AD PROPRIA CAPITA REVO-
CATAE, NOMINAQ. SECVNDVM
LITERARVM ORDINEM DISPOSITA,
Per Czsarem Odonum Philosophum, ac Medicum
Bononix practicam Medicinæ
ordinariam profitentem.

ACCESSERVNT DISPVATIONES
duæ, altera an Rheubarbarum in propria
mole, & substantia exhibitum soluat,
& aperiat magis, quàm ex infu-
sione propinatum.
Altera an in quo vis humore euacuando sit expectanda
concoctio, nunc primum ab eodem
autore in lucem editæ.

Ex Legato J.

Laurentij de Pubeij



Bib. Sec. Coll. Rom. Soc. J.



BONONIAE

Apud Alexandrum Benaccium.

M D L X I.

THE
 OFFICE OF THE
 SECRETARY OF THE
 TREASURY
 DEPARTMENT
 OF THE
 UNITED STATES
 OF AMERICA
 WASHINGTON
 D. C.
 1864

RECEIVED
 OF THE
 SECRETARY OF THE
 TREASURY
 DEPARTMENT
 OF THE
 UNITED STATES
 OF AMERICA
 WASHINGTON
 D. C.
 1864



BOND
 OF THE
 UNITED STATES
 OF AMERICA
 WASHINGTON
 D. C.
 1864

REVERENDISSIMO AC
 AMPLISSIMO BONARVM
 ARTIVM PATRONO, PETRO
 Donato Cassio Narniensi Epif-
 copo, Bononiæ moderato
 ri prudentissimo.

CAESAR O DONVS

Salutem, & Felicitatem.



ECREVERAM IAM
 dudum ego Reuerendissi
 me Præsul, ac patrone op-
 time, cum plurimum me
 tuis officijs deuinctum sē-
 sissem (vt aliquod non in
 grati animi erga te mei

specimen haberes) annotationes nostras in
 Theophrastum de plantis, nec non imagines
 herbarum ipsas à nobis olim longo studio de-
 lineatas, nomini tuo dicatas in lucem edere;
 Quod meum institutum dum aliquādo cum
 iuris peritorum Consultissimo Ioanne Ange-
 lo Papio tuarum laudum decātorum indefes-
 so communicassem; is me non modo ab hoc
 munere non est dehortatus, verum acutius
 etiam currenti (quod aiunt) mihi calcar addi-

A ij di;

dit, atq; ea potissimum ratione tibi præceteris labor hic iure optimo dicandus fuit, quod Theophrastus hic noster, qui olim tam concisas, & dispersas habebat sententias, ut vix posset integrâ vnius plantæ historia illius à quoquam haberi nisi vniuersum ipsius volumen euolueretur; iam nostra opera in vnum collectus, ac omnibus modis integer redditus, ex eorum (nifallor) numero sit, qui non paruum sit rei herbariæ studiosis vtilitatem allaturus. Cum autē eo sis ingenio præditus, atq; eâ animi propensione in omnium commoda affectus, ut nihil aliud vnquam, aut agere, aut cogitare videaris, quàm vt omni quo potes officio, liberalitate gregem tuæ creditum fidei, prudentiæ, & charitati fouea s, & omnibus modis iuues. Cur sub tuo patrocinio illū emittere non debebam? Atq; vtinam potuissem ex animi sententia absolutum opus hoc tibi præstare, nec mihi Artificum eorum inopia, quibus ad sculpendas imagines vti cogebam, nunc id exequendi facultatem abstulisset, nam id tibi fortè lōgè gratius, alijs vtilius, mihi certè iucundius contigisset. Cæterum, si hæc tibi qualia cunq; sint displicuisse nō senserimus, propediem, & eadem absolutiora, & alia nonnulla fortassè nō ingrata offeremus; Interim munusculum hoc boni consule.

CHRISTVS OPT. MAX. talem te no

bis, & Christianæ Reipublicæ officiosissimū,
 & beneficentissimum Patronum diu seruet
 incolumem, vt qualis nomine diceris, & re
 ipsa es PETRVS DONATVS Calixtus.
 Ita nobis, vt facis longo tempore ad sis, & fa-
 ueas. Vale Bononiæ Calen. Nouemb.

M D L X I.

AD EVNDEM REVERENDISS.^{um}

Hexastichum eiusdem

Caesaris Odonis

Petrus petra fuit, naturam tu quoq; petræ

Petrus habes; quam nos iam super ædifices

Donatus Populo es fatali munere diuim

Cæsius es, Pallas cæsia, & ipsa fuit

Omnia cur dubitet tam non felicia firmo,

Munifico, Docto, Felsina recta Duce?

CANDIDO LECTORI.



MICE Lector si quid
commodi (quod maxime
intendebamus, dum hunc
laborem suscepimus) stu-
dijs tuis ex hisce lucubra-
tionibus accessisse sence-
ris, id nobis futurum sci-

to gratissimum, sin minus conatum, atq;
animum nostrum boni consule, propediem
tibi fortasse vtiliora, & gratiora allaturum.
Interim memento duo, quæ passim scribun-
tur in margine elementa h. & c. Primum qui-
dem historia Theophrasti. c. vero de causis
libros tibi indicare, notulas vero additas eo-
rum capita fideliter etiam commonstrare.
Vale.

IOANNIS BAPTISTAE

Morelli Mantuani ad Lectorem.

Eccc Theophrasti digestam ex ordine syluam

Casaris ingenio Candide Lector habes.

Inunc, & flores & collige sedulus herbas.

Hoc duce per certas est uia tuta notas.

SPARSAE THEOPHRASTI
DE PLANTIS SENTENTIAE
INCONTINUATAM SERIEM

redacta, Capitaque secundum Elementorum ordinem disposita.

PER CAESAREM ODOVVM PHILOSOPHV

ac Medicum Bononiae, simplicia & practicam Medicinam,
ordinariam publice proficientem.



BIETI^a utrinque miro ordine inuicem respondent rami.^b Culum ea nullum patitur, sed eo deterior redditur.^c Proceras est, & longo caudice, cui cortex tunicis multiplex.^d Fissilis est.^e Et una tantum radice constat, eaq; neruosa.^f Mas nodosior.^g Ad longitudinem tantum apta potissimum augeri.^h Sylvestris perpetuo uiuet.ⁱ Folia habet rara, eadem multifida, & quasi serrata.^k Sylvestris flore est bicolore, et pleno.^l Ex semine bene nascitur.^m Paulo ante solstitium floret, flos croci colore, alijs pulcher, fructum post Vergiliarum occasum dimittit, germinationem intermittit, terq; turget, terq; germina edit, ideoq; ter squamosa dicitur, eiusque germinationes conspicuae maxime, genicula inuersus rectos porriguntur, ramiq; conditi ex aequo spectantur.ⁿ amentum habet, fructifera est, Sylvestris modica radice descendere uidetur, in profundum radicem non agit, ob id accidit, ut flatu radicitus euertatur, ut Archades uo-

b.h.1.6.

c.h.1.7.

d.h.1.8:

e.h.1.9.

f.h.1.13

g.h.1.14

h.h.1.15

i.h.1.16

k.h.1.21

l.h.2.2.

idem. 3.

4.h.

m.h.3.6.

n.h.3.7.

B lune

b. 3. 8. 4

lunt Idæi uero abietem altius quàm robur radice descen-
dere uolunt, uerum simpliciori meatuq; rectiori. Cui pe-
culiare quoddã euenit cum .n. præcisã, uel aliquo pacto
diminuta afflatu fuerit circa leuã partem sui caudicis (ha-
bet enim quadamtenus leuem enodem similem, ac etiam
æquiparandam nauiculæ) mox circumnascitur paulo ex-
celsitate inferius, quod quidem circumactionem, alij circũ-
agnationẽ appellane, colore nigrum duritia ultra modum
ex quo crateres Archades, conficiunt, crassitudo talis,
qualem arborem esse contigerit, quo scilicet robustior ue-
getiorq; uel plenior, eo crassior illud quoque peculiare
ac eadem in re abieti accidit, cum enim ramis omnibus
ablatis, cacumen decideris, mox emoritur, cum uero infe-
riora proxima leui illi parti præcideris, quod restat ui-
uit, & agnatio quam modo dixi, circum id fieri assolet,
scilicet quia uegetius, ac uiridius est, si quidem è latere
nunquam recrescit, neque ab implantigera abies assurgit.

b. 3. 10. 6

amplius Pinosa, quam Pinus est, & Picca, ligno è ner-
uoso, molli, leuiq; nodisq; durioribus, quàm Pino, sed

h. 4. 1. c

paucioribus. In Archadia circa Crãnã uocatã loco quo
dã concauo, et silente a uentis, quẽ nunquam solẽ attingere
aiunt, abietesq; plurimum tum longitudine tum crassitudine
cæteris præstant, non tamen pariter frequentes, neque
pulchræ cernuntur, sicut etiam Pinastri, quæ locis um-
brosis enascantur, quamobrẽ ad lauitiora operum, ut fores,
cæteraq; magnificiẽda hisce minus utitur, sed ad nauigla

domos

domosq; duntaxat, quippe trabes, & antennas ex his opti-
mas faciunt, atque etiam malos præstantissima longitudi-
ne, sed non similiter ualidas, atque ex ijs, quæ sole expo-
sitæ starent, sed ex breuitate densiores illis, robustioresq;
montium cacuminibus nascitur, locisq; algentibus, sed
non in excelsum, sicut etiam circa Cyllenum promonto-
rium euenit.^a In Asia parte superiori Syriæ itinere a^{h.4.4. a}
mari quinque dierum nasci negant.^b Versus septemtrio-^{h.4.6. b}
nem nascitur, frigidumq; locum amat, in ponto non ori-
tur.^c Marina nostri tractus ignotior, & maxime pro-^{h.4.7. c}
pria ratione locorum, terrena quidem spectatur, nascitur
uerò hæc supra lapides, atque fictilia caret radicibus, sed
modo patellarum adhaeret, cui folium carnosum oblongius,
crassumq; quam quercui frequens, nec leguminū siliquis ab-
simile, concavum intus, nec quicquam intra se continens
color accedens ad purpuram forma tota erecta, & multi-
caulis, cum ambæ sint simplicior tamen abies quam quer-
cus, ramis longis, rectis, solutisq;, cui magnitudo cubi-
talis, parum altior, maior tamen quam quercus.^d In ger-^{h.4.18. d}
minatione abietis cum etiam cortice turgido est mense Fe-
bruario, uel martio, si quis detraxerit statim moritur
hyemē diutius tolerat.^e ab ulcere ampliori altioriq; nihil^{h.4.19. e}
offenditur.^f cuius materies primo turgore odoratio^{h.5.1. f}
ditur, uere cæditur, tunc enim germinat quam cædi oport-
tere cū germinare incipit, quidam expedire conantur, quia
serotinarum magis caesura serior.^g abies a Pino differt^{h.5.2. g}

quia neruacior, atq; rigidior, ita ut utrunq; è contrario habeant neruos ualidos, carnē mollem et raram, qua de causa altera grauis altera leuis est altera teda referta est, altera nullā ingerit tedam, ob id et albtior est, ad hęc Pino rami plures abiecti longe duriores, uel potius et omnium ramorum durissimi ambabus spissi, et cornu sanè imitantes colore flauo, et tede similes, qui cum abscissi fuerint tam Pino, quàm abiecti humor defluit, sed biecti largior est, præterea tunica multiplici abies modo cape, assidue nanque tunica conspecta subditam aliam gerit, atque ex his tota constat, quapropter qui ramos dolant, singulatim pleneq; auferre conantur, nam si ita auferantur ramus ualidus relinquetur, hunc enim in modum iclus illo demptio fit est etiam excelsior, atque procerior abies, ideoque antennas malosq; ex ea facere assolent, habet uenas, neruosq; omniū nobilissimos, crescit hæc primū in excelsum quoad libere solem accipiat, neq; ramus ullus neq; germinatio lateris, neq; crassitudo interim faciliatur, post in profundū latumq; incrementa capeßit, atq; ita ramorū exortus et laterales germinationes sequuntur quadripartitas appellāt, quibus in utraq; partē medullæ bini uenarum cursus naturæ contrariæ pertendunt, atque per utrunque cursum adigunt iclus cursibus contrarios inferentes, dum in utranq; partē medullæ securis remeat, ita enim euentat necesse est, natura uenarū ratione, quod ad opera uehementer probant; materiē enim spississimam præstant, et ægidem gignere icla solent, bipartita

partite illæ cunctus uenarum tantum in utranque partem in-
 dulle gerunt, eosdemq; inuicem contrarios, habent, ut &
 securis duplex adigi debeat simplex per utrunq; cursum ictu
 contrario, mollem hanc materiam refert, sed in opere pes-
 simam quoniam maiorem in modum peruertitur, simpli-
 ces uocant, quæ unum duntaxat uenarum habeant cur-
 sum. His itidem securis utraque ex parte medullæ adi-
 gitur, laxiorem natura materiem hanc esse affirmant,
 sed a peruersione tutissimam.^a Syluestris rara corpore,
 tectisq; idonea.^b a tere dine minusquàm Pinus corrodi po-
 test amara enim tradunt etiam abietis, cum germinat decor-
 ticatam materiem aquis in offensam durare nimirum posse:
 patuit id apud phenum Archadiæ cum obstructis fauci-
 bus campus in lacum redundauit, cum enim ductis ponti-
 bus ex abiete, cum amplius extumesceret aqua, alijs super
 alijs fabricatis, postquàm extrusis obturamentis unda eru-
 pit discescitq; uniuersa materies incorrupta comperta, sed
 forte hoc casuque innotuit.^c cuius nodus difficillimus con-
 stat, habet medullam conspectam, eius namque orbiculo-
 rum compositio corticea inspectatur.^d materiet eius uniuersa
 sæ, pars durissima neruus rarissima medulla est,^e constat
 aptissimam esse nauibus, triremes enim atque longa uauig-
 gia ex ea lenitatis gratta faciunt, ad plurima penè usum
 præstat, quippe quæ ad tabellas etiam pictorias accomo-
 dari possit, ædificijs optima, quæ uetustissima, modo im-
 munis carie sit, operibus enim omnibus ædificatorijs, ut ita
 dixerim

dixerim, aptissima est, sed nauibus propter flexum humi-
 dior capiatur necesse est, nam ad congelationem siccior
 aptior est, domibus & nauibus plerisque alijs accommoda-
 b. 5. 9. ^a tissima est: pluraq; abies expedit quam Pinus, ^a in latino
 abies agro, tum magnitudine, tum pulchritudine inter o-
 mnes Italicas præstat; tamen ad earum rationem; quas
 Corsica gignit; pro nullo certe habetur, montuosa abie-
 b. 9. 1. ^b tem ferunt. ^b humor eius in lachrymæ modum gignitur.
 b. 9. 2. ^c in abiete cum lignis degustatis uulnus intulerint, humor
 e. 1. 2. ^d copiosior confluit. ^d ex abietum uirgis tenerrimis ului radi-
 ces efficere non potest quis, neque adultas transferre.
 1. 26. ^e coloris plurimum sortitur, eo quod in locis argentibus ua-
 2. 9. ^f leat perdurare. ^f opacis locis gaudet. ^g breuem non habet ut
 2. 16. ^g tam, quia directa erectaq; ^h in abiete hyphear, & stelis
 2. 23. ⁱ nascuntur. ⁱ in abiete nascentia ualidiora esse consentaneū
 2. 24. ^k est, plus enim alimenti, & pinguius subministrat. ^k detra-
 3. 4. ^l eta medulla uiuere amplius non potest.

b. 1. 15. ^l **A** BROTANVM ^l ex suffruticum genere per
 b. 6. 1. ^m petuo uiuet. ^m inter sureculosa urbana, & coronaria
 b. 6. 7. ⁿ herba est. ⁿ radice potius et auulsione, quam semine, ut ferè
 b. 6. 7. ^o omnes aliæ plantæ, germinat. ^o semine quoque abundat,
 nec sine odore est, sed id radices rectas, aliasq; agit, estq;
 ueluti unistris, crassa scilicet illa radice reliquis uerò de
 eo exeuntibus spargitur, quod non serpyllo, nec samfuco,
 a. 1. 4. ^p nec syssimbrio, nec Helenio datum est. ^p Item lignosum est,
 uerum spissitate, acoreq; suo seruari aliquantulum tempo-

ris potest, modo Hedera. ^a mirandum profecto appareat. ^{c.4.3.}
 cum enim calidum sit loca aprica prosequitur. ^b ex corona. ^{c.6.22.}
 riorum numero acrem reddit odorem, in eo, cum agreste ^{c.6.24.}
 sit, acredo, atq; synceritas tedio admodum est.

ABSINTHIUM ^d, succo amaro est. ^e loca al ^{b.1.19.}
Agentia quatit. ^f quāvis amarū, et male olens utile pla ^{b.4.6.}
 nē sentitur. ^g Ponti absinthio pecora pascentia pinguita; ^{b.7.9.} f
 et pulchriora redduntur, alibi uesci negant. ^h cultu effemina ^{b.9.18.} g
 tur, et hebetatur, infirmioribusq; fit uiribus, ⁱ et aquosius ^{c.3.1.} h
 redditur. ⁱ saporem habet amarum a natura ingentum. ^{c.6.4.}

CANIS ^h inter arbores non numeratur at in ge ^{b.1.16.}
Anere matericæ humilis et spinosus est, et ei loco folij
 spina oritur, ⁱ folijs uerò constat aculeatis. ^m et caput ma- ^{b.6.1.1}
 gnum habet uermilagini simile. ^{9.13.m}

CANACEVM ⁿ genus est magna ex par ^{b.6.3.}
Ate illorum, quæ folio constant aculeato.

CARN ^o folia nō habet aculeata. ^p et aspectu ^{b.6.3. o}
Aeneco urbano similis ē, colore flauicās. succo pinguis. ^{b.6.4. p}

CARNICA ^q rigua Ederæ genus est. ^{b.3.18. q}

CER ^r et in monte, et in plano nascitur, quam in ^{b.3.4. r}
Amōte Caprinum, in plano gallicam uocant. quanquā,
 alij aliter distinguunt, et genus diuersum Aceris, et Ca-
 print faciunt. ^s uerum eam non florere Macedoniæ inco- ^{b.3.6. s}
 lā arbitrantur. ^t et æstate semen reddit. ^u audluq; facilli- ^{b.3.6. t}
 ma est. ^x et superficiei aliquatenus gaudet. ^v cuius genera ^{b.3.7. u}
 lij bina (ut retulimus) alij terna statuunt, unum, quod ^{b.3.7. x}
 commun ^{b.3.11. v}

a. 2. 2. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.
 communi generis nomine acerem uocant, secundum Capri-
 num, terulum Lectirotariam: uidelicet, ut Stagiritæ di-
 stinguere solent; Caprinus uero ab Acere distat, quod
 aceri candida, atque neruata materia, Caprino autem
 flaua crispasque; ampla ambabus, platano infundendo similis;
 uenis enim in longum fluctuat, sed gracilior, macilentior;
 mollior, longior. omnia eius fissa in acutum compressa ab-
 scinduntur. Hac ita semi fissa, sed summum potius præfiss-
 sa multincruiâ minus sunt, quàm pro sua magnitudine esse
 debeant. cortice paulo Schariori, quàm tilia uelutitur, sub
 liuido, crasso superioriâ picea, inflectiq; contumaci. Ra-
 dices paucas, & sublimes, crispasque ferè magna ex parte
 tam flaua, quàm candida gerit, Riguus potissimò nasci-
 tur, ut Idei uolunt, inuentuque rara; de flore nasci aiunt
 fructum baud ualde oblongum, & paliuro similem: uerum
 oblongiorem assignant. At uerò olympi incolæ Caprinum
 montanum potius esse uolunt. Acerem planis etiam nasci,
 atque nascentem in monte flauam gratè coloratam, cri-
 spani, & solidam esse, qua ad opera lautiora utuntur;
 campestem uero candidam, rariorem corpore, minus-
 que crispam, quàm nonnulli gallicam, non acerem uo-
 cant; marisque materiem crispiorē esse atque contor-
 tam & planis eam potius nasci, germinareque maturius,
 cæditur uerò aliquando post messē, aliquando post
 uindemiam & arcturum. & inter spissas arbores nume-
 ratur, nec non lectis, iugisque iumentorum, atque in to-

tum operum sumptuosioribus cæditur.

^a Aconitum nascitur in Creta, zacyntho, sed plurimum, optimumq; in Heraclia pontica constat id folio in tubaceo, radice tum specie, tum colore nuci proxima: uim illam mortiferam in hanc esse; folium et fructum nihil nocere affirmant fructus herbae est, non humilis matertia: herba ea brevis est; et nihil superuacui habet, sed frumēto similis, semē nō spicēū, nascitur ubiq; et nō in Aconis solum, à quibus habet appellationem: is autem uicus est Pertandinorum: amat autem loca potissimum saxosa, pascitur ea neq; pecus, neq; ullum animal, confici ad afficiendum modo quodam enarrant, nō esse quēq; quamobrem medicos quoniam componere nesciant pro putrefactorio uti, aliisq; quibusdam de causis epotum nihil penitus posse afficere, neq; ex uino, neq; ex mulso; componi autem ita ferunt, ut certis occidere temporibus possit, uidelicet, bimēstri, trimēstri, semēstri, anno completo, nonnullum etiā biennio, pessimē illos de uitā discedere uolunt, qui plurimum temporis resistere possint; paulatim enim tabescat corpus, et languore pereat diuturno esse necesse; facillimē illos, qui confestum obeunt, remedium nusquam esse compertum, sed falsò dici quoddam aliud resistens illi haberi; non enim herba, sed melle, et mero, et quibusdam eiusmodi seruari aliquos potuisse, atq; id rarò factum, summaq; difficultate, sed inutile est iis, qui præpara-

THEOPHR DE PLANTIS.

re ignorent , nec licitum , possidere , sed capitalem pœnam institutam : Temporis differentiam pro collectus ratione sequi autumant , mortes collectuum temporibus compares euenire .

a. h. 1. 16. ^a *Acorna inter arbores non est , sed in genere materia humilis , & spinosa , habet enim spinas omnino pro foliis , ueluti Acanus.*

b. h. 1. 15. ^b *Acuta spina ex syluestribus semper uiret . & in monte , & in plano nascitur ^d & in eunte uere germinat.*

c. h. 7. 13. ^c *Adiantum id est capilli ueneris folium in aqua nunquam madescit , nec quicquam ad hæsisse humoris constat , unde & nomen herba accepit ; cuius genera duo sunt , candidum , atq; nigrum , ambo ad defluum capillum utilia , oleo trita nascuntur maximè locis humidis .*

f. h. 6. 4. ^f *Acraria natura spinosa est , & non aculeatis foliis constat .*

g. h. 3. 10. ^g *Aesculus genus quercus est , quæ glandem amarā producit .*

h. h. 1. 7. ^h *Albucus ancipi , ut Scylla , & Palma , uitam agit ,*

i. h. 6. 2. ⁱ *& nascitur propè mare ^l caulem habet similem ferulæ*

k. h. 7. 12. ^k *folium prælongum , angustum , lentumq; leuiter ^l Ver-*

l. h. 7. 12. ^l *mis in eo gignitur , qui in aliud animal uolatile , floridumq; transfiguratur , quod cum herba florere incipit , eroso statim operculo euolat , peculiare is præ æteris leuibus*

leuius caulium generibus sortiri uidetur, quoniam cum angusto corpore sit, in ramulos superne spargatur: per multa ad cibum affert utilia, quippe albucum tostum in cinere manditur, & semen torrefactum usui est, sed radix tusa cum ficu in usu maxime omnium uenit, & utilitatis plurimum autore Hesiodo præbet: & cui capitum sit radice, uiuacius maiorem in modum sentitur.

^a Alga per multa habet folia similia gladiolo, ^{4. h. 4. 12.}
 phleo, & butomo ^b cuius plura sunt genera; quoddam ^{6. h. 4. 7.}
 enim genus folio lato, colore herbido est, quod por-
 rum quidam appellant, alii cingulum, radice birta,
 extrinsecus squamata, intrinsecus longa admodum,
 crassaque plane cepigethys non absimilis. Alud folio ^{DI. 1. 1. 1.}
 crinito, terra ipsi adhærens, sæpeque a mari tantum al-
 lutur. Alterum altius degit, nascitur quidem in ma-
 ri extero circa Herculis columnas, mira magnitudine,
 latitudineque (ut ferunt amplius) quam ut manu appre-
 hendi possit; fertur hoc ad mare internum fluxu ex-
 trinsecus, porrumque id appellant, annuum esse aiunt,
 & nasci uere desinente, uigere æstate, minui autum-
 no, muerire, atque decidere hyeme: quin & reliqua om-
 nia nascentia deteriora, obscurioraque hyeme fieri, hæc
 itaque ceu terrena circa mare deprehenduntur: Alga
 uero proueniens in alto, quam Spongiarii pelagicam
 deferunt, in Creta insula iuxta terram, super saxa,

plurima, optimaq; prouenit, quia non solum uittas, sed etiam lanas, uestesq; inficiunt, & quandiu recens infectio sit, color longe purpuram præstat: gignitur parte aquilonia tum copiosius, tum melius, ut etiam spongiae, reliqua similia: sunt alia grammebus proxima quippe folio simili, radice geniculata, longa, oblique adhaerente, modo graminis & caule calamaceo, ut gramen, magnitudine alga multo minora. Est aliud bryum dictum folio cetonis herbidum, amplo, nec lactucis dissimile, rugosiori tamen, & ueluti contracto, caret caule, sed ab uno intro plura folia huiusmodi exeunt, & rursus ab alio: nascitur super lapides, siciliaq; iuxta terram, & minore quidem hac ferme traduntur.

- a. h. 1. 16. ^a Ailium inter olera numeratur, cuius folia illico radice exeunt, sicut etiam maiore ex parte aliis oleribus contingit, ut caepa, intubo erratico, & aliis ^b uerum unicaule est. ^c & radice fertur, & facile regerminat, ut etiam caepa. ^d fertur autem ante solstitia, aut paulo post solstitia nucleatim diuisum. Discrimen eorum, quod aliud præcox, aliud serotinum, est enim genus quoddam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit, differunt præterea magnitudine singulari. Cyprum uocatum maxime tale est, quod non decoquit, sed in myrtotis utuntur, mirum quomodo spuma increseat. Quin & illud differentiam facit. quod quaedam non nucleis coaugumentatur: dulcedo autem, & odor,

& crassitudo, eorumq; causa, tempore, cultuq; penè
 uidentur contingere, ut etiam aliorum perfici etiam se-
 mine potest, sed tarde, primo etenim anno caput acci-
 pit porri, sequenti discerni in nucleis incipit, tertio
 redditur perfectum, nec quicquam deterius, sed etiam
 quidam uel deposito melius id existimant: Radicis au-
 tem alij, aut capæ, aut similis ortus fieri solet: ^a alij
 nanq; cum extumuerit, tota intorquetur, & hinc au-
 cta in nucleos rursus discernitur, atq; ex una plura effi-
 ciuntur, dum caput consumatur. Si capæ aliud atq;
 aliud continuo ab radice obducit, ut & bulbis, & scyl-
 la, & eiusmodi omnia: etenim allia, & capæ si non
 euellantur, plura indies fiunt. ^b Viperæ uerò cum aliū
 comedunt, ruta sibi ipsis medentur. Sapor enim in
 alij radice inest peracris.

a. idem. de
 co. 1. 4

b. c. 6. 4

^c Alnus uitam ancipitem agit, & communem, ut
 non solum iuxta flumina, sed etiam alibi nascatur. ^d na-
 scitur & in plano. ^e & tum sterilis, tum fructifera fo-
 rescit. ^f & post fauonium germinare incipit. ^g & licet
 sterilis, & unigena sit natura, corpore recto, ligno
 molli, medullaq; molli, ut uirgæ graciliores totæ con-
 cauentur, folio piri, nisi quod ampliori, neruosioreq;
 cortice scabro, ruffoq; intus, quæ de causâ coria tingit,
 radice summa, nec maiore quam laurus. ^h nascitur in
 aquis, alio loco nullo pacto.

c. h. 1. 7^a

d. h. 3. 4.

e. h. 3. 4.

f. h. 3. 6.

g. h. 3. 14

h. sic etiam
 h. 4. 9.

Amarago non dissimilis Aphacæ est, & uere
 florere

i. h. 7. 11.

THEOPHR. DE PLANTIS.

florere incipit; nec secus hyeme tota, uereq; toto perse
uerat, gustu amara est, unde & nomen accepit.

- a. h. 1. 6. ^a Amerina cultura longe maiori magnitudine red-
ditur quam malua, & beta, & proculdubio arbor ef-
ficitur, cum frutex sit. ^b uerum super fructum ipsum,
b. h. 1. 21. florem insidentem emittit cæterum uirgas paruas st-
cut cornus famina, suo latere profert, & fructificô-
sior est, nodos tum geminatos, tum inuicem congruos
habet.

- c. h. 9. 5. ^c Amomum et Cinamomū, Cinzomū sicut et Cas-
sia fruticē habet nō ampli, sed magnitudine amerinæ,
uerū permultis surculosisq; ramis cōstat, & ipsum de-
cerptū inquinat partes discerni, ei esse præcipua boni-
tatis, quod germinibus proximū fuerit, idq; ad palmi lō-
gitudinem cædi, aut paulo matus: Secundum quod sequi-
tur, quid etiā minus Casura est; Tertium deinde, &
Quartum notatur; Vltimum uerò quod deterrimum,
proximumq; radice; hoc enim minimum corticis habet,
in quo summa gratia est, non in ligno: qua de causa
proferri cacumina solent, quòd corticis plurimum ha-
beant. Quidam sic aiunt: Alij uerò Cinnamomum
fruticosum narrant, eiusq; genera duo, alterum nigrū,
alterum candidum. fertur & fabula quædam. conuul-
sibus enim exire id aiunt, in ijsq; serpentes plurimos
conuersari morsum hominibus mortiferum inferentes,
aduersus quos incolas septis manibus, pedibusq; descē-
dere,

dere, atq; ita legere Cinnamomum, quod cum depor-
tauerint, toto in ternas partes diuiso, quodq; ad solem
forte illi cesserit, id solum relinquere, abeuntesq; fra-
grans sponte illud confestim cernere. Sed hoc planè
fabula est.^a ex Arabia deportatur, & ad unguenta
idoneum.^b Anomum alij ex Media, alij ex India
cum nardo & reliquis omnibus, aut plurimis aduehi
narrant.

^c Amigdala quamuis prius germinet, & prae-
turius, tamen non ante caetera folia dimittit.^d & ei
semen protinus post tegmen ambiens subest.^e sed non
nudum, uerum ligno obductum.^f cuius succi pingues
sunt, ut etiam pini nucis, & aliorum.^g flores foliati
sunt.^h & fructum ex surculis annotinis habet.ⁱ Sata
quoq; exurgere potest.^k & cultu mutatur, si quis pa-
xillū adigat, lachrymamq; defluentem diutius auferat,
reliquumq; cultum impendat.^l & serere longè dis-
tans praeicipiunt.^m fructuum uerò copiosius dari affir-
mant, si caudice palo ferreo infixo, cum penetratum
sit, alium quernum foramini facto adigunt, terraq; oc-
cultant, quod punire nonnulli uocitant, perinde ac si
arbor iniuria lasciuiet: Eam^a ex amara dulcem effici
uolunt, si quis caudice circumfosso, praeferfortatoq;
mensura dodrantali undiq; lachrymam effluentem in
idem defluere sinat, sed hoc tam ad fructificandum,
quàm ad bene fructificandum conferre credendum
est.

^a. Idè frè
dicit in. l. de
c. 1. 2. 1. &
2. 9. c. 3.
14. v. 23.

- a. h. 2. 9. est. ^a fructum autem amittere potest, antequam co-
 b. h. 4. 17. quat. ^b & licet sint arbores, quæ infestantur, amigda-
 c. h. 5. 10. la pēitus sine noxa extitit. ^c Cinerem eius, lixiutumq;
 d. h. 7. 12. aciem præcipue sentimus. ^d & inter arbores potissimū
 e. h. 9. 1. uel sola ante folia flores emittit, uel unā cum folijs. ^e hu-
 mor autem ei in lachrymæ modum gignitur, fert enim
 gumnam, uerum non ex cortice, sed in uase; eam uerò
 f. c. 1. 3. nullus extrahit, nulla enim in re utilis esse potest. ^f in ra-
 mis eius gradibus humiditas magna; ut in oleo, & hac
 g. c. 1. 9. de causa non facile exiccantur. ^g & deterior exigit se
 h. c. 1. 10. mine, quā quæ sata. ^h Sed quoniam uiribus ualet, ali-
 i. c. 1. 15. mentoq; abundat, facile germinat. ⁱ & cum suapte na-
 tura facile affici possit, propensior est ad supergermi-
 nandum, nisi quid siccitatis causa nequeat, aut, nisi fru-
 ctus decerptio proximior sit, quam ut tempus germina-
 re germina ualeat. Igitur si autumnus prolixior fuerit,
 rosas quoq; erumpere posse, & alia generis eiusdem ra-
 tio est. ^k fructus uerò cum flore peruenit, eumq; amig-
 l. c. 1. 25. dala diu retinet. ^l & cum ualida sit, facile suo robore
 m. c. 2. 11. telluris alimentum attrahere potest. ^m amittit autem
 suos fructus maxime antequam maturauerit; hoc uerò
 accidit, aut alicuius interclusi humoris causa, aut quòd
 nexu infirmo fructus dependeat, qui mole grandiuscu-
 la est, ut Amigdalæ, & pira, nam quodlibet hume-
 facere, atq; debilitare eos facile potest, tum etiam fla-
 tus interdum uehementes inuadunt, ut nihil resistere ua-
 leant:

leant: humor autem iactura causa etiam est, nam piri
 atq; amigdale, etiam si non pluat, dummodo aer au-
 strinus, nubilusq; sit, amittunt & flores & primos
 fructus, si continuo post quam defloruere, illud acci-
 derit, sed horum. cæterorumq; similitum ratio in nexu,
 moleq; est: ^a uerum cum sit ex generibus, quæ cum ube ^{d. c.2.16}
 re fructificent, longo tempore durat, nec cito senescit,
 & in grandiori ætate fecundior redditur, ut etiam pi-
 rus, & quercus, uiribus enim detractis, alimentum quoq;
 nimia ubertas detrahitur, atq; ita reliquum pabulum
 percoqui, dispensariq; potest. ^b & quem admodum di- ^{b. c.2.20.}
 ximus amigd. diminutione dulcem ex amara reddi, sic
 etiam neglecta ex dulci redditur amara. ^c solum autem
 gracile ei commodum est, quoniam si altum sit, atq;
 pingue, nimia pabuli ubertate lasciuiens, sterilitate
 afficitur. ^d igitur huic gracile serenum atq; apricum lō ^{d. c.3.7.}
 ge commodius est. ^e stercoratione modica ex amaris
 dulces afficiuntur. ^f damnosæ uerò sunt aliis, quoniam ^{e. d. 3.12}
 uires solidas, & radices habeant numerosa, sunt ta- ^{f. c.3.15}
 men, qui inter uites serendam, censeant, tanquam inno-
 xias, & cibo mediocri contentas, & simul quod matu-
 re fructificent, nec late adumbrent, minime graues.
 Sed hi non recte existimant, umbra enim, & sra fe-
 racitas non tam infestant, quam uires radicum, rapiūt
 enim alimentum amplo discursu, implexuq; enecant.
^g Si uerò eas mutes ex amaris transeunt in dulces, & ^{g. c.3.23.}

THEOPHR. DE PLANTIS.

- triennio post immutantur, etiam dum fructus pariunt,
neq; rigandæ, neq; stercorendæ, neq; purgandæ, præ
terquam aridis, neq; ulla cura tractandæ, ne plus
æquo ualidiores redditæ, fructum in flore amit
tant, quomobrem agrum minus frugalem quærere
assolent, & si post hæc fructus parere non pos
sint, radices resossas, respoliatasq; hybernīs frigori
bus tradunt, & reliqua puniendi genera, quæ retuli
a. c. 4. 2. mus. ^a semina item illarum minus perdurant. ^b & mol
b. c. 5. 25. lia, carnosaq; sunt ^c & adeo in arborē multi sunt fru
c. c. 5. 46. ctus, ut folia cerni non possint. ^d Diminutione uerò
d. c. 5. 24. ipsa amigdala redditur amara.
e. h. 7. 9. ^e Anchusa ab radice tantum foliata est, radicesq;
habens rubicundas.
f. h. 7. 7. ^f Andryala inter olera est.
g. h. 1. 18. ^g Anetum inter olera. ^h & nudo semine est. ⁱ &
h. h. 7. 32. seritur in principio hyberni post æstiuum solstitium
i. h. 7. 1. mense Iulio. ^k cuius radices lignosæ sunt. ^l & plura
k. h. 7. 3. sunt eius genera. ^m humor uerò suauem olentiā præstat
l. h. 7. 4. m. h. 1. 19. ⁿ Anthedon Mespilī species.
m. h. 3. 12. o. h. 7. 13. ^o Anthemum hoc habet peculiare, cum cæteris om
nibus proprium sit ab ima sui parte deflorere incipere,
id à summo incipit florere, candidus flos circumdat,
medium utridis tenet, & semini color idem: decidit id
uti & spinosorum conceptaculo inani relicto: genera
eius plura.

^a *Apharca* ex syluestribus arboribus perpetuo ui-
ret. ^b & in montibus proprie nascitur, in planis uero ne-
quit. ^c cum urbanis germinare incipit. ^d fructum pri-
mum cum uua dulcescit maturat, posteriorem cum flo-
ret, bis enim fructifera hyeme ineunte uidetur. ^e uallis
expetitur, & ad urendum commoda est.

^f *Aphaca* genus olerum est, ^g germinat cum pri-
mis imbris post æquinoctium. ^h est autem ingusta-
bilis & amara, festinanter floret, sed celeriter flos se-
nescit, atq; lanugine pappo dicta marcescit: ⁱ tū alius
iterum prouenit, atq; iterum alius i lq; tota hyeme, ue-
req; toto usq; ad æstatem faciliatur, flos melini spe-
ciem gerit.

^k *Aphaca* legumen siliquas seminum leuiter latus
habet ueluti lentis. ^l & celeriter perit.

^m *Aplum* biennio durat, & cum semen parit, tunc
caulem emittit. ⁿ radice coheret singulari, ut maior
pars fere olerum, sed propagines magnas non subge-
rit, & pro corporis sui ratione altius quam arbores ra-
dicatur. ^o cuius cacumen amissis reliquis perpetuo ui-
ret. ^p & iam folijs perfectis caulis conuenienter assur-
git, ut lactuce ocymin. ^q succus uero suauem olentiam
præstat. ^r mutatur autem culturæ causa, nam si satū
conculcetur cylindorq; spissetur, coæqueturq; crispum
inquitunt prouenire. nascitur difficilime, quadragesi-
mo enim die affirmant, alij quinquagesimo. ^s at ex

D ii uetere

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. l. 7. 2. uetere semine celerius. ^a radix uerò non capitata diuturnior germinare cernitur, mittit. n. radices, quibus
- b. h. 7. 2. folia caulesq; proueniunt. ^b est autem unistirps, & radix agitur in profundum. ^c & carnosà est. ^d quamobrè
- c. h. 7. 3.
- d. h. 7. 3.
- tem c. 3. 6. cum transferitur, palum tantum adigere, quantum apium facere uolueris iubent, nec non & semen eius colligatum in laciniis palo adactò, & fimo, terraq; ingesta
- e. h. 7. 3. serendum censent. ^e translatusq; melius, gradusq; fit.
- f. c. 3. 6. ^f apium uerò radice. tenuis circumfodiente, cachrylio plenè obducunt, ratio quòd totum alimentum radices absumunt, nec ad germina quicquā transmittunt, quòd
- g. c. 6. 16. si diuidatur, plus incrementi sequatur necesse est. ^g radices dulces sunt, & caules plurimi dulces, ac cibo aptissimi sunt, folia minime, causa est; quoniam cum in paludibus fluuijs nascentur, superiora humidiora sunt, radix uerò & caules quia minus habent humoris dulcedinem aliquam habent, uel è contrario, quia superiora nimium sicca; sapor autem neq; in siccitate,
- h. c. 6. 22. neq; in humiditate nimia consistere potest. ^h odor uerò in eo est propter siccitatem, acritatem, & acerbitatē, & eius plura sunt genera. ⁱ & Differunt inter se cum folijs, tum caulibus, aliud enim folio spisso, crispo, densoq; aliud rariori, latoriq; cauleq; maiori. Horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut uersicoloris, uerum ad summam eiusmodi omne syluestri proximum est.

Aquifo-

^a Aquifolia perpetuo uiuet. ^b & in montibus na
scitur. a. h. 3. 4.
a. h. 1. 15
b. h. 3. 4.

^c Arachidna fructum sub terram parit, ut Mo-
rus Aegyptia. ^d radices similes habet Araco. nec fo-
lia gerit uide aracum. c. h. 1. 1.
d. h. 1. 9.

^e Aracum radices similes habet Arachidna, e. h. 1. 11.
pars ipsa carnosae radicem simplicem, crassam altius
infigendam mittit ceteras uero, quibus insidet fructus,
tenues, ac summo cespite cohaerentes agit, loca areno-
sa potissimum amat folia non gerit, neq; foliis quicquā
simile sed quasi binorum fructuum partibus inter se op-
positis foecunda potius extat, quod mirū profecto est.

^f Aracus res scabra & dura in lente nascitur. f. h. 8. 10.

^g Arborem, quod ab radice, caudice simplici, ra-
mosum, nodosum, surculosum aut facile dissolubile as-
surgat. ceu olea, ficus, uitis. g. h. 1. 6.

^h Arbores ex quibus uestes conficiunt, folium mo-
ro simile habent, corpore autem toto rosis caninis pro-
xime cernuntur, seruntur ordinatim quapropter e lon-
guinguo aspicienti uites apparent. ⁱ sunt & in Tylo In-
sula arbores lanigeræ multæ, & folia uitigena ge-
runt, uerum minora fructum nullum; id in quo lana con-
tinetur mali amplitudine cerni uerum nascens compres-
sum, cum tempestiuæ maturitatis sit, aperiri, & lanā
excipi, qua telas texunt, alia uiles, alias pretiosas,
hoc idem & in India & Arabia fieri asseuerant. h. h. 4. 5.
i. h. 4. 9.
2. 2. d. d.
2. 2. 1. 3
01. 2. d. 1

Arbutio

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. b. 1. 8. ^a *Arbuti cortex cadit ut portulacæ, & unedont.*
- b. h. 1. 15 ^b *eidem folia perpetuo uiuent. c* *quæ potum cibo idoneum ferat magnitudine non nimium præstat. Corticem tenuem Tamarici similem habet, folium inter elicæ & laurum, floret mense Iulio, flores singulari appendice, parte postrema racemati coherent, specie quisque mirto ob longo similis, & magnitudine tantus non foliatus concavus tanquam ouum exculptum ore aperto, cum autem defloruerit retinaculum perforatur quodque defloruerit tenue sicut uerticillis circa fufum uel carniis doricus extare apparet fructus anno integro maturefcit ut simul hunc haberi & alterum flore stonderi contingat.*
- d. h. 5. 10 ^d *Arbuti spiffiffima matetles cum fit ut ariæ, & roboris carbones optimos facit & solidiffimos, & alijs diuturniores, & idcirco qui metalla argentea decoquunt in prima decoctione his utuntur.*
- e. h. 4. 8. ^e *Aria similis ex toto est lauro marina. f* *& aliquando post mensem, aliquando post uindemiam, & arcturum germinat. g* *materies uero huius duriffima est, ut roboris, & Carpint, antequam enim terebrent. h* *cam, madefaciunt, quo scilicet molliorem reddant. i* *natura perpetua est. l* *in opere autem difficillima, ut pote quæ dura, nodosa, criffa, conuolutionibusque perplexa fit. k* *carbones optimos eius spiffiffima materies facit, ut etiam arbutus, uide supra.*
- Arus

^a Arus pro corporis sui ratione altius quàm arbo-
res radicatur. ^b cuius radix carnosæ est, ut betæ, &
multo magis. (Radices rustici alunt antequam ger-
men ædere inceperint, redduntq; ampliores, dum ger-
minandi impetum cobibent; & cætera.) Quamobrem
dubitarunt nonnulli, an inter radices poni debeat, hoc
idem, & de gladiolo, etenim, quod subter telluri cohæ-
ret, radix esse appareat, quod uerò cæteris è diuerso
promittur, nihil obtinere radicis dixeris. ^d cæterum ra-
dice feritur, quæ diuturna est, & annicaulia consistit,
& suo latere germinat. ^e æqualis, mollis, fungosaq;
toto corpore est, & quasi corticis omnis exors. ^f fo-
lium cum latitudine cauum, atq; cucumeraceum ha-
bet.

^g Arundo corticem habet macilentum, & neruo-
sum, simplicem, ac geniculatum. ^h cui nulla est medul-
la. ⁱ radices geniculatas habet. ^k & grandes, & car-
nosas. ^l ei nodi ferè sunt undiq; pæres, uel grandiores,
quod crassiori adiacet parti, idq; pro ratione, genicu-
lum enim ueluti nodus est. ^m folijs angularibus constat,
medium ueluti carinam habet, unde & cæteris meatus
medius amplius porrigitur. ⁿ pediculi ex neruo tantum
constare uidentur. ^o fluuios, & loca aquosa amat. ^p
arundinis duo genera tradunt, Tibialem, & reli-
quam; quippe unum genus reliquæ depræhendi, sed in-
ter se inuicem firmitate, crassitate, tenuitate, exilita-
teq;

4. h. 1. 9.

b. h. 1. 10.

c. vide l.

primū c. 8.

et uide. 7.

9.

d. h. 7. 2.

e. h. 7. 9.

f. h. 7. 12.

g. h. 1. 3.

h. h. 1. 9.

i. h. 1. 10.

k. h. 1. 10.

l. h. 1. 13.

m. h. 1. 14.

n. h. 1. 17.

o. h. 4. 9.

p. h. 4. 12.

teq; crassam, & ualidam uallatoriam uocant, alteram
 autem textilem. nasci textilem super insulas fluitantes,
 uallatoriam in Comythis, comythes uocant, ubi acer
 uata arundo, implexaq; mutuo radicum raptu sit, quod
 fit locis stagnorum, ubi tellus pinguis, lætaq; est. non
 nunquam etiam ubi tibialis, uallatoriam gigni, longio
 rem quidem, quam reliqua uallatoria, sed uermibus ero
 dendam, huius differentias eis tradunt. Tibialium. quā
 dam nono anno prouenire nonnulli uolunt; huuc quoq;
 ordinem generandi statuunt, quod error est; in totum
 enim aucto lacu enāscitur, sed quoniam id superiori
 tempore nono anno potissimum euenire uidereitur, ortū
 quoq; arundinis talem esse credidere, euentum fortuitum
 pro ordine certo capientes. gignitur uerò copio
 sior, meliorq;, cum post imbres frequentes biennio cum
 minimum aqua permansit, quod maximè posteriori tem
 pore factum meminere, cum in faustum illud Chero
 nia accidit quippe ante hoc annis pluribus lacum alti
 tudinem extendisse, post, ubi uehemens pestis inuasit
 impletum quidem affirmant: Sed cum inundatio non
 permansisset, Sed hyeme decreuisset, sic, & arun
 dinem prouenisse; fertur enim, uideturque aucta
 altitudine lacus, duranteq; inundatione crassari arun
 dinem, & fieri crassatam quidem armamentariam,
 bombyciam uerò cum non aqua permanserit, genera
 tionem itaq; talem tradidere. Distare autem à reli
 quis

quis arundinibus armamentariam (ut uniuersum capla-
mus) præstantia quadam nutritionis naturalis con-
firmant: quippe pleniorē, carnosiorē, in totumq;
faciem formina lasciuiorē spectari: etenim solum am-
plius, candidiusq; habere, & minus lanuginis, quā
cæteræ, quasdam etiā omnino nihil habere, quas &
nomine spadonum appellant, hinc paria optima fieri
quidam affirmant, sed pauca tamen in opere bene suc-
cedere, cædi tempestiue solitas usq; ad Antigenidem;
cum adhuc simplicius tibia uterentur sub æturo, men-
se Septembri; quippe sic cæsas plerisq; quidem post an-
nis utiles esse incipere, multaq; interim exercitatione so-
nandi indigere. sed ora liugarum comprimi, quod erat
illis Theatrorum moribus utilius; sed postquam uarie-
tas, fictioq; accessit cæsura mutata est; Cædunt enim
nostra ætate mense maio, & iunio, quasi paulo ante sol-
stitium, uel sub ipso solstitio, & fieri utiles in trimatu
referunt, & breui exercitatione egere, linguasq; disci-
ctu deflecti, quod his necessarium est, qui sonos fingant,
& multifariam flectant. hæc armentariæ candida tem-
pora tradunt præparatio & confectio hunc in modum
fieri solet: cum collegerint hyeme sub dio exponunt suis
uestitam tunicis, uere autem despoliatam, attrituq;
expurgatam soli expandunt; æstate posthac concisam
in internodia, rursus sub dio exponunt ad quoddam tē-
pus relicto internodijs superiori geniculo: his longitu-

do palmo nunquam minor, optima ex internodijs ad pariū constructū, media totius arundinis mollimina paria gerunt, quæ aduersum germina exeunt, durissima quæ proxima radice habentur, linguas eodem internodio exemptas congruere, cæteras esse discordes, proximam ab radice leuam poni, dextramq; germina uersus pateat, inciso duas in partes internodio: os linguæ utriusq; secundum calami incisuram faciunt, & si quo alio modo lingue conficiantur, non satis eas congruere, talis præparatio, atq; confectio est, nascitur plurima in Cephisum, & melanam, pelecanta locus hic nominatur, huius quædam partes Chytri uocati, lacus altitudines sunt, quibus arundinem laudatissimam prouentre affirmant. Quin & quo probatio dicta fertur, is autem amnis est ex Lebadea profluens, sed omnium optima nasci creditur Oxeam campen uocitatem. Locus hic Cephisi hosti est uicinus ei campus pinguis, et bilaris quem Hippiam uocant. Est etiam alius locus aquilonius Oxæ Campæ Boedrias nomine, quo etiam ipso nobilem arundinem nasci asseuerant. In totumq; ubi crassum, lætum, fœcosumq; solum sit, Cephisusq; se permisceat, atq; etiam altitudo lacus amplectitur, arundinem optimam oriri. nam circa Oxæ campem & Boedriam hæc omnia comperiuntur. Quod autem Cæphisus uim magnam ad faciendam arundinem laudabilem sortiatur, argumento capiunt, quod colo

co, ad quem melas, qui uocatur, influit. quamquam locus profundus, solumq; crassum, atq; foecosum, tamen ut omnino nulla aut uitiosa exurgit. Generationē arundinis Tibialis, naturam confectionem, quibusuē differentijs à reliquis distet, satis dixisse arbitramur. Genera non hæc solum, sed plura arundinis etiam intelliguntur, quæ differentijs, uel sensui manifestis discernuntur, quædam enim densa tam carne, quam geniculis, quædam rara, paucisq; geniculis, & alia caua tota, quam fistulariā quidam appellant, (nihil enim ferè ligni, carnisuē habet) alia solida, et tota penè intus repleta. Item alia breuis alia procerā excelsa, crassaq; & alia gracilis, foliosaq; alia paucis folijs omnino: multæ quædam differentiæ pro natura, usuq; intelliguntur, singula nanq; ad singula utiles. nominibus alij alijs appellant, sed Canna communissima quodam modo est, quam et fruticiam maximè omnium referunt, & apud flumina, lacusq; potissimo nasci; plurimum tamen in quoq; genere distare, inter sese aquaticas, & sicco nascentes perhibetur. Sagittaria quoq; quam creticam quidam appellant, sui generis est, nodis paucis, geniculata, carnosior omnibus, maximeq; flexum recipiens, atq; omnino absequens, quo libeat flecti calesacta; magnas & folia differentias reddunt, quemadmodum diximus, non multitudine, magnitudineq; tantum, Sed etiam colore, quippe quæ Laconica cognomi

natur, uersicolor est. Item positu ipso, atq; annexu, quædam enim ab ima parte foliorum plurima ferunt, ipsæq; perinde ac è frutice se attollunt. Quidam uel discernendum penè lacustrium esse uolunt, scilicet multa habere folia, & gladioli, phlei, Algæ, butomiq; folijs similia, uerum hoc amplius scrutari oportet. Genus autem quoddam arundinis uel terrenum emigrat, quod non erigit caulem, sed super terram spargitur graminis modo, atq; ita se ampliat, mascula solida est, foemina inanis, quippe ad hanc marem, foeminamq; distinguunt, proueniunt ex eodem fundo plusculæ, non autem frutetant, folio non longo, sed salici simile, magnitudine præstantes, atq; robustæ, ut uicem hastarum præbeant. Hæc circa Acesinam annem oriuntur. Omnis autem arundo utuax est, atq; adusta melius resurgit. Itemq; stipe crassa, numerosaq; est, ob id mori peruicax, radix ipsa geniculata, quemadmodum graminis, uerum non omnes simili modo informantur.^a & cum aquatilis sit calidior est, & à gelu torpere minime potest.^b

^{a. c. 1. 26} in Egypto hæundo cibo idonea est, quæ in paludibus nascitur. dulcis enim cætera quoq; sua extrema parte sentitur, sed breui admodum: Si illa propter copiam alimenti tenera, dulcisq; parte ampliori exurgit: radices etiam suam dulcedinem seruant, usq; quo resiccentur, resiccate statim eam amittit: siccitas enim neq; cibo idonea neq; sapida est quapropter caulium quoq;

quoq; uigor certus statuitur. ^a fissa fonte coit, atq; in ^{d. c. 3. 23}
corporatur.

^b Aspalax radices similes habet croco perdicio. ^{b. h. 1. 11.}

^c Asparagus corruda ex toto aculeata est, & nul ^{c. h. 6. 1.}
lum iusta aculeum folium gerit. ^d & difficile ferme in- ^{d. h. 6. 3.}
ueneris præter corrudam & Nepam, quæ post æqui-
noctium autumnii florescant. propter aculeos pusillum
quendam producit peciolum, ex quo flosculus tandem
ipse erumpit, radice larga alta, numerosa, eademq; tã
crebra innititur, ut pars superna radicũ tota conexa, et
continua reddatur, ex qua uel ipsorum caulium facilita-
tur prouentus, exit caulis de corrudagine uere, ciboq;
idoneus est, deinde durescit, florescitq; indies, flos nõ
solum ex hoc, uerum etiam de primoribus emergit cau-
libus. hæc annuo constat caule, Igitur quæ stinosa in
totum sunt, naturam eiusmodi obtinuerunt.

^e Atragena commodissime capi ex atragena uo- ^{e. h. 5. 10}
cata existimant, hæc enim arbor uitis, & lambruscæ
similis surgit, modo illarum arbores scandere solet, sed
conceptaculum ex hac, terebrum uero ex lauro faciun-
dum censent, non enim ex eodem quod agat, quodq; pa-
tiatur, sed è diuersis accipiantur, alterum efficiendi, al-
terum patiendi uim obtineat, natura exegit.

^f Atriplex, cacumine & latere fructum fert. ^g na- ^{f. h. 1. 23.}
scitur octauo die. ^h radix una alte descendit, altæ ue- ^{g. h. 7. 1.}
ro ex ea se deprimunt, ⁱ & lignosa apparet. ^k semina ha- ^{h. h. 7. 2.}
bet ^{i. h. 7. 3.}
^{k. h. 7. 3.}

- bet longa, lata, & foliata, & ex utraq; parte racema
 a. h. 7. 3. tim gerit.^a & infirmiora ad perdurandum sunt.
 b. h. 8. 4. Auenam multiplici folliculo natura operuit,^c &
 c. h. 8. 7. pilosa est,^d & magis in ordeo exire uidetur.^e & or-
 d. h. 8. 8. deo similis constat, cum semen, siluestris ea & immi-
 e. h. 8. 11. tis constat; terram quoq; uehementer extenua & mul-
 tiplici tum radice tum calamo cōditur. cultis agris hæc
 melius crumpit, & nonnunquam quæ prius germinis in-
 fecunda esset, si diligenter colatur, germinat in totum
 solum hæc frugale desiderat, peculiari uel illo à cæte-
 ris frumentis hæc discerni putatur, quòd annis al-
 ternis utrunq; semen aptum sit prouenire, quamobrem
 qui eam deleri penitus uolunt (deleri enim per contu-
 max est) segetes annos duos laxant à satu. cumq; plenè
 diffusa in herbam est, pecus sæpe impellunt, usq; dum
 penitus depascantur, idq; planissimum eius exitium fit;
 quòd simul & alternatim eius germinationem testatur.
 f. i. 4. 6. ex semine idest zea Avena mirandum sane fit, per-
 mutat enim naturam, & in formam alienigenam muta-
 g. i. 4. 7. tur,^g simul uero non germinat etus semen, sed parti-
 culatim, aiunt enim eius radices germinare anno poste-
 riori, uel semina posterioris anni delapsa erumpere ue-
 rum non infirma sed ualida est auena, ut plurima per-
 ficere ualeat, & simul quæ multa infirmiora sunt hoc
 possunt efficere, ordeum etiā multo antecedit auena, ut
 culmus staret inanis, indomita etiā permanet, & nō est
 mirum

mitrū, præsertim cum tam multis tunicis integantur.^a in c. 5. 23.
 terimit autem triticū atq; ordeū, quia pabulum tollit.

^b Auro maxime arbores interimit, est enim ualen- b. 6. 4. 20.
 tior, atq; adeo ut etiam Cytisum ipsum interimat. c. c. 21.

^c Aurio & Edera nimio patuli desiderio, salugit
 neq; sibi ingenita arbores necant, sed aurio pernicio-
 sior est, quod plus habet saluginis.

^d Aurelia ex syluestribus est, & citissime floret d. h. 6. c. 1. et
timo.
 & qui eo coronantur unguento ex auro ignis experte c. h. 9. 21.
 insperso, gloriam, atq; estimationem bonam consequi-
 tur. florem aurelia habet auro similem, folium candi-
 dum, fructum tenuem, durumq; radicem per summa
 cespitum, atq; tenuem, usus eius ad serpentium mor-
 sus ē uino, ualet etiam ad aml uſta, cremata, & mista
 melli, sed quod superius dictum est mera hominum cō-
 menta sunt, ut magnificarent suas artes.^e Ex cruce ani f. c. 5. 8.
 mali aurelia nascitur, ex aurelia mox papilio.

a. h. 9. 6.




Alsamum in ualle Syriae prouenit, eius ar-
 busta duo tantum affirmant, alterum ui-
 ginti iugerum, alterum multo minus arboris
 magnitudo, quæ malo punicæ magnæ, rami multi, foliū
 rutæ simile, candidum tamen, perpetuo uiuens, fructus
 similis terebintho tā magnitudine quā colore. Is quoq;
 admodum odoratus est, & magis quā lachryma, col-
 ligi lachrymam in caudice, & parte superna tradunt,
 facta incisura unguibus ferreis, sub sydere, cum æstus
 maximè angit, collectum uerò æstate fieri tota, sed
 quod manat multum non esse, uix enim in tota die con-
 cham posse impleri, odorem autem inferri eximium, &
 copiosum, adeo ut ex paruo spatium per longum odor
 ualeat permeare, uerum syncerum ad nos nullū aduehi,
 sed quod mistum colligitur, pluribus enim mistioni-
 bus uitari, quodq; Græciæ uenditur sæpè adulterari.
 Quin & uirgas eiusdem arboris odorem suauißimum
 præstare affirmant. & quidem eas quoq; amputari
 quotannis: partim ut reliqua ualentiora seruentur, par-
 tim ut emolumenti plus comparetur. Vendi nanq; uel
 eas magno pretio posse. Quin etiam ad imbrem cultus
 eiusmodi causam referunt, quem crebro incidere asse-
 uerant: necnon & amputationem uirgarum causam
 nonnullam adiiciunt, ne magnæ arbores fiant, sequi
 enim

enim ex crebra tonsura, ut uirgæ tantummodo mittantur; nec intendi ad unum uires arboris possint. Syluestre Balsamum nullum usq; compertum accepimus. Impleri ex maiori orto uasa semichoea duodecim aiunt; ex altero uero duo tantum. uendi syncerum argento ad drachmam, reliquum pro modo adulterationis. Et Balsamum quidem præcipuam quandam in odore naturam protulit. ^a ad unguenta uero utuntur. ^b Et cum in locis ^a h. 9. 7. calidis nascatur maxime est odoratum. ^b c. 6. 27.

^c Betula folio caryæ dictæ conditur, præterquam quod paulo angustiori, cortice autem uersicolore, et materie leui, non nisi ad baculos utili. ^c h. 3. 14

^d Beta tempore longiore exacto pro ratione magis incrementa capescit. ^e caudices lignosi. ^f radici cohaeret singulari, et carnosæ. ^g folia carnosæ sunt, et caro in latitudinem distenditur, non in rotunditatem crassatur. ^h seritur mense Iulio, ut lactuca, et cruce, et ex uetere semine celerius nascitur, æstate die sexta, hyeme decima, et hoc peculiare in beta inquit euentre, quod non semen omne continuo pullulat, sed longo tempore post, anno scilicet sequenti et tertio, quæ de causa ex larga copia seminis exiguum prodire solet. ⁱ Et cum non sit capitata diuturnior germinat. ^k mit- ⁱ h. 7. 2. tit enim radices, quibus folia, caulesq; proueniunt. ^k in ^k h. 7. 4. ter betas uero candida sapore nigra præstantior, pauciorumq; seminum est, quam siculam quidam appellarunt.



THEOPHR. DE PLANTIS.

- ^a h. 7. 6. ^a runt. ^a semina quoq; firmiora sunt ad perdurandū. ^b co
^b h. 7. 7. quitur autem, & est cibo idonea. ^c cum autem aquis sal
^c e. 2. 7. sis rigatur, melior euadit. ^d radices dulces sunt, reli-
^d e. 6. 16. qua minime.
^e h. 6. 3. ^e Beta sylvestris in genere carduorum aculeatis fo-
 lijs non constat.
^f h. 7. 10 ^f Bibinella similis est linguæ agninae, ab aliquibus
 dictæ coturnicis.
^g h. 1. 23 ^g Blitum utraq; parte fructificat, ut etiam Atriplex.
^h h. 7. 2. ^h celerius erumpit. ⁱ radicem habet unicam non in
ⁱ h. 7. 3. rectum tendentem, & continuo ab extremo multas cras-
^k h. 7. 4. sas prolixiores, quam Atriplex agit. ^k minus tamen li-
 gnosas quam ocimus. semen cortice continetur, & ra-
^l h. 1. 9 cematum, ut Atriplici. ^l & plura sunt eius genera.
^m h. 1. 19 ^m Brassica inter olera est, radicem habens singu-
ⁿ h. 1. 15. larem. ⁿ & perpetuo uiwet. ^o polio quod contra uermi-
^o h. 1. 16. culos noxios uestimenti interpositum ualet. ^p & ex
^p h. 1. 23. utraq; parte fructificat. ^q uitem offendit & succi
^q h. 4. 20 odororisq; uiribus reddit deteriore, olfacere quippe
^r e. 2. 25. cam, & attrahere dicunt, quamobrem germen cum illis
 propinquum fuerit, recedere, atq; auerti, ut pote in-
 micum fugiens odorem. Androcides exemplo hoc
 usus est de medela contra uinum confecta, ex brassica
 uidelicet temulentiam posse propulsare, quippe cum ut
^r h. 7. 1. tis etiam uiua odorem brassicae fugiat. ^s nascitur cum
^s h. 7. 2. seritur decimo die. ^t & etiam auulsione, semper enim
aliquid

aliquid radicis accipitur. ^a uerū in Brassica cæteris esse
 suauiores caules regerminatos confessum habetur. ^b ue ^b 7.4.
 rum plura sunt eius genera. trifariam enim illi datur
 digestio, aliam enim crispam, aliam leuem, aliam syl-
 uestram notarunt: syluestri folium leue, sed paruum,
 atq; rotundum, & ramis, folijsq; permultis condita est;
 ad hæc succum asperum, & instar medicamenti ha-
 bet, quamobrem medici eo ad aluum purgandum utun-
 tur. Quin & illud differentiam facit: genus enim quod-
 dam carum est, quod nullum aut prauum semen pro-
 ducat, in totum crassa succi bonitate, & folij amplitu-
 dine, leui præstantior est. ^c translata melior redditur, ^d e ^b 7.5.
 & grandior, auctusq; faciliior, hoc etiam similiter eue-
 nit seminibus depositis, quam fusim satis bebstiolæ ra-
 dicibus innascuntur, pulices, uermiculi, porricidæ ap-
 pellatæ, has igitur humor collectus interimit, & fi-
 mus acruatim iniectus: Industria enim bebstiola con-
 dens, ut in stramento quiescit in stercore, quam obrem
 uenari facile est, aliter nulla uenandi datur facultas.
 Radicibus, contra pulices ne noceant remedium, in-
 ter serere eruum, sed ne nascentur nullum medicamen-
 comperit referunt. ^d Syluestris præter alia modo pe-
 culiari caules sortitur, rotundiores enim, leuioresq;
 gerit, quam satiua, & foliorum appendicem illa latū
 hæc habet rotundior, & folium minus angulatum,
 nam cætera quidem scabriusculi caulibus, tum folijs cō-

THEOPHR. DE PLANTIS.

^{a. c. 2. 20} ^{b. c. 2. 22.} *Stat. ^a Brassica diminuta melior reditur. ^b solum amat
sabulosum.*

^{c. h. 8. 9.} *^c Bromus tritico similis, & maxime terram exte-
nuans, semen redditur, inter alias radice numerosiore
consistit, multis enim dispergitur culmis, ut etiam auc-
na, & sylvestris, & immitis.*

^{d. h. 4. 7.} *^d Brium folium coloris herbidi, amplo, nec lactucis
dissimile, rigosiori tamen, & ueluti contracto, caret
caule, sed ab uno initio plura folia huiusmodi exeunt,
& rursus ab alio; nascitur super lapides, fictiliaq;
iuxta terram.*

^{e. h. 1. 10} *^e Bulbus radices habet maximas in profundum ten-
dentes, sicut gethyum. ^f & caule omnino caret, & in
totum omnia, quæ natura distendi sub terram uoluit,
caulium expertia esse placuit, & totum radice consu-*

^{g. h. 6. c.} *mar. ^g uere floret, & eo utuntur coronarij ad confi-
^{ultimos} ciendas coronas. ^h radice feritur, & in capitatorum ge-*

^{i. h. 7. 9.} *nere reponitur, & facile regerminat. ⁱ continuo ab ra-
dice aliud, atq; aliud obducens. & multis tunicis con-*

^{k. h. 7. 12} *Stat. ^k folium habet croco angustius, & caulis assur-
git bulbo, atq; omnibus bulbosis. ^l & ei hoc peculia-*

^{m. c. 4. 7.} *re datur, quod non simul ex omnibus seminibus exit. ^m
sed partim anno primo, partim secundo, ut de Aue-*

^{n. 7. 9.} *na etiam dictum est. ⁿ Eius radix cibo idonea est, &
ut incrementum capiat cum folijs luxuriatur, quem ad-*

^{o. h. 7. 13} *modum ampla sparguntur incidenda sunt. ^o Verum
bulborum*

bulborum plura sunt genera, differunt tamen inter se, magnitudine colore, figura, sapore, quippe cum adeo dulces quibusdam in locis exeāt, ut uel crudi mandi facile possint, ut in Oberroneso taurica, sed maxima, peculiarisq; præcipua differentia lanigenarum herbarum adnotatur. est enim genus quoddam eiusdem littoribus nascens, lanamq; sub primis tunicis habens, ut inter internum quod manditur, & externum media ista conculetur. texuntur ex ea, & togæ, & uestimenta alia, qua de causa lanatum id constare putaueris, non modo illius indici crinitum: quin & bulbosa plura, nec ijs pauciora notare licet, exempli gratia. Violam albā, bulbinam, et cætera. ^a scmen inter triticum, & alia semina nasci solet. ^b & tam sponte, quā in radice sata prouenit, ut omnia capitata, facile eius radix exiccatur, cum habeat plurimas tunicas, & lentitiam quandam. ^c partem superiorem radice tenuem imbecillem, radices amplas, carnosasq; gerit.

^d Butomi caulis æqualitatem quandam peculiarem cum gladiolo habet. ^e fluuios, & loca aquosa amat. ^f & in eis fructificat, fructum nigrum magnitudine si-dæ proximum, & tam in terra, quā in aqua exit, sed maior in aqua, & insulis quoq; prouenit fluitantibus. ^g folia habet multa similia cannæ.

^h Buxus grauis est, ut etiam Ebenus, quæ ne arfactæ quidem leues redduntur, ⁱ medullam parua-m habet.

habet, & incerttorem; sunt enim qui non in medio,
sed per totum lignum esse dispersam affirmant, & nul-
lus sit certus locus medullæ. ^a propter autem nimiam
spissitatem omnino enodis est, aut paucissimis nodis.
^b & perpetuo uiret. ^c & in montibus nascitur. ^d fructu
ingustabilem cunctis animalibus gignit. ^e facillimaq;
auctu est. ^f magnitudine non excellit, folio myrto simi-
lis, nascitur locis algentibus atq; asperis. Quippe Cy-
torea talis est, qua plurima prouenit. Olympus quoq;
macedonicus frigidus est, nam & in eo gignitur, quam
quam non magna, maxima autem, pulcherrimaq; in Cy-
rena est. procyra enim, crassitudineq; ceteris longe
præstantior, ideo uel insuauis est buxum olens. ^g quæ
cum loca frigida amat uersus Septentrionem cõmunius
reperitur. ^h uermes fugiunt buxum, quia erodere ne-
queunt. ⁱ ad carpentarium opus utilis, sed mediocriter,
ad axem plaustris, & ad burem aratri. Est & eius
usus ad nonnulla alia, quæ tamen in monte Ohympo pro-
uenit, ob suam breuitatem, nodositatēq; extat inutilis.
^k Buxus Asininus natura spinosus est.



CARDUI^a non solum illud peculiare a. h. 6. 4.
 notatur, quod radicem uescendam, tum de
 coctam, tum crudam obtinuit, sed etiam,
 quod eandem optimam habet cum florescit, quodq;
 radix durefcens lacteum succum emittit, floris quoq;
 prouentum peculiarem putaueris etenim circa solstitiū b. h. 7. 13.
 incipit: carnosam, ciboq; idoneam partem crescentem
 sortitur, ortus autem eius non spinosus, sed oblongus
 fieri assolet: quod proprium habent tantum in eorum
 genere, quæ foliis constant aculeatis, è diuerso, quam
 uermilaginem habere uidemus. Carduus pinca haud
 multis prouenire in locis potest, est ab radice folige-
 ra, qua de media seminalis a canus, ueluti malum extu-
 berat. folijs nimirum occultatus. Hic lacrymam iu-
 cundi saporis parte profert postrema, quam spinalem
 masticham uocant. Hæc igitur eiusmodi genera om-
 nibus ferè terris possunt comperiri. Quæ autem ca-
 elus nuncupatur, in Sicilia, Græciæ nusquam habe-
 tur sui generis planta: hæc enim statim ab radice cau-
 les repentes in terram mittit, folio lato, atq; spinoso:
 caules hos cactos appellant: desquamati cibo idonei
 sunt, paulo amaricantes, & reseruare eos aqua salsa
 conditos cosueuerunt: alium uerò caulem erectum pro-
 ducit, quæ pternicem uocant, is quoq; cibo aptus excre-
 scit,

scit, sed reseruari non patitur. fructus in quo semen spinata specie est, uerum exemptis lanuginosis seminibus, is quoq; uescendus relinquitur, & cerebro palma similis est, scalam cum appellant.

a. h. 3. 9. ^a Calamus odoratus in Syria circa lacum nascitur, ubi etiam & Papyrus. ^b Exit etiam trans libanum montem, & inter ipsum libanum, & alium quendam montem, sed non ut quidam dixerunt, inter libanum, & Antilibanum, inter quos campus amplissimus, & pulcherrimus est, quem fulonem appellant, qua uero Calamus prouenit, lacus in amplum spaciatur, iuxta eum palustribus siccatis iste assurgit, ut etiam iuncus, occupant enim isti locum plusquam triginta stadia, uirides nequaquam esse uidentur, sed sicci, forma uero nihil ab alijs differunt, locum ingredienti protinus odor spirat, non tamen longius spirat, ut quidem referunt, adunguentum uero idoneus est. ^c Virides nihil olent, ut calamus & iuncus. ^d Syria calamus inodoratus est, & etiam iuncus.

e. h. 9. 1. ^e Chalbana lachrymam parit, ut Balsamum, & aliud simile.

f. h. 9. 7. ^f Chalbani grauius olet, & medicina potius conuenit. id in Syria nascitur ex paco uocato.

g. h. 8. 7. ^g Camacia tritici species est, & de pastum quidem quoties libeat, fructum nihilo mutat retonsum uero etiam semel degenerat, & longum sine ulla crassitudine surgit,

git, nec satum ad naturam pristinam redire posse autumant, sed hoc perquam paucis evenire Thessali aiunt. Apud Babylonem semper & quasi ordinate bis tondent, tertio pecus admittunt, sic enim caulem mittit, alioquin folijs tantum lasciuit. & negligentius quidam colentibus quinquagesimo cum fœnore messes redduntur. diligentius uerò cum centesimo quinquagesimo. Cultus autem, cum quàm diutissimè aqua inter manserit, quo scilicet multum materiæ producat, cum enim ea terra crassa, spissaq; sit, raram, atq; solutam reddere opus est, sed materiem, herbamq; quam Aegyptus gignere nata est, illa minimè fundit.

^a Canaria primis imbribus post æquinoctium germinat. d. h. 7. 8.

^b Chachrydias triticum sic dictum, culmo crasso consistit. b. h. 8. 4.

^c Cadytas, syriaca herbula, uocata, arboribus, uerbis, atq; alijs quibusdam innascitur. c. c. 2. 93.

^d Caninæ sentis fructum herbarij flatu auerso colligendum censent, alioqui periculum oculis imminere. d. h. 9. 92.

^e Cantrubus fructum subrutilum parit, malo puniceo similem. est inter fructicem, atq; arborem punicæ, non ab similis folio amerinæ. e. h. 3. 18.

^f Capparis cultum nullum patitur, sed deterior red-
ditur cultu, ut natura syluestrem dixeris. ^g ramis aculeatis constat. ^h & non solum caule aculeato, sed etiã folio f. h. 1. 5. et
h. 3. 3.
g. h. 6. 12
h. h. 6. 3.

G folio

THEOPHR DE PLANTIS.

- a. c. 3.1. folio hispido constat. ^a in genere uerò est illorum, quæ in gustatu quandam uehementiam monstrant.
- b. h.7.8. ^b Capillus Veneris perpetuo uires.
- c. h.1.13. ^c Caprificus fico urbana nodosior est. ^d & cum ex d. h.2.3. grano ficario nullum penitus genus procreetur, caprificus tantum erumpit. ^e item ex caprifico, ficum, & ex fico caprificum, sed de fico in caprificum deterius mutari uidemus. ^f Culices ficarii pomis caprifici egrediuntur. & ex putrescentibus eorum granis gignuntur, curius inditium asserunt, quod postquam euolarunt grana ficubus nulla penitus insunt, euolant magna ex parte, pedem aut pennas reliquentes in pomo. Est & alterum culicum genus, Centina uocatum, quod ociose uiuit, quemadmodum fici inter apes, & quos ex altero genere poma sua ingressos adspexerit, protinus necat, id uerò suis moritur operculis. laudantur caprifici potissimum nigrae, ex locis orta saxosis, ob rationem, quod per multæ istæ grana contineant. Noscitur quæ aptæ culcibus emergerit, quod rubrae, & uersicolores, & robustæ constant; contra quæ minus aptæ albæ, imbecillesq; cernuntur. Opponuntur ficis, quæ scilicet eam operam desiderant; cum pluerit, ubi uerò plurimus sit pulvis, ibi plurimæ, ualidissimæq; caprificus exeunt.
- g. h.3.4. ^g in planis nasci nequeunt. ^h & longuæ sunt magis, b. h.4.14. quàm urbanae. ⁱ & neq; radicatione, neq; eradicatione i. h.4.16. ne uel scabie infestantur, neq; radicibus uermiculantur, quædam

quædam nec suos grossos amittunt, etiam si fico inseratur; scabies potissimo gignitur, cum aquæ parum post uergilias inceserit, nam si multum fuerit causa contrahenda scabiei omnis abluitur, & accidit tunc, ut et caprificiis, & grossi decidant. ^a flecti facillime possunt, ^{a. h. 5. 7.}
 & primatus tenet indubie. ^b fumi accerbissimi sunt fici, ^{b. h. 5. 10.}
 & caprifici, & cutuscunq; lacteo succo humentis,
 & causa humor est, hæc tantum decoratata, & aqua
 superinfusa madefacta, deinde siccata, omnium maxime immunia fumo evadunt, flammamq; molliissimam faciunt, ut pote cum proprius quoq; innatusq; humor exemptus, quinetiam cinerem eius, lixiviamq; acrem sentimus. ^c succus caprifici minime lac, aut prave contrahit. ^{c. 1. 19.}
^d est enim acerbior fico urba nonnunquam autem ^{d. c. 5. 11.}
 maturescit, neq; perfectionem ullam attingere potest. ^{e. c. 1. 22.}
^f tamen iuvante iam tempore aliquatenus maturari potest, & abverso folio generat. ^{f. c. 1. 1.}

Cinnamomum uide Ammomum.

^g Cardamomum ex Media & India deportatur, ^{g. h. 9. 7.}
 & ad unguenta idoneum est.

^h Carduus Pineæ natura spinosa est, & pulchre, ^{h. h. 6. 4.}
 diuq; floret. & quæ in Creta insula exit, habere lachrymam dicitur et hirci spina appellata. Vide supra.

ⁱ Caprinus in montibus proprie nascitur, & in plano. ^{i. h. 3. 4.}
 Vide supra Acerem.

^k Cassia in Arabia, Syria, India nascitur, ubi etiam ^{k. h. 4. 6.}
^u ^{u. h. 9. 4.}

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 9. 5. *Et alia odorata, ut Thus, Mirrha, et cætera. Sæ-
mento crassiori constat, et eam nervosam esse uolunt,
nec ullo pacto posse decorticari, ac eius etiam corticem
esse utilem: cum itaq; uirgas secant, longitudine bi-
num digitorum, aut paulo ampliores abscondere, recen-
teque bouis corio eas persuere, tunc ex eo lignis putre-
scentibus, uermiculos nasci, qui lignum erodant, corti-
cem uero nullatenus tangant, ob amaritudinem, acrimo-*
- b. h. 9. 7. *niamq; odoris. b ad unguenta ea utuntur medici. c Et*
c. h. 6. 2. *duo sunt eius genera, alia enim candida, alia nigra.
Candidæ folium modo cutis oblongum, figura quodã-
modo oleagineo simile; nigræ quale Tamarici carno-
sum, candida magis se huius spargit, odorataq; est, ni-
gra odore caret, radix ambabus, quæ altè descendit;
grandis, ramiq; permulti, crassi, surculosiq; ab ipsa
protinus tellure, atq; paulo superius sparsi lentè admo-
dum constant: quamobrem hisce ad colligandum modo
tunc utuntur: germinant, florentq; post æquinoctium
autumni, et multum deniq; temporis florent.*
- d. h. 9. 9. *d Cassiam, quam alij dulcisidam uocant, noctu effo-
diendam præcipiunt, nam si interdiu, et à pico mar-
tio uisus quisstam sit, fructum quidem legens, oculis
periclitabitur, radicem autem secans sedem procidet.*
- e. h. 7. 10. *e Cauda uulpina spicosa est.*
f. h. 1. 16. *f Cedria extremitate pungit.*
g. h. 1. 18 *g Cercis arbor est, et siliqua semina profert, utfi-*

ens Aegyptia id est siliqua.

^a Cedrus extremitate puugit. ^b uiret perpetuo. ^c folia habet rara. ^d & per summa innititur. ^e quidam binam affirmant; alteram lyciam, alteram punicam; alij simplicem dicunt, scilicet qui Idam incolunt est iunipero non ab similis, sed folio maxime distat: quippe cedro durum, acutum, spinosumq; , Iunipero mollius: excelsior quoq; iuniperus nasci uidetur: cæterum alij nominibus minime diuidunt, sed ambas cedros appellant: cedrum tamen cum additione, cedrum acutum nuncupant, ambo nodosæ alosæ, & materiæ tortuosæ: uel potius iunipero parua, spissaq; materies, breuiq; putrescens, cum cæsa fuerit. Cedro maxima ex parte corde referta, & putredinem nullam sentiens, fructus cedro odoratus, pulcher, gustatuq; suauis. ^f Cedrum Syria gignit, eaq; ad triremes utuntur. ^g hæc detracta coma, decisoq; cacumine, tota perit, nec quicquam germinat, sicut nec si adusta, aut tota, aut parte aliqua fuerit: reliqua autem omnia & præcisa germinant, & nonnulla meliora reddunt, ut olea. ^h ex cedro simulachra sculptere solent, ut etiam ex cupresso, olea, & alijs. ⁱ cedri materies nata humorem emittere, & in plenum omnes quibus oleosus est humor, quamobrem Deorum statuarum uisæ sunt aliquando sudasse. ex his enim condere eas consuevere. Quod autem Lucinam appellant, & sacrificijs obseruandum Aruspices iubent, concreto quodam

a. h. 1. 16.

b. h. 1. 15.

c. h. 1. 16.

d. h. 3. 7.

e. h. 3. 12.

f. h. 4. 6. et

c. 5. 8.

g. h. 4. 19.

et c. 5. 24

h. h. 5. 5.

i. h. 5. ult.

mo.

idem fere di

cit. c. 1. quin

to. 4.

THEOPHR. DE PLANTIS.

quodam humore extuberat, magnitudine piri, aut paulo maius, minusuè. Germen potissimo citat materies oleaginea, cum rudis, tum sæpè laborata in opus, si quem humorem sentiat, locumq; habeat humectum, ut iam cardo quidem ualua prodatur germinasse, & poculum limo iniectum.^a Quidam cedrum picem germinare affirmant.^b fructum serò perficit, sicut etiam omnia, quæ perpetuo uirent, unde quanuis non magni confici tamen difficile possunt.^c in locis argentibus cedrus perdurare ualet, super ea niuem minime posse durare autumant, scilicet ratione caloris.^d fructus gustu suaues sunt, & benè olent.

^e Celasrus cultum nullum patitur, ut etiã Abies, & Pinastrer, immo deteriora redduntur.^f folia nunquam dimittit.^g & in monte, & in plano nascitur.^h et tardissime fructu perficit,ⁱ loca summa, gelidissimaq; amat.^k & ad baculos idonea est.

^l Celtis caules macilè habet.^m medullam duram, et spissam,ⁿ propter nimiam spissitatem enodis est, aut paucissimis nodis constat.^o in Africa celtis plurima, optimaq; gignitur.^p Proprium genus præstat, magnitudine quanta pirus, aut paulo minore, incisuras folium habet, ac ilicis esse uideatur materies. genera eius plura, fructibus inter se discreta produntur, fructus magnitudine fabæ, maturescit uuarum modo, uarie colores immutans: nascitur quemadmodum myrta aduersa

sa inter se, densius super germina, gustatu inter lotophagos dictos prædulcis, suavis, innocuus, atq; etiam bone frugis, uentribus est suauior, qui sine ligno interiori est, nam uel genus huiusmodi redditur, & uinum coexprimitur, multa hæc arbor, fructuq; copiosa est. Exercitum itaq; Opheli cum in Cartaginem proficisceretur, uel eo fructu diebus plurimis pastum commeatum defectu, accepimus. Est igitur in insula Lotophagia Paride uocata larga copia, cæterum non minor in continenti, sed longè largior est, & plurima omnino in Africa nonnulli celtim arborem fructicosam, ramisq; tradunt, caudice firmo, uel fideli, fructu nuce obducto, parte extrema minimè carnosæ, sed potius pelli culari, cibo non tam dulci, quàm gustatu alijs grato, & uinum, quod ex eo exprimitur, non nisi binos, aut ternos dies durare, dein accescere, suauiore itaq; fructu apud Lothophagos esse, materiem autem optimam in Cyrenæa prouincia, tractumq; Lotophagorum feruidiorem confirmant: radicem quidem esse multo nigriorem, quàm lignum, sed minus spissam, & ad pauciora commodam, quippe tantum ad pugiones, glutinamentaq; usui est. lignum tibijs. alijs plerisq; expetitur. ^a et longo tempore durat in operibus. a. h. 5. 52

^b Centaurium in Elio agro fecundum, quod montuosis infœcundum: quod planis flosculo tantum gaudens: quod concauis nefloret quidem, nisi improbe. b. h. 3. 5.

Capæ

THEPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 1. 8. ^a Capæ multiplicem tunicam habent, ^b & cortico-
 b. h. 1. 10. sa porrigitur in totum quæ de capite per medium pen-
 c. h. 1. 16. dent, radices esse uidentur, & coalescunt. ^c folia illico
 d. h. 7. 11. sunt, ut etiam Gerbio. ^d quæ unicaulia sunt, & aquam
 et. h. 7. 5. ^e fumumq; cupiunt. ^e semine nascuntur, & etiam radice,
 e. h. 7. 2. sicut omnia capitata, facile enim regerminare possunt.
 f. h. 7. 3. ^f fecundissimæ uerò sunt. ^g & continuo ab radice aliud
 g. h. 7. 4. atq; aliud obducunt, etsi non auellantur, plures indies
 h. h. 7. 4. fiunt, & super fistula capitari posse affirmant. ^h Cæ-
 parum plura sunt genera, ut quæ à locis nomina acce-
 pere, gardiæ, cnidiæ, samothraciæ. item sataniciæ,
 & fissiles, & ascaloniæ. Ex his setaniciæ minimæ, sed
 largæ, dulces: fissiles uerò, & Ascaloniæ tum cultu,
 tum natura inter se differunt; fissiles etenim hyeme sua
 cum coma inertem relinquunt, uere externa folia detra-
 hunt, & reliqua colunt, detractis his folijs, altero ger-
 minant, simulq; inferius finditur, unde fissiles appella-
 tæ sunt. quidam uel omnibus detrahenda folia censent,
 ut uim suam imo contineant, neq; effusæ seminescant.
 Ascaloniarum peculiaris quædam natura notata est:
 etenim solæ fissiles, & quasi steriles ab radice con-
 sistunt, nec ea parte crescere, ac proficere possunt:
 quamobrem non eas deponunt, sed semine serunt, cum
 deinde germinatum sit, transferunt, perficiuntur adeo
 celeriter, ut cum cæteris, aut etiam prius euelli pos-
 sine

sint plus temporis dimissæ in terram putrescunt. Plantatæ caulem edunt, semenq; tantummodo fundunt, tum exinaniuntur, atq; inarescunt. Harum igitur, talis natura. Differunt & colore nonnullæ etenim apud Isim cætera quidem candidis similes constant, sed colore candidæ admodum proueniunt sardianisq; similiter ferre affirmant. Cretensium peculiaris maximè natura notatur, sed Ascalonijs quodam modo proxima, ni forte uel eadem dici debeant: Est enim in creta genus quoddam, quod semine quidem satum, in radice crassatur, depositum uerò in caulem, semenq; totum funditur, sine capite saporeq; dulce est. id enim quasi è contrario cæteris habet, omnes namq; depositæ melius, celeriusq; perficiuntur. Omnes post arcturum proueniunt, tepido adhuc solo, ut depositas imbres occupent, seruntur, & toto capite, & circunciso, sed germinationes haud similes fieri solent, parte namq; inferiori capæ nascuntur. superiori herba tantum erumpit, sectæ in rectum germinare omnino nequeunt.^a Tunicas eximunt, quoniam neq; uiuunt, neq; primatum causæ obtinent.^b Saporem in radicibus suas uires habet.^c Quamobrem iuxta coronarias plantas serere censent, id enim iuuare ad creandam odoris suauitatem affirmant, quod si uere narratur, alterum ex duobus illis causam dixerim, aut quod quantum mali odoris adsit, hæc detrahunt. aliter enim unumquodq; re sibi simili, quodq; sibi cognatum

H sit

4. c. 1. 4.

b. c. 6. 17.

c. c. 6. 28.

THEOPHR. DE PLANTIS.

fit, nimirum attrahit, itaq; parte aliena illa sublata, residuum purius, odoratiusq; relinquitur: aut quod lo cum sua caliditate, edacitateq; exiccent, siccis etenim locis omnia proueniunt odoratiora, sed hoc uelut sup positionem dictum accipies.

- a. h. 3. 13: ^a Cerasus natura peculiaris arbor est, magnitudi ne excellens, quippe quæ ad uiginti quatuor cubita cre scat; recta, admodum crassa, ut & cubitalem ambitum è radice compleat, folium mespili, sed admodum du rum, latiusq; ut è longinquo arbor colore sit manifesta: corticis leuitate, colore, crassitudineq; tiliæ similis, qua propter cunas ex eo conficiunt, sicut etiam è corticibus Tiliæ. hic neq; recto meatu ascendit, neq; gyro pariter obducit, sed mucronatim ambit, ab inferius sur sum uersus se ad minusq; contrahens, quemadmodum foliorum descriptio. Cumq; desquamatur, hoc eodem modo decorticatur, alioquin præscinditur, nec pars ali qua eodem filo detrahi potest: quia & per crassitudi nem prætenus modo folij scinditur, reliquumq; dura re, arboremq; tueri potest, simili modo ambiendo, re liquo autem cortice oblato, humor tunc quoq; defluit, & cum externa tunica tantum detracta sit reliqua pi tuitaceo quodam humore nigrescit, rursusq; anno se cundo, alia, uice illius subnascitur, uerum tenuior. Ma teries in neruo cortici suo similis se in anfractum con uoluenti. Virgæ quoq; eodem modo illico enascun tur,

tur, ramis crescentibus euenit, ut alij deorsum assidue
 pereant, alij sursum uersus increcant, omnino arbos
 minus ramosa est, sed multo enodior, quam populus,
 radice multiplici per quam summa, sed nō crassa inniti
 tur, & conuolutio eadem radice, & corticis radicem
 tegentis est, flos candidus; piro et mespilo proximus,
 & paruulis floribus constans forma fabaceus, fru-
 ctus rubet, figura Iouis flammæ per similis, magnitudi-
 ne fabæ, uerum Iouis flammæ nuceus durus, ceraso au-
 tem mollis, nascitur ubi tilia, in plenum ubi amnes, et
 rigua.^a cortex detrabitur, sine necis periculo, ex quo ^{a. h. 4. 18}
 funes fiunt, sed non uitalis, neq; princeps sed summus,
 qui plerunq; subnascente alio decidit.^b humor in la- ^{b. h. 9. 22}
 chrymæ modum gignitur.

^c Cerrus inter genera roboris habetur, fructifera, ^{c. h. 3. 9.}
 & glandem amarissimam producit, rarissima excel-
 sistima, leuissima, & materiæ per longitudinem ro-
 bustissima; nunquā in cultis, aut rarenter nascens.^d quā ^{d. h. 3. 10}
 alij sterilem dicunt alij fructum uitiatum, adeo ferè,
 ut cum animalium nullum mandere possit, præterquam
 sues, & hos cum aliam nullam habent, magna; ex par-
 te caput tentari, materies quoq; improba, & labora-
 ta quidem, omnino inutilis: rumpitur enim & cadit,
 rudis autem melior, ob id sic cauentur. Improba etiā
 ad cremandum, & ad carbonem faciendum: quippe
 cum carbo eius omnino inutilis, quod transiliet, scintil-

THEOPHR. DE PLANTIS.

letq; præterquam in officinis ararijs. His enim utilior cæteris hic habetur, quòd enim flatu desinente protinus extinguitur, paucus absumi potest.

- a. h. 2. 5. ^a Cicer, ut grandescat cum putaminibus madefactū
b. h. 8. 1. obseritur. ^b & sero. ^c exit multis folijs, radicem habet
c. h. 8. 2. lignosam sicut omnia legumina, uerum ramulis, præten-
nibus modo capillamentorum fibratas, & omnium
(ut ita dixerim) altissimam cicer agit, quod nonnunquā
d. h. 8. 3. uel ex latere mittit flores diuturnissimos producit. ^d Ci-
cer paucissimis diebus perfici potest, siquidem post se-
mentem diebus quadraginta absolui possit, ut quidam
affirmant: nam in totum celerrime genus id leguminis
e. h. 8. 5. consumari nulli dubium est. ^e & siliquis rotundis semi-
f. h. 8. 6. et na continet, licet pauciora. ^f sed abluta salsigine radi-
h. 8. 10. ce tabescens interit. ^g et ab erucis corū protinus perit, ci-
g. c. 3. 27. cer nigrum, atq; etiam rufum, firmitus est, quam album
30. locis dilutionibus sero serendum id censent. ^h Cicer d
b. h. 8. 7. cæteris leguminibus propria illa distinguit, quod de flo-
ris prouēta retulimus, & quod fructum celerrime per-
ficit, quoniam firmissimum lignosissimumq; constat,
atq; in totum noualibus ineptum præ sua edacitate est.
Herbam enecat omnem & maxime, ac celerrime tribu-
lum ad summam, nec solum quodlibet ferre id legumē
i. h. 8. 10. potest, sed nigro quodam, crassoq; opus est ⁱ & licet
k. c. 4. 7. corruptis leguminibus animalia propria gignātur, ^k Ci-
cer solum nullū animal gignere propter amaritudinem
potest

poteſt. ^a & hac de cauſa diutius durat. ^b ſolum len- ^{d.} h.8.10.
 tum amat. ^c & breui id emacrat, hoc ſolum nouale non ^{e.} c.4.2.
 facit. ^d madefactum perit. ^e Incoſtilitas uero in eo de- ^{b.} c.3.26.
 prehenditur, uel propter terram, uel propter aquam, ^{c.} c.4.9.
 & aerem. ^f Cicer florens imbre, flatuq; intempeſti- ^{d.} c.4.11
 uo obit. ^g calidum & ſiccum etiam eſt, & inguſtabile ^{e.} c.4.14.
^h Cichoracea omnia folio annuo, ab radice foliata ^{f.} c.4.14.
^{g.} b. 7.9

^h Cichoracea omnia folio annuo, ab radice foliata ^{h.} h.7.11
 conſiſtunt. germinant poſt Virgiliaſ, fraude exce-
 pta; ſed caulibus, atq; radicibus differentias magnas
 ſortiuntur, quippe cum ceterorum caules ſimpliciores,
 minoresq; exurgant: Cichorea, ideſt Intubi magnis,
 multisq; ramulis brachiatus, lentus item, & diuidi cō-
 tumax eſt, qua de cauſa pro uinculo eo utuntur, radi-
 ce quoq; germen laterale mittere poteſt, & alioquin
 radice prolixum eſt, ideoq; emori contumax. decerptis
 enim quæ ad uſum ciborum capi ſoleant, reliquum gene-
 rationis rursus capeſcit principiū. Euenit autē ut pars
 etius alia, atq; alia floreat, idq; aſſidue fiat uſq; ad au-
 tumnum: quamquam durus caulis eſſe uideatur. fert et ſi
 liquam, in qua ſemen circa poſtremaſ caulium partes.

ⁱ Cicuta in totum caules habet carnoſos. ^k & opti- ^{i.} h.1.8. et
 mā circa ſuſam, & in totum locis prægelidis. ^{h.} 6.2.
 abſq; ullo dolore obtum inferre poteſt, ut Thrasyas ^{k.} h.9.19.
 mantinenſis comperiſſe aiebat, idq; admodum contra- ^l h.9.17.
 ctum, exiguumq; uidelicet ad drachmæ pondus, & ir-
 remediabile penitus, & tam ualidum, ut quantum uis
 temporis

temporis perdurare posset, nec quicquam sentiret immutationis, sed sumendum is cicutam censebat, non unde libuerit, sed ex suis, & si qua alia loca prægelida, & opaca constant. Cij non hunc modum cicutæ utebantur, sed trita, ut scilicet, uti cæteri solebant, at nunc terere nemo uelit, sed detracto tegmine, (id enim rem difficilem facit, quoniam confici contumax sit) pistam sub inde in mortario tundunt, & prætenui cribro transmissam aqua inspersam bibunt, atq; ita obitus celer, facilisq; occurrit.

- a. h. 3. 18. ^a Clauiculæ plura sunt genera, sed quæ conspectiora, summaque occurrant, tria sunt. Herbacea, ac uirens, quæ plurima est: Secunda candida: Tertia uersicolor. quam Thraciam quidem appellant, & harum quæq; distare uidetur, quippe herbaceæ quædam folio tenuiori, oblongiori, atq; etiam densiori, quædam minus hæc omnia habens, & in uersicoloris genere, alia folio ampliori, alia minori, macularumque habitu diuersa, pari modo & magnitudine, coloreque distant, auctu per facili herbacea, inquā plurimū uenit: manifestam, quæ ederescat, affirmant, non tantum folijs, quæ matora, latioraque habet uerum etiā germinibus, proptinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea uerò crassiora, breuioraque, ac edera ut semen proferre incipit, germen sublime, rectumque edit. ^b uerum amplexicaulis constat.

b. h. 7. 8.

Cnecum

^a Cnecum folijs aculeatis constat, ut *Ascanum*, et *Eringium*.^b & sylvestri, urbanoque discernitur. Syl-
 uestris genera duo notantur, alterum urbanum admo-
 dum simile, recticaulus tamen, quamobrem, ex eo mu-
 lierum Priscarum nonnullæ colu utebantur: fructum
 nigrum maiusculum, amarumque parit, alterum genus
 densum constat, caulesque sonccos profert, & quo-
 dammodo humicaule fit: nam propter foliorum molli-
 tiam declinatur, procumbitque ad arua, frustum ama-
 rum, frequentem, barbæque modum hirsutum gignit: sunt
 ambo seminosa, uerum sylvestre copiosius fert: eius pe-
 culiare præ aliis sylvestribus est, quod illa duriora, sft
 nostoraque urbanis proueniunt: hoc autem mollius, ac
 leuius constat.

^c Cnicum una cum seminibus ipsis flores edit, singu-
 lis enim seminibus singulos flores annexos gerit. c. h. 1. 22.

^d *Colytea* folio *Salici* uicina est, ramosa, foliosaque;
 in totum ampla fructum in siliqua sicut legumina gi-
 gnit, eaque lata, non angusta; semen inclusum paruulū,
 non magnum, durum modice non nimis, nec abunde pro-
 magnitudine sua fructificat. e circa *Idam* prouenit, &
 genus est fructicosum, ramosum, alosum, inuentu ra-
 rum, non crebrum, folio laurino lauri latifolia, sed ro-
 tundiori, ampliori que, ut uel *Ulmæ* simile appareat,
 oblongius tamen, colore parte altera herbido, tergo
 autem albidio, neruosoque, tum ibidem neruulis præte-
 nuibus

nuibus, fibrisq̃, tum inter eas propagines, quæ de medio callo, in costarumque speciem adducuntur cortice non leui, sed quasi uitis uestitur, ligno duro, s̃ssioq̃ constat; radices per summa graciles, atq; solutas gerit, sed uibratas, flauasque maiorem in modum, fructu, floreque carere putatur, amentum autem, surculum, gemmasq̃ circa folia admodum leues, pingues, candidasq̃ facie amentacea fundit, præcisa, uel igne deusta, ab imis subnascitur, atq; resurgit.

a. h.3.17. ^a Colutea Liparæ proprie traditur, arbor magnitudine præstans, fructum in siliqua ferens magnitudine lentis, qui oues mirum in modum pingue facit, nascitur semine, & fimo præcipue ouillo. Tempus ferendi cum arcturus occidit, ferendum semine præmade facto, cum iam in aqua pullulare inceperit. habet folium non ab simile fœno græco; germinat primo uniuersalis, triennio, quo quidem tempore baculos decidunt; tunc enim præstantiores esse uidentur, & si ita quis decurtauerit, mox arbor emoriatur. haud enim latere plâ tigersa constat: spargitur deinde in ramos, quartoq̃ anno arborefcit.

b. h.9.7. ^b Comacum ex India, & Arabia deportatur, & ad unguenta idoneum est.

c. h.4.16. ^c Consecratix, in Illyride, & circa Atriam prouenit, & laudata quidem ceterisq̃ longe præstantior, uerum in feruidis, meridianisq̃ locis uelut opposi-

to, copia

to, copia odoratorum habetur. ^a floret æstate, & la- ^{a. h. 6. ult.}
 naria dicta; flos aspectu pulcher, sed caret odore. ^b fo- ^{mc: b. h. 7. 12.}
 lium arundinaceum habet, & caulis assurgit. ^c & ad ^{c. h. 9. 7.}
 unguenta ea utuntur.

^d Corchorus coquitur, & ob amaritudinem in pro ^{d. h. 7. 8.}
 uerbio est, folium eius ocimum sanè æmulatur.

^e Corianum prouentu contumax est, quippe quod si ^{e. h. 7. 1. et}
 nouum sit nasci recuset, nisi conuoluatur, at ex uetere ^{c. 4. 3.}

celerius nascitur. ^f radices habet liguosas, non proli- ^{f. h. 7. 1.}
 xas, neq; fibris multis subnixas semen nudum adhæret.

^g genera plura sunt. ^h ad perdurandum semen firmitus ^{g. h. 4. 7.}
 constat. ^{h. h. 7. 6.}

ⁱ Cortannisum inter olera est, & nudo semine pro- ^{i. h. 1. 18.}
 uenit.

^k Cornus medullā durtiorem, et spissiore abiete ha ^{k. h. 1. 9.}
 bet. ^l sed fœmina nodesior est. ^m syluestris maturior est, ^{l. h. 1. 13.}
 & suauior, culturam enim minime patitur. ⁿ & tam in ^{m. h. 2. 3.}
 monte, quàm in plano nascitur. ^o uerum tam m. as, quam ^{n. h. 3. 4.}
 fœmina ante fauonium germinare incipit. ^p auctu diffi- ^{o. h. 3. 5.}
 cilis est. ^q quædam mas, quædam fœmina, quam & ^{p. h. 3. 7.}
 fœminicornum uocant, folium habet amygdale, nisi ^{q. h. 3. 12.}
 quod pinguius, crassiusq;: corticem neruosum, & te- ^{et h. 5. 5.}
 nuem, caudicem non nimis crassum: cæterum fœmina
 uirgas paruas, sicut amerina suo latere profert, & fru
 ctuosior est, nodos amb. e, perinde ac amerina tum ge
 minatos, tum inuicem congruos habent; materies ma

THEOPHR. DE PLANTIS.

*ris excors, totaq; solida cornibus spissitate, firmitateq; similis, fœmina uerò medullam continet, & mollior est, atq; cauatur ob id ad uenabulorum usum inutilis, maris longitudine duodenorum maximè cubitorum, quanta uenabulorum, macedonicorum, longissimorum est. Caudex enim totus nulla excellentia extat, Qui Idam Troianam incolunt, marem sterilem dicunt, fœminam autem fructuosam. Nucleum fructus oliuæ similem habet, gustu dulcis, odoratuq; gratus, flos oleæ, & floret, fructificatq; eodem modo, ut singulari pediculo plura proferat: tempore quoq; fermè conueniunt. At macedones ambas fructificare affirmant, sed fœminæ fructum ingustabilem esse. radices autem modo amerinarum habere ualidas, & nulli permiciet obnoxias: nascitur in humidis locis, nec tantum in siccis
 a. b. 5. 8. ^aprouenit semine, atq; auulsione. ^aualidissima uerò est
 b. c. 3. 1. ^bad secandum, sicca enim difficile secatur. ^bcuius fructus
 dulcescit, cum humescere, atq; succo abundare inceperit, mitescens enim deterior redditur, atq; in totum ar
 e. c. 4. 14. ^cbos ipsa humida, soluta, imbecillisq; fit. ^cat cornu con
 tacta incoctilia fiunt.
 d. h. 6. 3. ^dCorruda post æquinoctium autumnii florescit, & propter aculeos pusillum producit peciolum, ex quo flosculus tandem ipse erumpit, radice large alta, numerosa, eademq; tam crebra innittitur, ut pars superna radicum tota connexa, & continua reddatur, ex qua uel
 ipsorum*

ipforum caulium faciliatur prouentus, exit caulis de
 corrodagine uere, ciboq; idoneus est, deinde durefcit,
 florefcitq; indies, flos non folum ex hoc, uerum etiam
 de primoribus emergit caulibus, & annuo conftat cau-
 le cortex ex tribus illis conftat, ut ex robore, firo,
 populo.

^a Coflus ad unguenta aptum.

d. h. 9. 7.

^b Coronea mala extruthea degenerant.

b. h. 2. 3.

^c Cratægus, quam alij Cratægonem uocant, folio
 mēfpila promiffo fcilicet est, uerum maiori, latiori, ob-
 longiori q; nec ferrato, quemadmodum illa fit, hæc
 nec admodum magna, neq; crassa materies ei uerfico-
 lor, ualida, flaua, cortex leuis, mēfpilo fimilis, radix
 fingularis acta in profundum, magna ex parte fructus
 rotundus, qui maturefcens ficcatur, nigrefcitq; gultu,
 & fucco mēfpilaceus, qua propter uelut fylueftris me-
 fpilus apparuerit, est fpecie fimplex, & fine ullo di-
 fcimine.

^d Crepis in caule foliata est tantum.

d. h. 7. 9.

^e Crœcus radicem carnofam habet. ^f & natura her-
 baceus erumpit, folio augufto ferè, nanq; in capilla-
 menti modum foliatur, ferò floret, feroq; germinat,
 aut præmature, utro fcilicet modo tempus accipèris:
 floret quippe Vergiliarum occafu, paucisq; diebus,
 confeftim uerò cum folio, florem quoq; expellit, qui-
 nimo prius. ^g radix multa, licet rotunda, carnofa, in

e. h. 1. 10.

f. h. 6. 6.

g. h. 7. 9.

- totum uiuax gaudet calcari, & melius ita euadit, radice attrita pede inferius, ideo iuxta semitas, fontesque pulcherrimum exit, satus radice fieri assolet.
- a. h.7.10. ^a crumpit ceu fremium, & senecio, & ferè in totum annum germinationem, & floris productionem uidebis.
- b. h.6.7. bis. ^b Crocum montanum exors odoris est, et autumnoflorere incipit. odor uerò Croci in flore est, & acris.
- c. e. 6.28. ^c Verum quoniam paruo alimento contentum est, sicut
- d. e. 6.27. ^d etiam rosa odoratius creatur.
- e. h.4.22. ^e Cuciofera Palma similis est, similitudinè in caudice, & folijs representans: sed differt, quòd palma indiuidua, simplexque assurgit. Hæc cum aliquatenus increuerit, scinditur, fitque bifida, iterumque horum utrunque pari modo diuiditur. Item uirgas breues, nec multas profert, cortice sicuti palmæ ad utensilium nexus utuntur. fructum peculiarem profert, nam & magnitudine & figura, & succo singularem, quippe magnitudine ferme, qua manum impleat: rotundum, non oblongum, colore flauicantem, succo dulcem, & ortigratissimum, non congestum, ut palma, sed per singula discretum, nucleo magno, uehementerque duro, ex quo annulos uersicolores detornant, quibus in stragularijs uinculis utuntur, materies à palma plurimum distat, altera enim rara corpore, neruosa, et uiridis: altera spissa, grauis, carnosaque, & cæsa crassa admodum atque dura. Per se quidem maiorem in modum
- dum

dum eam præferebant, sed lectorum pedes ea conficiebant.

^a Cucurbita semina discreta, atq; distantia habet. a. h. 1. 18.
^b cui succus aquosus inest. b. h. 1. 19.
^c singulis seminibus singulos flores annexos gerit. c. h. 1. 22. flos enim in postremo fructus, & crescentibus fructibus, flos diu infixus servatur. d. h. 7. 12.
^d scribitur mense Martio, & ex recentiori maturius exit. e. h. 7. 6.
^e infirmius uero semen est, & multum temporis perdurare non potest. f. c. 2. 10.
^f immatura uero permanet, & incommutabilis est. g. c. 4. 3.
^g cum scribitur die tertio exit. h. h. 5. 5.
^h percoquitur mollitia, & incremento. i. h. 6. 18.
ⁱ parte superna ampliat, luxuriaturq;.

^k Cucumis semina discreta, atq; distantia habet, sicut cucurbita, & succum aquosum. uide supra. k. h. 1. 18.

^l Cucumeris atq; cucurbitæ partim genera esse existimant, partim negant, quemadmodum & in radicis, & rapæ generibus, sed in uno, eodemq; genere alias meliores, alias deteriores affirmant. Cucumeris genera tria notant. Laconicum, Scytalium, Boxotium: ex his Laconicum melius rigatum euadit, reliqua non rigata præstantiora sunt. l. h. 7. 4.

^m Cucumis syluestris urbano penitus incomparabilis est, sed aspectus tantum similitudinem gerit. m. h. 7. 6.
ⁿ & scrotina tam germine, quam flore percipitur. n. h. 7. 10.
^o radix cucumeris syluestris utiliginem, & scabiem pecudum tollit, semen uero liquatum, medicamen elaterium uocatum, o. h. 9. 10.

eatum, id est agitatorium facit, legitur autumno, tunc
ent n optimum est.

^a Cucumer fragilis est, & arboris altitudinem ca-
pit, in ramosque sese modo uitis arbutusue diffundit.
^b seminibus in lacte, mulsoque maceratis, dulciores red-
duntur. ^c Cucumeres puluere occultiati, nutriri, tene-
rioresque reddi creduntur. ^d cum seruntur die tertio exeunt,
& frigide, & siccae sunt. ^e radices ex pabuli faculta-
te assidue mittunt, & diu durant, & cura adhibita
uiuere diu possunt, quamobrem si quis postquam fru-
ctificauerunt, germina decidat, & radices terra tute ope-
riat, atque conculcet, rursus ex eisdem radicibus cucu-
meres depromentur, & multo maturius, quam qui se-
mine ueniant, quoniam radix iam adest, & terra con-
gesta, conculcatamque tepesciens satis germen celerius
elicit. Nam & tepor ipse non parum confert ad prae-
coquendam germinationem. Argumentum hoc quoque
euidensissimum, quod si quis hyberno tempore semina
cucumeris serat in calathis, rigetque aqua tepida, & so-
li exponat, & igni admoueat, ac postea cum tempus
seminandi fuerit, totos copinos demittat in terra prae-
coques admodum faciet.

^f Cuminum semen nudum producit. ^g & fecundissi-
mum, & hoc peculiare de eo dicunt; imprecari namque
& maledicere serendo oportere affirmant, quo latius,
h. h. 7. 4. & copiosius proueniat. ^h cuius plura sunt genera.
copiosius

^a coptosius fructificat inter olera. ^b aqua post satio- ^{d.} h. 8. 3.
nem superueniens potius officit, cum alijs prosit. ^e sca- ^{b.} h. 8. 6.
bie, & falsugine perit. ^d radicem uero exiguum pent- ^{c.} h. 8. 9.
tus habet, nec latefcit, sed supertora uiribus omnibus ^{d.} c. 2. 17.
petit. ^e & fertilissimum est, cum sit exiguum. ^{e.} c. 4. 16.

^f Cupressus procera, & longo gaudice constat, ta ^{f.} h. 1. 8.
men macilento. ^g & nullam pemptus proferre sobolem ^{g.} h. 1. 9.
potest, ut etiam abies, & pinus. ^h mas nodosior est ^{h.} h. 1. 13.
foemina. ⁱ Simpliciori assurgit caudice ad longitudinē, ^{i.} h. 1. 14.
sed non multis radicibus, neq; ramis frequentibus pa-
tet. ^k uiRET perpetuo. ^l Caeteris in locis semine prouenit ^{k.} h. 1. 15.
in Creta autem insula etiam trunco, ut montosa in Tar- ^{l.} h. 2. 2.
ra: apud hos enim Cupressus caedua est, quae ex caesa
ra germinat, modis omnibus praecisa, nam & ab ter-
ra, & parte media, & superna, nusquam loci, uel ex
radicibus germinat, sed raro. ^m plerumque cupressum ^{m.} h. 2. 3.
ex foemina marem prouenire affirmant. ⁿ uerum nullo ^{n.} h. 2. 8. et
pacto finum, nec aquam concupiscit, ^o immo emori dict- ^{3. 2.}
tur, si copiose nouella adaquatur. ^p in Creta insula cir- ^{o.} c. 5. 2.
ca agrum Idaeum cupressus extubercat. ^q ubi nix nun- ^{f.} h. 3. 3.
quam deest, tamen per summa affirmat comperiri. ^{q.} h. 4. 1.
^r In ^{r.} h. 4. 3.
Cyrenensi autem cupressus optime prodit, eam quoq;
loca feruida magis habent, ut Creta, Lycia, Rho- ^{s.} h. 4. 6.
dus. ^t cui si detrahatur coma, cacumenque deciditur to- ^{t.} h. 4. 9.
ta perit. ^u Simulachra ex ea fiunt, quoniam rimas non ^{u.} c. 5. 24.
capit, & carnis aequalitate quodammodo constare ui- ^{u.} h. 5. 5.
detur,

- detur, uel quoniam natura perpetua, et diuturnior uide-
 tur.^a Huius fructus non id totū est, quod pilæ speciem
 gerit, sed quod cono innascitur prætenue, exile, et quasi
 laricis semini proximum, quod pilula sua deſcente dila-
 bitur, et legi proinde non niſi ab experto homine poteſt.
 b. c. 1. 9. ^b auctu difficilis eſt, quamquam ex ea quædam meatuū
 reſtitutionem habeat, uerum aut denſitas, aut utrunque
 impedimento eſt: facit enim & ſiccitas ne ſatis auge-
 ſcere poſſint. adhæc imbecillitas plerique in cauſa eſt,
 nam quæ debilia ſunt, difficile augeri, nutricariq; poſ-
 ſunt, deuinci enim, aut impediri ramos à cælo ambien-
 te baudquaquam oportet, nam & meatus, qui in d. re-
 ctum pertendant, uim tam conficiendi nutrimentum, quā
 reſiſtendi iniuriæ temporis exeunt. ^c uerum cum perpe-
 tuo uireat, ſerò fructum perficit. ^d at conis pendentibus
 ſemina exiliunt, uafaq; ipſa relinquunt inania. ^e Omnia
 ferè quæ in altum extollunt, compeſcenda agricolæ cen-
 ſent, præterquam palma, pinus, & cupreſſus. ^f ſtatue
 confectæ ex cupreſſo cælo aſtrino humectōq; ex ſudāt,
 quæ quidē prodigia, & oſtenta eſſe creduntur.
 g. h. 7. 13 ^g Cyix ad Bulborum genus redigi deſiderat.
 h. h. 1. 9. et ^h Cytisus medullam duram, ſpiſſam, & nigram ha-
 bet. ⁱ & fruticoſa eſt ueluti bebenus. ^k uicinis alimen-
 ti. rapina impedimento eſt, omnia enim adnaſcens ene-
 cat.

Deſiderim



Esiderium flos æstiuus est, ut *Lucernula*, *Iouis flos*, *Cerintbus*, *Iphium*, *Sam-
suum*, *Phrigium*; Eius genera duo sunt.
Vnum, cui flos hyacinto similis, alterum decolor, al-
bum, quo in sepulchris uti mos est, & diuturnius ue-
rò id ipsum est.

^b *Dictamum* *Cretæ* insulæ proprium est, ui mirabi-
le, & ad plura perutile, sed ad partus mulierum potif-
simum pollet; folio *glechoni* simile constat, nec sapo-
re absimile est: ramulis tenuioribus conditur: usus
foltorum non ramorum, nec fructus est, ualent ad
multa, sed præcipuè ad difficiles partus mulierum, ut
dictum est; aut enim facile posse parere faciunt, aut
terte dolores penitus sedant, dantur bibenda ex aqua.
Rara hæc herba, locus enim, qui fert, exiguus ad-
modum est: cumq; *Capræ* depascunt capeßendæ cau-
sa uoluptatis. Verum etiam quod de telis fertur, af-
firmat. *Capras* enim sagitta transfixas, dictamo deuo-
rato telum eijcere. *Dictamum* tale est, uiresq; eius-
modi possidet. *Falsum dictamum* folio quidem simile
constat, sed ramulis minus, & uiribus longè infe-
rius; quamquam enim eisdem in rebus profit, tamen
multo deterius, atq; debilius. *Vis dictami* in ore per-
cipi continuo potest, excalescit enim ex paulo uehe-

K inenter;

menter; manipulos in ferula, aut canna intercludere solent, ne experiret, imbecillius enim cum expirauerit. Non desunt, qui naturam dictami, & falsi dictami eandem esse existiment, sed quod locis lætioribus exeat, degenerare, falsumq; cognominari, sicut etiã alijs pluribus euenit, ut uiribus deterioribus ex loco reddantur. Dictamum enim solum asperum uehementer amare inquirunt. Est etiam aliud Dictamum, ueluti æquiuoce appellatum, nec enim speciem, nec uim habet eandem, quippe quod folio simili Sisymbrio constet, & ramis condatur maioribus. Usus item, & uis non eisdem conueniunt. hoc igitur (ut dictum est) mtrum, simulque proprium Cretæ insulæ datur.

- a. h. 7. 11. ^a Dracunculi radix (sunt enim, qui genus quoddam dracunculi arum appellent, quod eius caulis uarietatem habeat quandam) cibo inepta penitus est, & medicis tantum commoda, ^b Item radix data ex melle, utilis quæ tusses sanare possit; caulem uersicolore serpentis speciem repræsentantem gerit, eius semine nulla in re uti solent.
- a. h. 5. 7. ^c Dolatilila ligna sunt, quorum partes exteræ circum dolant.
- d. h. 1. 16. ^d Dripls in genere spinoso est, loco enim folij spina oritur.
- i. h. 4. 17. ^e Drupæ oleæ uermes generant, nascuntur enim in
his,

his, qui ad lacturam peiores certe deprehenduntur, & marcidi, putresq; omnino uidentur. Hinc & austrinis nascuntur, & riguis magis.³ Verum drupas putredine statuunt; oleum uero non nisi ea ipsa succi mutatio ne creatur; quod quia difficilius sit, non temere dixerim, à calore confici ampliori. Statimq; dum succus minus parti aquosæ, terrenæq; permixtus est. Igitur ante arcturum ambo illa contingunt. Est enim & tempus feruentius, & succus purgator. Contra autem post arcturum, pulpa enim tum augetur, atq; perficitur. coptam uero olei non alimenti ubertate, neq; in pleno corpore oliuarum collocandam esse, multis rationibus constat. Imbres enim minus olei faciunt, & riguæ oliuæ deterius fundunt, quibus, quia caro multa, nucleus paruus. Hæ parcissime præstant oleum, ceu phauliæ, tanquam uires hac in parte naturæ deficiant, nec uero in locis frigidis olei coptam largiuntur, sed carnis, quod quæstionem utiq; citat.

a. h. 1. 8.
b. h. 1. 9.
s. 4.



e. h. 5. 5.
d. h. 9. 22.

a. h. 4. 5.

f. h. 6. 2.

g. h. 9. 8.

h. h. 9. 10

i. h. 9. 11.

Benus^a grauis est, ut buxus, quæ ne arefactæ quidem leues redduntur.^b medullam duram, & spissam, & nigram habet, sicut Cytisus, cornus, robur, & aliæ.^c Verum Ebenus natura perpetua est.^d lignum Ebeni aspecto buxo simile constat, sed decorticatum nigerrimum redditur, utile oculis ad cotem tritum.^e nascitur in Græcia, & duo eius genera constant, alterum materiæ laudatum, pulchrumq; : alterum uile, uitiatumq; ; rarum quod præstantius, reliquum permultum habetur, colorem commendatum, non re condita, sed statim sua natura capescit: fructuosa est Cytisi modo.

Elleborus in uere germinat, radice altè descendit, caule ueluti Mandragora, Cicuta, Albucom constat.^b succidi autem æstate, aut autumnno oportet. Ellebori imis, atq; tenuiores, supernam enim in caput extuberantem inutilem asserunt, & canibus dandum, cū purgandum est.^h Verum Elleborum non solum radice, sed etiam fructu utile est. Siquidem in Anticyra (ut fertur) fructu eius purgantur, quem Sesamaccum fert.

Elleborus uerò niger, & candidus, ueluti æquiuoce dicti apparet, sed de facie uaria sententia est; alij enim similes esse aiunt, præterquam quòd radices colore inter se differant: esse namq; alterius candidam, alterius

nigram;

nigram : alij folium nigri laureum, candidi poraceil red
dunt, radices autem similes colore excepto. Qui simi-
lem dicunt formam huiusmodi tradunt. Caulem modo
prope albuci, sed longe breuiorem; folia continuo ra-
dici annexa, sparsaq; humi radicem largè multiplicem
quæ scilicet prætenues consistunt, atq; utiles sint: nigrum
equos, boues, suesq; necare affirmant, & idcirco eum
cauere: candidum pecudes nimirum uesci, atq; hinc pri-
mo uim deprehensam, cum illo pecudes purgarentur:
Tempestiuus autumnio, uere autem intempestiuus. Ve-
rum Oetæ montis incolæ prope Pileam eo tempore le-
gunt, plurimus enim optimusq; eo prouenit loco, non
tamen ubiq; sed parte una tantummodo Oetæ, quam
Pyram uocant: miscetur in potione, ut uomitio benè
succeedat Elleborinæ semen, hæc herbula quædam est.
Niger ubiq; nascitur: nam & in Bæotia, et Euboea,
& multis alijs locis, sed optimus Helicone, ac in to-
tum is mons medicamentibus laudatur: at candidus locis
paucissimis exit. Optimi uero & uisatissimi quatuor
sunt, Oetius, Ponticus, Eleaticus, Massalioticus: na-
sci eleaticum inter uites aiunt, & uinum usq; adeo red-
dere prouocans urinam, ut omnes, qui bibunt, graui-
tes admodum uentre adducto efficiantur; omnium tam-
en eorum quam reliquorum optimus est Oetæus, Pa-
nassius uero, & Actolicus eo quoq; in loco prouenit,
& quidem mulier & emunt, & uendunt, ignari duritia-
tis,

THEOPHR. DE PLANTIS.

- us, summaq; difficultatis eorum. Hæc igitur quamquam forma conueniant, uires tamen proprias sortiuntur, nigrum uerò ab eo qui comperit, & primo succedit, melam podium quidam appellant, quo & demoslustrant, & pecora purgant, quadam cum incantatione, atq; ad alia complura utuntur.^a Anticyrenses fructum Sesamacci Ellebori dare solent, qui sesamæ similis est.^b Elleborus nascens in Cæta monte melior Parnasico est, ualidius enim esse illud putatur, minusq; apertum medicamini: causa quamobrem ualidum ita sit, similis atq; in fructibus. Aeris enim duritiem, nutrimentiq; largitate grauitas in eo quoq; tractu sicut in Boætiâ prouenit. Porro alius ager ad alias uires idoneus est, quemadmodum in fructibus quoq; perficiendis animaduertimus. sunt etenim loca, quæ nec excoquere quidem ullo modo uires medicas ualeant, quippe multis in locis & niger Elleborus, & aliæ radices hebetes, imbecillesq; comperiuntur, unde credi haud temere possit acre frigido, & solo aperto, atq; etiam alimento modico opus esse, & quidem uenena in montibus plurima nasci uidentur, & in ijs maxime, qui altissimi sunt, atq; amplissimi.
- ^a b. 6. 1. ^c Elium inter coronarias numeratur, sicut rosa, Viola, Iouis flos, sansucum & cætera, quæ omnia surculosa, minutisq; condita folijs constant, fructicesq; proinde redduntur^d flores semine exeunt.

Ensis

^a *Ensis radix dulcis de cocta est, & trita farina.* ^{d.} ^{h.7.11.}
admixta panem dulcem, atq; innoxium reddit, rotunda
haec est, & sine cortice, Capillamentis Gethyi non fi-
brata, per multas iuxta eam Scolopendras reperiunt,
gaudent enim ea herba, frequentesq; congregantur in
eam. ^{b.} ^{h.7.12.} *Haec Ensis, uel pugio (ut quidam uocarunt)*
ad ensis effigiem exit, unde & nomen herbae impositum
est, germinat à semine.

^c *Enthusicum inter olera reponitur.* ^{e.} ^{h.7.7.}

^d *Epimetrum penitus flore caret.* ^{d.} ^{h.7.8.}

^e *Epbemerum, uide Aconitum.* ^{e.} ^{h.9.16.}

^f *Equapium perpetuo uiuet, & amissis reliquis ca-* ^{f.} ^{h.1.15.}
cumine tamen perdurat, ut Apium, & Origanum.

^g *generatio ex lachryma fit, ut etiam lilium exire uide-* ^{g.} ^{h.2.2.9.}
tur. ^{h.} ^{1. c. 6.12.} *Corticem Raphano proximum habet.* ^{i.} ^{radicem}

carnosam, ut Beta, & Apij. ^{k.} ^{equapium folijs uici} ^{h.} ^{h.7.2.}
num Paludapio est, sed hirsutum, & grandicaule ^{i.} ^{h.7.3.}
constat, & radicem crassam modo raphani agit, sed ^{k.} ^{h.7.6.}

nigram, frustum quoq; nigrum producit, magnitudi-

ne eruo ampliore, utile ad difficultates urinae, ex ut-
ro dulci albo, & ad pellendos calculos, nascitur omni

bus locis, & lachryma ex eo myrrhae similis defluit;
Quidam in totum myrrham id esse affirmant. ^{l.} ^{h.9.1.} *uerum*

lachryma in radice est. fructum puniceum fert, quod
nigrum oritur. ^{m.} ^{radices, & caules dulces sunt, &} ^{m.} ^{c.6.16.}
apertissimi cibo, folia non item. Causa in ea est,

quod

THEPHR. DE PLANTIS.

- 11.7. quod superiora humidiora sunt, atq; dilutiora, ut
 omnium palustrum: una enim & aquosa sunt, &
 tenuia, & excoctione carent, cui efficere saporem
 datum est, radix tamen & caulis, quia minus ha-
 bent humoris dulcedinem obtinere aliquam possunt,
 aut e contrario, superiora nimium, ut graminis, &
 illorum, quæ Arundinacea sunt. Sapor uerò neq;
 in humiditate, neq; in siccitate nimia consistere. potest,
 ut in Apio, & Equapio animaduertitur, radices
 enim eorum carnosæ sunt, gratæq; palato, folia siccio-
 ra ueluti acriora, & sic de cæteris.
- a. h. 2. 13. ^a Equæstris radix mederi ulceribus potest, in mel-
 le; sitim quoq; extinguit, si teneatur in ore, ut etiam
 scitibica.
- b. h. 6. 2. ^b Equifeniculum ferulaceum, & neritcaulium con-
 stat, ut fœniculum, ferulago, herba muralis &
 cætera.
- c. h. 1. 23 ^c Erica fructum cæcumine fert, sicut Piræa, &
 Amerina.
- d. h. 1. 9. ^d Eruca pro corporis sui ratione altius quàm arbo-
 res radican-
 idem. h. 7. 3. ^e res radican-
 e. h. 7. 1. ^e tur lignosæ sunt. ^e Seruntur cum hyber-
 ni principium post æstiuum solstitium sit, mense Iu-
 lio, quo brassica, radícula, & aliæ. ^f Erucae generis
 f. h. 7. 4. ^f differentias omnino deesse uolunt. ^g semina firmitiora
 g. h. 7. 6. ^g sunt ad perdurandum. ^h Verum cum aquis salis rigā-
 h. c. 2. 7. ^h tur, meliores euadunt, sicut etiā brassica, beta, & ruta.
- Eruum

^a Eruum si quis uere serat. (temporum enim ratione
 semina immutantur, ut leuiora, facilioraq; reddan-
 tur) facile, gratumq; exit, non graue, quemadmodū
 si autumno seratur. ^b ex leguminibus sero, & ferè sa-
 tu maturo, seruntur Eruum, & Cicer. ^c flores diu-
 turnissimos producit, & pars infera floret, quæ cum
 deficiet proxima incipit, atq; ad supernam itur succes-
 su assiduo, qua de causa multa ex cruvis euulsa parte ima
 defluxisse cernuntur, superna uerò penitus esse uiridia.
^d Caulis in latus potius tendit. ^e uerum Cicer, lens, fa-
 ba, eruum, coloris, saporisq; ratione differentiam fa-
 ciunt, candida inter omnia dulcedine præstant, sicut
 eruum, lens, cicer, & cætera. Verum eruum, & pi-
 sum intersepta, & quasi inuicem contingentia constat,
 & siliquæ Cylindratæ potius apparent. ^f Cicer, &
 Eruum omnium maxime durat. ^g fructus rotundi mo-
 do piperis. ^h inter aliqua plurima innascuntur, & pro-
 pria eorum putantur, exempli gratia, Eriuanga Er-
 ui, & lappa lentis, quod altera Eruum potissimo uin-
 cat causa imbecillitatis, altera inter lentem maxime
 coalescat, quæ quidem Eriuagæ proxima est. Etenim
 præ imodo aggreditur, & herbam totam, ueluti bra-
 chijs capeßit, nec secus angit, atq; obstrangulat. ⁱ er-
 ui fructus ligno constat, & difficile admodum confici
 potest, flos celerius exit. ^k Eruum serere inter radi-
 ces consueuerunt, contra papiliones, & quicquid eius

d. h. 2. 5.

b. h. 8. 1.

lib de. co. 4.

1. 2.

c. 8. 2.

d. h. 8. 3.

e. h. 8. 5.

f. h. 8. 10.

ci 11

g. h. 9. 22.

h. h. 8. 8.

i. e. 1. 16.

k. c. 2. 25.

THEOPHR. DE PLANTIS.

a. c. 3. 15. modi alijs præsidio adhibetur^a inter brassicas etiam, ut
ab erucis defendatur.

b. h. 1. 6. ^b *Eringium* folijs aculeatis constat, ut *Acanum*,
& *Enecum*.

c. h. 1. 18. ^c *Euboicum* semine crusta obducto constat, ut glās.

d. h. 3. 11. ^d *Euonimus* arbor dicta nascitur cum alibi, tum in
Lesbo Insula monte Oreyntio, cui nomen Ordino, ma-
gnitudine mali punici, atq; folio eiusdem maiori, quam
Vincaperuinca: & molli, ut punica; germinare men-
se Septembri incipit, floret in uere, flos colore albæ
uiolæ similis, odore infestus, uelut cruorem inferens.
fructus cum putamine siliquæ sesamæ proximus, intus
solidus, præterquam quod in uersus diuiditur quater-
nos. hic pecus enecat gustatus, quin etiam folium
idem facit, & potissimo capras, nisi purgentur, inte-
rimie: Purgantur autem anocho.

F



*F*aba^a diutius floret.^b Quadraginta nāq;^{a. f. 7. 3.}
diebus florere prodita est, sed alij subin^{et fere tae}
de alio, & alio emergente, florere assi^{c. 4. 11.}
gnant; ^{b. h. 8. 2.}

particulatim enim florere aiunt, alij simplici-
ter referunt, flos enim uniuersim leguminibus omnibus
particulatim emergit, at Faba, ceteraque legumina
non eodem modo mittere consueuerunt, sed eadem ex
parte radicem fundunt, & caulem, qua etiam nexus
siliquarum consistit, inque ea ueluti principium quod-
dam germinandi haud quaquam obscurum, quod in qui-
busdam uel ad mentulae formam effigiatum sanè inspi-
cere possis, ceu in faba. Singulam habet radicem, sicut
& cetera legumina. ^{c. h. 8. 1. et}
Ex leguminibus faba (ut ita lo-
quar) maxime mature feri exposcit, hæc enim suæ de-
bilitatis gratia radicationem hyeme anticipare deside-
rat, uerum cum cetera legumina quarto die, aut quin-
to exeant, faba inter dies plures exit. ^{d. h. 8. 3.}
inter legu-
mina sola potissimum erecto caule constat. ^{e. h. 8. 5.}
Vtrum si
liquis eminet. ^{f. h. 8. 9.}
alijs molesta minime est, tum etiam
tellurem raritatis suæ, ac putredinis causa stercoreari
putatur. ob id qui circa Macedoniam, atq; Thessa-
liam colunt, cum fabæ florēt, arua inuertere consue-
uerunt. ^{g. h. 8. 10.}
germinant non celeriter, & reseruari possunt.
differt etiam rus arure, & Cœlum à Cœlo ad semē

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. idem c. 4. 2. 17. num corruptionem, conseruationemq;.^a nā apud *Apoloniam Maris Ionij* faba nullo pacto corrodi aiunt, idcoq; reseruandam reponi.^b si uerò faba, & aliud quicquam minus fructificet, imbecillitati certè tribuendum est: qua de causa maturius hæc serere solent, ut priusquam hyems sit, radice concipere ualeant. faba tamen adeo detrimentis multis, frequenterq; obnoxia, ut quāuis mature prouenerit, tamen perfici plerumq; non possit imbecillitatem eius uel sensu percipere licet, est enim corpore soluto, eualido, nec radice numerosa subnuitur: quas ob res à quauis causa offensa transigi facile potest.^c interserere fabas, & ordeum uitibus, dum plantæ sunt, placet, quoniam hæc exiccare omnium præcipuè possit.^d solum leue faba amat.^e querendum nunc est, quamobrem semina coctilia, & incoctilia fiant, an ratione aeris, an agri, an certæ affectionis; fabis enim an lentibus id potissimum euenire ut demus, sit sæpè ut ager alias coctilia, alias incoctilia ferat, tametsi eodem modo colatur, & ex continuis segetibus sulco tantummodo arcente, altera coctilia, altera incoctilia. Hæc & plura in lib. de Causis i i i. cap. x i i i.^f narratur autem caulis eiusdem alias coctiles esse, alias incoctiles, necnon in eadem siliqua idem euenit, ut quidam referunt, si uerè aiunt, etenim fieri potest, ut alia ualida, alia inualida sit fabæ infirmitatis argumento, uel illud potest deduci, quòd sola
- mutare

mutare suum colorem uidetur, ut nigra ex candidis efficiatur, concretionem uerò condensationem esse ut frigoris, quæ incoctilia reddat, testificare illud quoque uidetur, quod apud Philippos euenire fabis solitum est. flatus enim in eo loco uehementer frigidus est, & fabæ incoctiles plerumque afficiuntur, at si in palcis torrefactis in area relinquuntur, nihil se mutant, sed incoctiles permanēt, cum enim à palcis, tum suo mutuo contactu teguntur, simulque terræ calore conseruantur; contra si exaltentur, sublimesque capiantur, flatus amplius ualeat, nulloque tegmine defendente facile subit, atque coagitur, tum etiam despoliatur tunc primis suis palcis, & calore circumplectente destituta infirmissima fiunt. magna autem commutatio mouere plurimum potest; sed si postquam tempus præterijt, & quasi firmitus sibi iam consistere, diuentionentur, nullam offensam ex flatu capiunt. Iam enim, & putamen ambiens, id robustius factum est: incoctiles autem effici, si diutius relinquatur sub diuo (ut quidam aiunt) ratio est, plus enim quam modicum sit refrigescunt, simulque indurantur. Huic proximum quodammodo est, ut pluuiæ, quæ protinus à satione secuta est, incoctilem reddat; quod enim in pullulando infirmum inuenit, rigere uehementissime facit, quod quidem ad cocturam non ad exortum enoxat. Hæc & plura Theophrastus in lib. de Causis iiii. cap. xiiii. quæ poteris uidere, cum libet. ² faba inter le- 4. 2. 4. 15

gumina

THEPHR. DE PLANTIS.

- gumina magis eruginem sentit; tum quia folia multa undiq; gerit, tum quia densa obscuritur, tum etiam quia humorem maxime ad se trahit sua varietudinis causa, adde quia fructum terræ proximorem gerit; patrescunt enim inferiora potissimum, quoniam minus perflantur. ^{a. c. 4. 17.} ^a tunditur celerrime. ^b fabarum putamina radicibus fabæ, aut germinibus opposita, uitam penitus tollunt, non tamen omnibus, sed ijs, quæ nuper prosiliuere, ut pote imbecillioribus, quod ea de causa hæc facere possunt, quia sua duritia, siccitateq; alimentum, partim trahendo, partim arcendo auferunt, alimento etenim destituta protinus moriuntur. ^{c. c. 6. 19.} cum autem uirtutes sunt mandi possunt, reddunt & saporis aliquam suauitatem, hoc est propter commistionem aquosi humoris: cum autem siccescunt humoris temperie sublata, ingustabiles relinquuntur, sicut etiam & germina uitiū, & lupitum, & ciceris, & aliquorum.
- ^{d. h. 4. 2.} ^d Fabæ Græca materiem robustam, et uisu gerit decoram, atram, ut perseæ arbor.
- ^{e. h. 4. 10.} ^e Faba Aegiptia in paludibus, stagnisq; exit, caulibus eius qui longissimus quaterna cubita perficit: Crassitudo digitalis est, similis calamo molli, non geniculato, rimas intrinsecus habet tendentes per totum hlij modo, caput super hunc fauo orbiculato uestiarum non ab simile, inq; singulis cellis, singulæ fabæ continentur paululo super id eminentes, multitudine plurimum terdenæ;

terdenæ; flos duplex, quàm papaueris; color roseus
 in plenum caput: super aquam folia ad singulas fa-
 bas amplexa exeunt: fabam quamque conterenti ama-
 rum illud, ex quo pillula fit, inflexum patefcit. fru-
 ctus ita se habet, radix crassissima harundine plenior,
 rimas similiter atq; caulis habens: manditur & cruda,
 & elixa, & assa; eoq; cibo, qui incolunt paludes, utun-
 tur. Nascitur itaq; sponte uel plurima: cæterum &
 feritur in lino, paleis large admistis, ut descendat, in
 corruptaq; maneat, sicq; fabeta faciunt; sin autem se-
 mel apprehenderit, perpetuo manet, radix enim uali-
 da est, nec procul harundinum stirpibus, uerum spi-
 nis subborrens: quamobrem Crocodilus eam refugit,
 ne occurrens oculo offendatur, quoniam acutè non ui-
 det. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciliciaq;, sed tra-
 ctus ipsi non plene conficiunt; & Circa Toranam
 agri calcidici quodam in lacu exit, magnitudine medio-
 cri, ubi & percoquitur, & perficitur, & in plenum
 fructificat. Sic etiam & lotus, ut suo loco dicemus.

^a Febrifuga loca algentia quærit, ut *Absinthium*.

a. l. 4. 6.

^b Fellis terræ succus amarus est, ut *Absinthij*.^c ue-
 rum decem, uel duodecim annis utilis est.^d cultum nul-

b. h. 1. 19.

c. h. 9. 14.

d. c. 3. 1.

lum desiderat, immo deterius redditur, & aquosius,
 ut *Abasinthium*, uerum omnino uis omnis medica, uel
 radice, uel fructu, uel ramo respondere ijs, quæ in gu-
 statu quandam uehementiam monstrant, non perfe-

e. c. 6. 4.

etè

THEOPHR. DE PLANTIS.

Et fructificat, & minus amarum propter saporem ingentum. Notandum est, quod aliquando quæ sunt gustu suauia, aut certè facilia intercrunt, contra. pleraq; insuauia, & amara iuuant, ut fel terræ, & Absinthium, & quæ uenenosiores gustus important.

- a. h. 3. 6. Fagus paulo ante æquinoctium germinat. b. auctu
b. h. 3. 7. facilis est. c. fructus inter glandiferas dulcissimus est,
c. h. 3. 9. quamquàm syluestris, fagus scabra montosis nascitur. genera roboris alij quaterna, alij quina assignant. Caterum nonnulla nomine discrepant; ut eam, quæ glandem dulcissimam fert, alij Quercum, alij placidam uocant. Quod idem etiam in cæteris faciunt. At ut Idæi diuidere consueuerunt, genera hæc roboris habentur. Placida, Cerrus, latifolia, fagus, falsi cortex, quam alij recti corticem uocant, Omnia fructifera, sed dulcissima glans fago, ut retulimus, secunda placida. Tertia latifolia, quarta Salsicortici. Vltima & amarissima Cerro: sed non singulis cuiusq; generis dulcis, sed etiam amara nonnullis, ut in genere fagi uidere licet. Distant etiam magnitudine, figura, coloreq; glandium, peculiare fago, & salsicortici, quod ambæ in genere dicto uirili, glandes parte postrema utrinq; lapidescunt, alijs imputamine, alijs in carne ipsa, adeoq; detractis lapillis, concaua perinde, atq; in animalibus relinquuntur: folio quoq; caudice, materie, totaq; specie distant; nanq; placida, non erecta,*

erecta, nec levis, nec excelsa est: quippe quæ corpore in orbem comoso, contorto, sinuosoque stet, ut nodosa, alosaque assurgat, materies robusta, uerum infirmior quam fago. Hæc enim robustissima, putrediniquæ nulli obnoxia est, sed nec ipsa erecta, quam quam minus torta, quam Quercus, caudice uero crassissimo constat, ut tota quoque brevis species reddatur, nam eius etiam corpus in orbem comosum, minimèque erectum est. ^a fagus glandem rotundam producit. ^b uerum uita longior est, & durat maximè. referunt enim fagos Troiæ super tumulum Ili uetustissimas esse.

d. h. 3. 10.
b. h. 4. 14.

^c Fœminifica herba, & marifica ad procreandum marem & fœminam ualere traduntur, unde nomen acceperunt, ambæ inter se similes, & ocimi speciem gerentes. fructus fœminificæ modo musci oleaginei, uerum pallidior, marificæ uerò sicut oliua cum primum ex musco emergit, geminus modo testiculi hominis, ne semen foetificum sit, fructum hæderæ candidæ facere aiunt, contra, ut prolificum sit, fructum cratæi ex aqua notant; nascitur id lini modo ruffum, & fructum tantum milium fert. Gignere nequaquam posse putatur, & qui semen uolucris collectum modo sextarij triginta assidue diebus portionibus æquis biberit ex uino albo, sic enim penitus sterilefcere hominem aiunt.

c. h. 9. 19.

^d Fœniculum nudo semine constat, ut Anetum, ^d Coriannum, & Cuminum. ^e succus suauem olentiam

d. h. 1. 18.

e. 7. 3.

M præstat. ^e h. 1. 19.

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 6. 1. 2. præstat. ^a & ferulaceum, & nernicaulium constat.
 b. c. 6. 13. ^b sensum autem illum odoris, qui gustatu percipitur,
 non temere adiungi genus olerum indicat, quod agno-
 men à gratis palati accepit, ceu *Anctum fœniculum*,
Iris, & reliqua generis eiusdem.
 c. h. 3. 17. ^c Fœnum græcum folium habet non absimile colu-
 tea. ^d Et unicaule constat, ut *Cuminum*, & *An-*
tum, & non absimili caule surgit, uerum longe breuio-
 ri, & modo capitis superne quiddam gerente, radice
 autè subrotunda innititur, nullum Fœno græco excepto
 inarescit solo tenui, nec ullo pacto pingui hæc prodeunt.
 d. c. 5. 22. ^e Limodorum Fœnum græcum interimit protinus radi-
 ci adnascens. ^f euenit, ut inter herbacea, quæ uiridia
 sint, nihil oleant præter humorem, sicca autem oleant,
 ut Fœnum græcum.
 e. h. 1. 4. ^g Ferula ex neruo, humore, & ex carne constat,
 cum enim durefcit in lignum transit, ut etiam palma.
 f. h. 1. 10. ^h medullam carnosam Ferula habet, & solutior habe-
 tur ut arundo. ⁱ uerū nerui caulis constat, ut fœniculū,
 i. h. 6. 1. ^j & ferulago. ^k Ferula grandis admodum surgit, feru-
 lago autem humilis, sed unicaules, ambæ geniculate
 sunt; folia & caliculi quidam geniculis erumpunt, ac
 alternatim exeunt, folia alternatim inquam, quòd non
 ex eadem parte geniculorum, sed permutatim caulem
 magna ex parte amplexa, sicut arundinea proueniunt,
 nisi quòd deflexa hæc magis, mollius, magnitudinisq;
 causa:

causa: folium enim grande, molle, multifidum, ac capillamenti modo ferè inspectetur, maximaq; terræ proxima, & reliqua subinde ad portionem, flos mellinus, semen obscurum aneto simile, sed maius finditur cacumine, inq; stipites quosdam haud magnos differtitur, quibus flos, semenq; insidit, nec flore, fructuue laterales caules carent, sed modo Aneti ferunt, annuo caule constat. & germinatio in uere primum foliorum, tum caulis, ut etiam in cæteris fieri solet. radice altè descendit, eademque singulari innititur. Talis ferula est.

^a Ficus arbor est ab radice caudice simplici, ramo
fa. ^b nodosa, surculosa, ut facile dissolubilis assurgat, sicut etiam olea, & uitis, uerum aliquando caudices multifidas ficus, & olea dimittere assolent. ^c Circa agrum Elephantium, neq; ficis, neq; uitibus folia deciderent. ^d caudice breui fici contortiores sunt, & carnosæ caudices, & medulam carnosam habent. ^e radices multas, & longas, & aliquas, & hac de causa expedita, faciliq; semita carent. ^f Serotinæ fici antequam fructum percoquant, folia perdunt, ut Piri Syluestres. ^g Folia lancinata, & (ut ita dixerim) cruciformia habent. ^h & ex neruo, & cortice, & carne constant, ut etiam uitis. ⁱ semina congesta putamine aliquo & tunica continentur granum uerò ficarium commune quasi omnibus est, sicut & uinaceum, & quæ his similia. ex nouellis surculis fructificant fici, et

4. h. 1. 3.

b. h. 1. 13

c. h. 1. 6. 11

c. 1. 12.

d. h. 1. 8.

e. h. 1. 19.

idem 1. 11.

f. h. 1. 13.

g. h. 1. 16

h. h. 1. 17

i. h. 1. 18.

1. 1. 1. 23

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 1. 19. uites .^a humor succo lacteo similis .^b sunt & urbanae ,
b. h. 1. 24 & syluestres , sed syluestres plurimum nomine carent ; urbanae plurimum nomine suo noscuntur ; Illud quoque in utroq; genere proprium , Syluestres enim mare , & faxmina uel solis uel præcipue discernuntur , sed urbanae generibus pluribus constant , quorum alia inuentu , numeroq; facilia , alia difficilia scilicet causa uarietatis .^c uerum ficus omnibus modis emergit , præterquam ex ramo , & surculo .^d degenerant autem , & ex grano ficario nullum penitus genus procreatur , sed caprificus tantum , aut ficus syluestris erumpit .^e ex fico in caprificum fit mutatio , sicut etiam ex caprifico in ficum . Sed de fico in caprificum deterius fit , uerum poma auersa , ramulis fert .^f in radican-do præcipua , & satiore qualibet maxime inter omnes arbores est , & longe distantius serere uolunt : pro loci quoq; ratione interualla relinquendum , in montanis enim minora , quam in campestribus : Omnium autem (ut sic dicam) maximum , ut solum commodum , conueniensq; cuiq; tribuatur , tunc enim præcipue quodq; uiget .^g Ficus cum rigatur , magis germine uiget , sed fructum deterio-rem parit , præterquam laconica , quæ riguis . uehementissime gaudet . purgari omnia quærunt , melioraq; redduntur exemptis aridis , tanquam alienis , quæ tum incrementa , tum alimenta impediunt . ficorum non solum radices amputant , uerum etiam abducto cinere obstruunt ,

& passim caudicem scindunt, itaq; fructum copiosius
 dari affirmant. ^a ficus omnium maxime fructum ante
 quam coquat, amittere potest. ^b fructus protinus oſle
 dit, sicut una species Juniperi, & uere germinat. ^c ad
 ortum arcturi post uernum, ex cacumine, & latere
 germinat, ut pirus, punica, myrtus. ^d ficus grossos
 præciduos, & caprificos, si quæ inter ficos caprificæ
 re consuevere, nisi forte pro genere fructuum hæc ca-
 pisse oporteat. ^e Ficus fructifera, nec excelsa, sed
 crassa, ut uel cubitali ambitu sit, ligno contorto, len-
 to, inferius leui, nulloq; ramo superius, gyro comato,
 colore tam folij quam corticis liuido figura, folijs tilie
 similis, mollia quoq; lata sunt, magnitudine similia:
 flos mespili, & cum mespilo floret: fructus, quem fi-
 cum appellant, rufus, magnitudine oliuæ, sed rotun-
 dior, gustu mespilaceus crassas radices agit, ut ficus
 urbana, lentasq; nunquam hæc putret, & cor sol-
 dum, non mollem medullam continet. ^f in ponto fici mul-
 tæ magnæque, & punica amplæ opacitatis habentur,
 quin & piri, & mali permultæ, & uarij generis ma-
 iorem in modum, bonæq; frugis, & uernæ, præter-
 quam si quæ serotina, ^g Ficus etiam in mari traditur,
 folio caret, nec magnitudine præstat, color tritici pu-
 niceus. ^h uerum syluestres ficus urbanis longiores uita
 sunt. ⁱ Sed morbi plures eueniunt urbanis quam sylue-
 stribus, at commune uermiculatio, syderatio, radica

- d. c. 1. 11. ¹tio : omnes enim ferē. ²uermes etiam gignunt, sed quædam pauciores ; quædam plures , ut ficus , malus , tirus . minime autem (ut simplici ratione dicam) acres , & succo uehementes lacteo uermiculantur , eodemq; modo syderantur . magis autē nouellis , quā uigentibus id accidere solet , & omniū maxime Fico , & uiti : ficus maxime radicationē cradicationemq; sentit . Vocant radicationem , cum radices inarescunt , marcescuntque ; Cradicationem cum rami : Crados enim ramos ficulnos quidam uocant , unde & morbo nomen . ^b Ficus laborat , & si imbres nimij fuere , sic enim ad radicem quasi glabratur , quod quidem uitium aulam appellant .
- e. h. 4. 17 ^cGignuntur & culices in fico , & ex arboribus præcipue infestatur , ^dsed cortice detractō plus temporis , tamen interit . ^erara etiam corpore est , ut Sambucus , malus , & Laurus . ^fualida est etiam ad pondus sustinendum , sed in rectum pertendens . ^gFumi acerbissimi sunt fici , uide Caprifi . in capitulo citato . ^huerum nō modo auulsione , sed etiam summis ramulis pullulare facile queunt ficus , & uitis , ⁱsed non solum auulsione , radice , & ramulo prouenit , ligno etiam prægrandiq; ramo exurgere potest , sicut etiam & uites , cuius generis partes mediæ , siccæ , lignosæq; sunt . ^kPunicam , & Ficum , quæq; his sicciora protinus inserere solent .
- h. c. 1. 2. ^lueruntamen , ut uidemus in animalibus , mares non ita cito crescere , ut fæminas , sic etiam in arboribus ,
quas

quas quidem natura humidiorē, solutiorēq; creati nul-
 li dubium est, ut puta, punica, Ficus, & uices auctu
 faciles, palma, & cupressus, & laurus, & pinus, et
 olea difficiles^a inculta priusquam culta germinare inci- 4. c. 1. 17
 piunt, ut ficus, uitis, malus, olea, & reliqua, quoniam
 calorem amplius ualeant retinere, cum non fodiantur,
 neq; radice mudentur; calor etenim est, qui ad gene-
 randum mouere arbores solet. adde quod nulla superio-
 ribus partibus plaga illata est, dum aut rami deputa-
 rentur, aut fructus decerperentur: acceptum etenim
 uulnus facit, ut arbor labores, frigeat, contrahaturq;
 in exiguum.^b succus ficorum lac contrahit, Caprifici b. c. 1. 19.
 minime, aut prae. omnia fere, quibus fructus humi c. c. 1. 20.
 dus, aut nudus, aut tenui intectus putamine celeriter
 suos fructus perficiunt, ut ficus, uitis, & praecipue
 morus.^d Fici & uitis fructus seriores sunt, quoniam d. c. 1. 21.
 & putamine obtegantur, et succum ampliorem, crassio-
 remq; gerant. Ad haec ficus mole ampliore consistunt,
 & summatim quodammodo maturescunt. deniq; omnia
 dulcia breviori tempore maturescunt, non tamen cun-
 ctæ arbores generis cuiusque praecoques sunt; Vites
 enim, & fici permultis inter se discriminibus distant,
 ita ut nonnullis fructus sero admodum maturescere
 queat, propter hanc causam, quia praecoques illæ ar-
 bores sunt, quæ non praeumidae, nec succo frigidae
 constant, quæque fructum nudum, aut membranis in-
 tectum

rectum prætenuibus gerunt, cocturamq; succorum aquo-
 sam, non crassam conficiunt: Scrothinæ uerò, quæ mo-
 do contrario se habent, hoc est, quæ præhumidæ fri-
 gida, & fructu, aut pulpa fructus lignosæ, prædu-
 ræq;, quibusq; fructus lignoso septo, numerosoq; con-
 tinentur putamine. Ad hæc quibus succi pingues, &
 aliquam eiusmodi sortientes potentiam, aut quibus fru-
 ctus sicci, parumq; humoris habentes, idq; pingue,
 uel eiusmodi aliquid. hæc enim omnia coctionem uehe-
 menter impediunt, quod in singulis percipi licet. In
 Aegypto autem ficus nunquam nisi scalptis fructibus,
 oleoq; perunctis concoquerere potest ex humorum scili-
 cet ubertate, nimiaq; alimentorum copia; nec solum fru-
 ctum serò reddi, sed etiam sterilescere quædam nutri-
 menti copia facit, quin ficum resectis radicibus. et trun-

a. c. 1. 19. co. ^a præfixo fertilem, ex sterili, longeque feraciorem
 b. c. 1. 25. reddi affirmant. ^b Peculiare quod Fico, & uitibus ene-
 nire quidam enarrant; hæc enim cum egregie germinat,
 c. c. 2. 14. tum maxime fructificare dicuntur. ^c Ficus incremen-
 tum amplissime capit, & se in altum attollit, & ra-
 d. c. 2. 15. moso admodum corpore aplissimum occupat locum ^d. &
 cum plurima pariat, celerrime consenescit, ac perit.
 Nec ualet illa Democriti sententia, qui asserbat ar-
 bores, quæ prolixa, crassaq; firmarentur radice peren-
 nes esse, cum nec ficus, nec cæteræ, quæ prolixa, cras-
 saq; innituntur nitam obtineant longam, neq; directæ
 erectæq;

erectaq; breuem habent uitam, ceu abies, Palma,
 Cupressus, & aliae. ^a Hyems mox post stationem se
 cuta, sici succum intestinum crassat, atq; coagit. ^b Et
 eius quo ad dici simplicius potest loca silentia concupi
 scit, humida enim fructum putrefaciunt, aut non bene
 maturant, cum fructus etiam ipse humidus sit. ^c ad me
 ridiem uero disponunt, ut spectent solem, quoniam sol
 commodè arbores nutrit. ^d & hoc peculiare ficus ha
 bet, purgandum esse antequam germinet. ^e molestissi
 ma tam ficus, quam olea uitis. ^f uerum famina minus
 ad perficiendum est. ^g & aliae praequoques, alia sero
 tinae, ut ficus, malus, uitis, pirus. ^h Intempestiue etiā
 germinat, hyeme placida, austroue sequente, aer enim
 uitis, tepidus, humidusq; sequutus mox germina cuo
 cat, uide Caprificum. ⁱ fructuum mutationes fiunt, ut
 ex candidis in nigros, uel ex dulcibus in acutos, & e
 contrario, ut fico, uiti, atq; punicea euenire proditum
 est. ^k delapsis uero folijs ficus poma diutius retinet. ^l mor
 bum etiam quendam in radicibus, & paulo superius
 sentit, quem glabrationem appellant, qui certe ex ni
 mio humore solet accidere, nec etiam libera est à sca
 bie. ^m quae cum pluuiā lenta Vergilijs exorientibus sue
 rat, generatur, et quoties generatur, id uitiū perit. ⁿ pro
 pter aquae pemiriā ficus fructus amittere solet. ^o cum
 minus firma frigore aliquando minus laborat, ut ficus,
 & olea. ^p uerum maior pars fructuum acerba princi

THEOPHR. DE PLANTIS.

pio esse solet, quoniam sicca est, sed omnium humidorum siccissima esse putantur, quorum succus lacteus est, ut ficus.

- a. h. 4. 2. ^a Ficus Aegyptia idest siliqua (errore scilicet) nulla enim in Aegypto, sed in Syria nascitur, & in Ionia circa Cnidum, Rodumq; Vide siliquam. ^b Ficus in Aegypto, & omnino tractibus illis frugis bonæ nō sunt; æstus enim perurit, & fieri percoctio nequit, sed terra duntaxat suo alimento crudo, humefacti. ^c fructus fici Aegyptiæ scalpti, & oleo illi in ciplunt maturescere. ^d uerum fructum suo caudice fert, quoniam fertilis, ualidaq; sit ad fructificandum.
- e. h. 1. 12. ^e Fico Indica radices sunt odoratae, & à germinibus illa mittitur, quatenus se fico parenti coniunxerit, telluriq; tuto inbærescit, fit itaq; circum arborem frequens radicum concursus, qui caudicem nequaquam attingit, sed ab eo paulo distat. ^f uerum è ramis radices dimittit singulis annis, dimittit autem non ex nouellis, sed ex anniculis; atq; etiam uetustioribus illæ se terræ coniungentes, ceu sepem circum arborem faciunt, ita ut ueluti tabernaculum condatur, quo etiam morari homines solent. Radices autem nascentes euidentissimè à ramis discernuntur, sunt enim albiore, hirtæ, tortuosæq; binaq; fronde foliata. Item arbor Comam supernam lasciuiam gerit, totoq; fornicato ambitu pulchre orbiculat, & magnitudine uehementer excellit.

quippe

quippe umbram bino stadio facere fertur, & crassitudine caudicis, plerasq; ultra quàm sexaginta graduū orbem colligere, magnā uerò ex parte quadraginta folium pelta non minus habet, fructum admodum paruum, magnitudine Ciceris ficui similem, quā ob rem Græci ficum eam arborem appellabant. Parum mirum in modum fructificat, non tantum pro magnitudinis desiderio, uerum etiam omnibus rebus. Nasquitur arbor hæc circa Acefinam amnem. Est & alia arbor & magnitudine insignis, & suauitate fructus, amplitudineq; mirum in modum præcellens. hoc sapientes indorum, qui nudi degunt, cibo utuntur. Alia, cui folium specie prælongum simile pennis Strutionum, quæ super galeis imponuntur, longitudine duorum cubitorum. Alia, cui fructus longus nec reclus, sed contortus; cibo dulcis, sed morsus in aluo, difficultatesq; facit intestinorum: ob id Alexander, ne quis mandaret, interdixit. Alia, cui fructus similes cornis. Sunt & alia plura bis diuersa, quæ Græcia gignit, sed nomine carent, nec mirum quicquam ex eorum proprietate putandum. Nam (ut quidam referunt) nulla omnino arbor, nullus frutex, nulla herba similis ijs comperitur, quæ in Græcia proueniunt, paucis exceptis. Omnes arbores, quæ ampliori magnitudine se attollunt, minorem generant fructum, ut ficus Indica uocitata. Hæc enim cum intra quadam magnitudine sit, fructum ex-

guum admodum, eundemq; paruum fert, ut quæ ad
germinandum totum absumat alimentum. Etenim folio
amplissimo est, & radicum ab eius folijs demissarum
generatio nutrimenti copia uidetur accedere, sed for-
tè è diuerso, ut quoniam in ea quoq; pabulum dispen-
satur ideo fructus exilius, atq; parcius proueniat.

4. h. 4. 1.

^a Ficus Cypria, quæ sic in Creta nuncupatur natu-
ra proxima est moro Aegyptiæ, nam illa quoq; fru-
ctum caudice, ramisq; crassissimis fert, nisi quod gen-
men quoddam sine ullo folio, tanquam radiculam mit-
tit, cui fructus præpilatur; Caudex magnus; & po-
pulo albæ similis folium ulmo in fructus quaternos per-
ficit, totiesq; germinat, sed nullum ad maturitatē prodia-
ct, nisi pomo ipso immaturo inciso, emissosq; lacte, dul-
cedo ficibus non absimile, & interna grossis sane con-
ueniunt, magnitudine autem pruni est.

6. c. 5. 1.

^b Ficus Bifera certo tenore temporis enasci solet, sicut
& ficus Caprificorum, & ab auersis folijs ena-
scuntur. non ab aduersis quemadmodum ficus erumpit.

2. c. 5. 1.

^c Ficus Laconica, & leucophalia præcoques gi-
gnunt, & plures aliæ, quæ quàm minimæ; nec ea-
rum, quæ gignunt differentia continuo, sed diuerso ha-
bitu est; alijs enim gignunt, alijs non gignunt: fe-
runt non modo apud folium ipsum, uerum etiam multo
inferius, nonnullæ etiam ex parte admodum crassæ:
Euenit, ut aliquæ posteriores quoq; nonnullas uae-

leant

teant maturare, non enim omnes simul, sed alias prius, alias paulo ante caprificus ferunt, quæ certè proximiores germini, atq; ficubus sunt: sed prius dect dunt illæ, minusq; concoquuntur. Verum præcoques imbecilliores sunt, & humidiores alijs.

^a Fidicula hirsuta, & acetabulis carnosæ cœu Poly^a b. 9. 14
porum cirri purgare inferius apta est, ubi quis eam
contigerit. Polypum innasci affirmant: folium filicis
magnæ proximum est. nascitur in petris. ^b & semper
post imbres erumpit: semen nullum producit. ^c Fidi-
cula uel ad distillationes urinæ unice facit, ut quidam
existimant. Caulem hæc Capillo ueneris nigro simi-
lem gerit, folia admodum parua, densa, aduersa, in-
ter se condita, radicem minimam, loca amat opaca.

Tabule Tri-
comens.

^d Filicis figura multifida, & quasi serrata, sicut
Albictis. ^e Stercoratio filici nocet: hanc enim fimo su-
periniecto iniicere affirmant, interit & pecore incum-
bente, ^f Filicis radix colliquata tantum in usum euenit, f. h. 9. 22
gustu astringit non sine aliqua dulcedine, lumbricum
latum expellit, semen Filici nullum est, nec succum,
quem amittat, hæc habet autumno succidi tempestiue
affirmant.

^g Filix foemina utilis contra interaneorum animalia
lata melle subacta: & contra tenuia in uino dulci, cum
farina ordacea data: si mulieribus grauidis detur
abortum facere, si cæteris steriles in totum reddere
atunt.

THEOPHR. DE PLANTIS:

atunt. Differt faxmina filix à mascula quòd folium unico artu porrectum hæc habeat, & radicem crassam, & longam, & nigram, harum igitur uires sterilitati addixisse natura putatur.

a. h. 4. 12. ^a Fislularia canna caua tota est, nihil enim ferè ligni, carnisuè habet. Vide Arundinem.

b. h. 6. 6. ^b Flama flos usui est, & sine odore, ut Iouis flos,

c. h. 6. 6. ^c qui semine exeunt, ut uiola, Iphium, Elium.

d. h. 3. 18. ^d Fluidarum aliam masculam, aliam faxminam dicunt. quòd alia sterilis, alia fructifera sit: nec uirgas longas gerit neq; crassas: folium ulmeo simile, nisi quòd parum oblongius, densumq; aliquantulum: ramulorum nouellorum folia paribus internodijs coniugatim condita adharent, & planè à lateribus ordo uersus conspicitur. Inficiunt his coriarij alba coria, flos candidus, racematim enascens. hic ubi defluxit fructus cū labrusca rubescit, fiuntq; ceu lentes tenues congesta; figura his quoq; in modum uuae. Medicamentum fluida dictum, ossum in his continetur radix per summa, & simplex, ut facile auelli possit radicitus. lignum sine medulla, & cæsum quoq; incorruptum perdurat. Nasceitur omnibus locis.

e. h. 7. 9. ^e Fraus herba ab radice tantū foliata est. sicut silago.

f. h. 7. 11. Nigella, Anchusa, & reliqua. ^f Et inter Cicoracea numeratur, et annuo folio cōstat, et cū cicoracea omnia post Virgiliae germinant, sola fraus non germinat ita.

Fraxinus

^a Fraxinus & in montibus & in planis nascitur. ^{h. 3. 42}
^b auctu facillima est, ut taxus; Fagus, Juniperus, & ^{h. 3. 71}
 aliae. uerum radicem numerosiore, densam, altamq;
 sortitur, ^c Cuius duo sunt genera, quorum alterum ex- ^{h. 3. 113}
 celsum, procerumq; est; lignum candidum, crassius-
 nium, neruatum, mollius, enodius, crispusq; habens.
 Alterum humilius, minus auctile, scabrius, durius,
 flauis, folia laurinis lauri latifoliae similia, in acutius
 tamen coacta, & ambitu leuiter serrata, ac subsiden-
 tia. Ramulus totus, quem folium unum putaueris, quo-
 niam simul cuncta folia ferat, singulari pedicillo, &
 singulis folijs coniugatim, ueluti per genicula penden-
 tibus constat. Amplo interuallo coniugationibus di-
 stinctis; similiter atq; in sorbo. sunt alij breuiores in
 ternodia, coniugationesq; pauciores: alij ut puta can-
 didis longae, pluresq; & singula folia oblongiora, an-
 gustiora, coloreq; porracea, cortice leui, spisso, tenui,
 coloreq; rubro integitur, radicibus crebris, crassis, sub-
 limibusq; adhæret fructum Idei nullum hâc habere ext-
 stimant, atq; etiam flore carere. fert tamen in siliquis
 fructum minutum nucis modo, qualis Amygdalae, gu-
 stu sub amarum. fert & alia quaedam, ueluti muscos,
 quemadmodum Laurus, uerum magis astringentia
 gustum; singulareq; per se in orbem circum acta, pla-
 rant pilorum specie. Horum alia circa fructum, alia
 multo semota exeunt, Quin & implicamina quaedam
 eodem

eodem modo nascuntur, levis illa locis potissimo con-
cauis, madidisq; emigrat, scabra, siccis, atq; saxosis.
Quidam alteram Fraxinum, alteram Bubulam fraxi-
num uocant, uidelicet Macedones; maior, & rarior
corpore bubula est, ob id minus crispata. Est. n. omne cā-
pestre leue; montanum autē omne, scabrum. Quæ monti-
bus nascitur colorata, leuis, robusta, lentaq; est. quæ in
planis decolor, rara corpore, scabraq; assurgit. Ad
summā arbores ferē omnes, quæ tā montibus, quā pla-
nis eadem proueniunt, monte coloratæ ualde, candidaq;
assurgunt; ut scissima, ulmus, reliquaq;: Plano autē
rariores corpore pallidioresq; præterquā pirus, &
Fraxinus, ut Olympi incolæ uolunt. Hæ nanq; in pla-
nis, cum fructu, tum materie præstant: quippe monti-
bus Scabræ, spinosæ, nodosæq; proueniunt, planis au-
tem leuiore, fructumq; dulciorem, carnosioresq; fe-
runt, uerum magnitudine campestris semper excellunt.

a. h. 4. 9. ^a in Nilo Fraxinus, & quæ bubula Fraxinus cogno-
b. h. 5. 1. minatur, plurima est. ^b Verum Fraxinus, Aria, ul-
mus, acer, carpinus, Scissima, Tilia aliquando post
mensem caduntur, aliquando post uindemiam, &
c. h. 5. 8. Arcturum. ^c Humidissima uerō Fraxinus est, sicut
& Scissima. Leculos enim cadere aptos ex his confi-
ciunt. tornatus nauibus rotundis ex Fraxino, moro, ul-
mo, plantano, lentitiam enim, firmitatemquē adesse
oportet, sed deterrimus, qui ex platano fuerit, cele-

riter enim putrescit. ^a ad instrumenta fabrilia etiam ^{d. h. 1. 2.}
Fraxinus idonea est, ut ad malleos, & alia, perfecte ^{. 8. . . .}
 uero *Fraxinus*, & reliqua generis eiusdem partunt, ^{. 2. . . .}
 & excoquuntur. ^{. 8. . . .}

^b *Fremij* genus, quod *Limonium* uocant, incunte ue ^{b. h. 6. . . .}
 re exit. ^c & non longè post germinationem florem ^{me. c. h. 7. 8.}
 emittit. ^d & ab radice tantum foliata est, ut *Nigella*, ^{d. h. 7. 9.}

Anebusa, & reliqua, uerum per totum annum ger- ^{. 2. . . .}
 minat, & floret. semper enim alterum alteri succedens ^{. 7. . . .}
 tempora omnia occupat, ut *Aphaca* etiam, *Crocum*,
fremium, & *senecio*. ^e germinat autem faciliè sua de- ^{c. c. 1. 10.}
 bilitatis causa, & ut plurimum uerno tempore floret.

^f *Frondisflora* tantum ab radice foliata est. ^{f. h. 7. 9.}

^g *Frumentago*, uide *Triticum*. ^{g. h. 8. 11.}

^h *Frumenta* à leguminibus differunt, quoniam folio ^{b. h. 8. 3.}

arundinaceo constant, legumina non ita. *Vide Legu-*
men. ⁱ *Frumenta* pingue solum amant. ^k *tenue* arbores, ^{i. c. 2. 5.}
 quoniam solum rarum, & tenue, si altum, siccumq; sit, ^{k. c. 2. 6.}

arboribus commodum, frumentis incommodum, facit ^{. 1. 2. . . .}

enim raritas, ut imbres hyberni possint aliè descende-

re. Itaq; *Frumentum* humorem attingere nequit, quo-

ntiam per summa suam agat radicem; *Arbores* uero di-

missis in profundum radicibus attingere, atq; attrabe-

re possunt. Sed abunde. *Triticum* uide.

^l *Fructus* est, quod carne, & semine constat. ^{l. h. 1. 3.}

^m *Frutex* est, quod ab radice, caudice multiplici, ^{m. h. 1. 5.}

THEOPHR DE PLANTIS.

ramosumq; se attollit, ut rubus, Paliurus.

- a. b. 1. 8. ^a Fungus. Pediculum longè maiorem, æqualem,
 b. b. 1. 9. quàm Gladiolus habet, ^b & radice penitus caret. ^c ue-
 c. b. 3. 9. rum è radicibus roboris, & iuxta radices erumpit. ^d cū
 d. b. 4. 8. autem aquæ plures inceserint, fungi iuxta mare rubrū
 quodam in loco erumpūt, qui sole tacti in lapidem com-
 mutantur.
 a. b. 6. 3. ^e Fusus agrestis spinosa est. ^f & Cneco, acarnaq;
 f. h. 6. 4. candidior est; habetq; peculiare, quod in folijs euenit,
 decerpta enim, carniq; allata succum sanguineum effun-
 dunt, qua de causa ^g ~~phoros~~. id est cruor à quibusdam spi-
 na est hæc nominata, grauis etiam odore, cruoremq;
 representans, sero perficit fructum, Autumno enim,
 & quidem in totum (ut summatim proponam) uniuersa
 spinaceorum natura fructus serotina existit. hæc au-
 tem omnia tam semine, quàm radice proueniunt, ita
 ut breue quoddam inter ortum, & seminum perfectio-
 g. b. 9. 1. nem labatur spatium temporis. ^h Succus sanguineus est
 spina, quam fusum agrestem appellant.

G.



Allica. ^a acer est. uide supra.

d. h. 2. 4.

^b Gallica etiam mespili genus est. Vide *Messilum.*

3. 11.
b. h. 3. 12.

^c Geminalis aestiuus seritur, quo milium seritur, &

e. h. 2. 1.

Panicum, & *Sesamum*, & *trionum*. ^d uerum animal

d. h. 8. 7.

nullum mandit propter amaritudinem, cucuminaceum uerò quoddam est, atq; nigrum, seritur cum *Sesama*.

^e Gethyi radix, & bulbi caule omnino caret, & in totum omnia, quæ natura sub terram distendi uoluit,

e. h. 1. 8.

^f folia concaua habet ceu *Cæpa*. ^g ex recentioribus se-

f. h. 1. 16.

minibus maturius exit, ut porrum etiam, & *Cucumis*,

g. h. 7. 1.

& non solum anno fructificat, uerum etiam bimatu, & plus temporis durare potest, & unicaule constat.

^h uerum latere germinat. ⁱ & sine capite est. & quasi

h. h. 7. 2.

longa ceruice consistens, ob id germinatio tota in fron-

i. h. 7. 4.

de, sæpiusq; retondetur, ut porrum, qua de causa se-

mine seritur id nec deponitur. ^k aquam uerò diligit, ut *cæ-*

k. h. 7. 5.

pa. quamquam nonnulli negant, si principio bis, aut

ter imber inceserit. ^l Semen ad perdurandum ualidum

l. h. 7. 6.

non est, durare enim nequit, ^m & multis tunicis con-

m. h. 7. 9.

stat, ut *cæpa*. ⁿ uerum cum calida sit difficile germi-

n. e. 4. 3.

nat, ut etiam *satureia*, & *origanum*.

^o Geth cum seminibus ipsis flores edit, singulis enim

o. h. 1. 22.

seminibus singulos flores annexos gerit.

O ii

Gladioli

- a. h. 1.9. ^a Gladioli caulis quandam æqualitatem sortitus est
 b. h. 1.10 peculiarem, ut etiam Butomi caulis, ^b radix cui-
 dentissima Gladioli est, atq; art, quippe cum altera
 crassa, leuis, carnosæ: altera tenuis, atq; nervosa sit.
 Quamobrem dubitauerit sanè quispiam, an inter ra-
 dices hæc poni debeant, etenim quod subter telluri co-
 hæret radix esse appareat, quod uerò cæteris è diuer-
 fo promitur, nihil obtinere radices dixeris. ^c uerum eno-
 dis est (sed ita enodes accipi uolo, ut nodos paucos na-
 turæ ordine habeant) ut Iuncus, & Tiphia. ^d folia
 e. h. 4.9. arundinis similia habet. ^e sed in fluuijs, locisq; eiusmo-
 di nascitur, ceu arundo, fenum, Iuncus, & butomus.
 f. h. 4.11. ^f in lacu orbomenio etiam prouenit, & radix eius plu-
 rimum inæqualitate à cæteris distat, quod pars quæ-
 dam crassa, carnosaq; sit, quædam gracilis, atq; ligno-
 sa: Quin & germinatione, generationeq; refert. Na-
 scitur enim de ramaceo illo radix altera tenuis, iuxta
 latus, deinde caro rursus in ea conglobatur, ex qua se
 se caulis promit, in quo positum germen est, in profun-
 dum quoq; radices eodem modo dimittit, quamobrem
 omnium maximè mori contumax est, euelliq; difficilis.
 proximè ferè gramen è gentculis oritur: radices. n. gent-
 culatæ, atq; è singulis germen sursum, radix subtus erū-
 pit, et terra, et aqua erūpit, necnon in insulis fluitantibus
 prouenit. ^g folia permulta habet, sicut Alga, phleum,
 b. h. 9.7. et butomus. ^h ad unguenta uerò ea utuntur. ⁱ calida uerò
 i. e. 1.26. cum.

cum sit, à gelu torpere minime potest. ^a radices dulces sunt, & cibo idoneæ, sicut etiã illarum, quæ in palustribus exeunt, ut sunt gramē Gladiolus, beta, apium, et equapium, quorum radices, & caules dulces sunt, folia minime. ^b Gladiolus quã uis odoratus, et suapte natura siccus sit, tamen minus redolet recens, & uiridis.

^c Glans semen roboris cute, & crusta obductū est. ^d In Aegypto glans arbor quædam est^e uerum glandes robo. serò mature scere possunt propter frigiditatē arboris. ^f hæc suis munita teguminibus ad germinandi usq; tempore illesa seruant possunt, ut nuces scilicet, et glandes. ^g quæ maxime perdurare possunt. ^h & parte postrema utrinq; lapidescunt. ⁱ Pica, & alia, quædam aues, glandes reponentes, obruunt terra. ^k semina arborū, quæ mollia, carnosaq; sunt, ceu amigdala, nux, glās, putamine ambiente seruantur. ^l uerum glandibus extremis amaritudo insidet.

^m Gongrus uocatus in arboribus nodus ē, ut in olea. ⁿ Gramē radices geniculatas habet, sicut arundo, caules parte superna breues, imbecillesq; sunt, inferæ autē grandes frequentes, & ualidæ, & carnosæ. ^o caulibus concisis gramen exit, sicut lilium, & rosa. ^p folia similia Alga gramen habet, sed magnitudine multo minor. ^q uerum difficile interire potest propter radices numerosas, & in profundum tendentes, ut gladioli. ^r radices dulces sunt, reliquæ minime, ratio est descripta

pta in Equapio. Vide supra.

a. h. 9. 22. ^a Granum cnidium, rotundum, colore rubrum, māiusq; pipere est, sed caliditate multo ualidius. Qua de causa cum deuorandum datur (dari enim contra alui solutionem solet) in pane, aut adipe obductum sumitur, aliter enim gulam adurit.

b. h. 9. 1. ^b Gummi & Amygdalæ lachryma sine odore sunt, quia pinguedine carent. ^c Gummi etiam spinæ Aegyptiæ inspidæ, atq; inolidæ sunt.

d. c. 2. 19. ^d Granata dulciora, mollioraq; aquatio facit. Acerbitas enim, atq; duritia tale desiderant auxilium. Vt de Punica ^e Varia granata etiā sunt, si dimidiam partem superiorem contunderis, sicut etiam palmes, quæ idem uuam nigram, & candidam fert, & in eadē uua acina nigra, & candida coherent, cum utriusq; malicoli dimidiam partem superiorem contunderunt. deinde æqualiter compositos, arteq; colligatos, defixerunt, hæc eadem causa est, ut cum arbor uaria granata, malicq; ferat, uirgas etenim malleo uelut præmollientes, at parte contusa facilius inter se cohæreant, mox archissimè colligatas deponunt: tum arbor una ex cotu compositarum uirgarum exurgit, sed singulæ genus suum conseruant, alimentaq; per se trahunt, atq; excoquunt, nec aliud commune inter se quàm mutuum illum complexum, coagmentationemq; gerunt.

H



Aslula^a regia radicem carnosam habet, ^{d. h.1.10.}
 & multo magis quàm beta. ^{b. 7.9.} inter olera ^{b. h.1.16}
 numeratur, et folia illico ab radice exeunt,
 ut maiori ex parte oleribus exeunt. ^{c. h.7.11} Radices uescen-
 dae non tantum bulborum sunt, sed etiam hastulae regiae.
^{d. h.7.12} cui caulis maxime assurgit. ^{e. h.7.12.} & à semine etiam exit.
^{f. h.1.5.} *Hedera* pro ratione, tempore longiore exacto, s.
 amplissimam magnitudinem capit, ut proculdubio ar-
 bor efficiatur. Cum frutescit, & sic etiam de Ame- ^{idem. 1.15.}
 rina, & paliuro dicimus. ^{g. h.1.16} folia longè diuersa habet à
 populo, & frondes leues parte superna habet. ^{h. h.1.21.} flores
 hædæ lanuginei sunt, ut uitis, & moriⁱ Et modo ^{i. h.1.22.}
 quodam peculiari seruantur infixi florem enim in totis
 fructibus habet, ueluti morus. ^{k. h.3.6.} Verum fructum in-
 gustabilem habet, ut *Juniperus* pirus, & cætera.
^{l. h.3.18.} *Multigena*. quoq; *hedera* est; quædam enim humi
 repens, quædam se in excelsum attollens: & excelsa-
 rum genera plura, sed trina summa pateſcunt; *Candi-*
da, *nigra*, *tertiaq; Clauicula*. *Florum* item species
 plures; quippe alia fructu tantum candida, alia etiam
 folijs; rursus fructum tantum cædidum ferentium, alia
 maiusculum, densum, & uelut in globum circum actū
 fructum peofert, quam *corymbiam* quidam uocarunt:
Athenienses Acharnicam riguam eam appellant:

alia

alia minorem, sparsioremq; modo nigra. Habet ni-
 gra differentias, sed non hunc in modum conspicuas, sed
 clauicula differentijs maximis discernitur. etenim fo-
 lijs plurimum distat, cum paruitate, tum quod angu-
 lata, concinnioraq; sint, cum hedera rotundiora, sim-
 plicioraq; habeat. Distant etiam internodiorum lon-
 gitudine, atq; etiam sterilitate, quoniam fructum que-
 dam non ferant; quod non in hedera transfigurentur,
 ut quidam uolunt; Si uero si omnes hederescant, ut
 alijs placet, ætatis certè, dispositionisq; non generis
 erit discrimen, quemadmodum piri ad pirastrum, tamè
 eius quoq; folium multum ab hedera distat, uerum id ra-
 rum, & in paucis euenit, ut uetustate permutetur,
 ceu in populo alba, & Crotone. Ergo Clauiculæ plu-
 ra genera, sed quæ conspectiora, summaq; occurrant,
 tria sunt, herbacea, ac uirens, quæ plurima est, secun-
 da candida, Tertia uersicolor, quam Thraciam qui-
 dam appellant. Et harum quæq; distare uidetur: Quip-
 pe herbacæ quædam folio tenuiori, oblongiori, atq;
 etiam densiori: quædam minus hæc omnia habens &
 in uersicoloris genere, alia folio ampliori, alia minori,
 macularumq; habitu diuersa: pari modo, & magnitu-
 dine, coloreq; distant. Auctu perfacilis herbacea,
 inq; plurimum uenit, manifestam, quæ hederescat af-
 firmant, non tantum folijs, quæ maiora, latioraq; ha-
 bet, uerum etiam germinibus; protinus enim erecta
 gerit,

gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine herba-
 cea uero crassiora, breuioraq; ac hederæ, ut semen pro-
 ferre incipit, germen sublime, rectumq; edit. Est qui-
 dem uniuersa hederæ radice numerosa, densa, flexuo-
 sa, surculosa, crassa, nec nimis alta, sed præcipue ni-
 gra, & inter candidas, quæ asperrima, immitissimaq;
 habetur: Quamobrem eius amplexus arbores omnes
 infestat, omnem enim enecat, & exiccat, ablato ali-
 mento. Crassatur hæc maiorem in modum, atq; arbo-
 rescit, in tantum, ut per se ipsa hederæ arbor fiat. At
 tamen ex maiore parte semper super aliud uitam dege-
 re solet, atq; ut ita dixerim, amplexi caulis est, ita
 pro sua natura, uel quiddam eiusmodi illico gerit. Nā
 ē germinibus radículas assidue inter folia mittit, qui-
 bus arboribus, murisq; obrepit quasi de industria à
 natura exhibitis: atq; ita humore auferens, exhau-
 riensque arefacit. Et si inferius succidatur, nihilo-
 minus uiuere, durareq; potest. Habet uel illud di-
 scrimen non mediocre in fructu: nam alius dulcis, alius
 uebementer amarus, tam in candida, quam in nigra,
 Indicium quod alium aues mandunt, alium minime at-
 tingunt. Hederæ ita se habet; in Asia hederam, &
 abietem parte superiore Syria, itinere à mari quin-
 dicrum enasci negant, sed in India uisam in monte, cui
 Mero nomen affirmant, quo Liberum patrem ortum
 fabulæ aiunt. Quæ de causa Alexander cum aliquan-

idem c. 2.
125.

6.5.5.3

6.5.5.4

4. b. 4. 4.

7.0.0.3

THEOPHR. DE PLANTIS.

do ex India descenderet, coronatus & ipse, & exeret
 tus ibat. Harpalus uero in Media tantum locare eam
 contendit, serendo saepe in ortis Babilonicis, & curio-
 se colendo, sed nihil efficere potuit. Hæc enim nullo
 pacto uiuere ualebat, sicut reliqua, quæ aduecta de
 Græcia sunt, hospitari patiebantur, hoc igitur ob co-
 li conditionem regio recusat. ^a Hedera adnascens mo-
 lesta uicinis est, immo necat. ^b & calida est. ^c & d
 germinibus suis radices quàm primum dimittit, non se
 cus ac serpyllum, & spissitate, acoreque suo aliquan-
 lum temporis durare potest, ueluti abrotanum. ^d Vi-
 ret autem perpetuo. ^e & frigus potius amat, locis .n.
 feruidis peruenire non posse nullum dubium est, sicut
 etiam pinus. ^f dissociata hedera locum tamen eundem
 petit, ut quæ aquis apposita est, quæ nemoribus gau-
 det facile suam rationem aperit hedera nanq; sicca, &
 calida est. ^g Hedera ad summam in multis creatur, &
 quod mirabilius, uisa est aliquando etiam in cornibus
 cerui.

^a h. 4. 20. ^b Helenium semine, & auulsione exit. ¹ Surculo-
 sum quidem est, minutisq; folijs constat, sicut Ser-
 pyllum, & sisymbrium. ² odoratum autem est tum ra-
 mis, tum folijs, & ad summam in totum odoratum sen-
 titur, sicut Serpyllum, & Sisymbrium. ¹ quæ lignosis
 etiam constant radicibus, & torridis. ^m Et licet ser-
 pyllum, sisymbrium, & belenium odorata sint, flores
 tamen

tamen nulli odorati creantur. ^a Causa uerò odoris pro- ^{a. c. 6. 29.}
uenit ex humiditate, siccitateq; moderata, sed magna
ex parte Serpyllum, & helenium, & reliqua generis
eiusdem acres reddunt odores siccitatis causa.

^b Hemodorum ab radice exit, & unicaule constat, ^{b. h. 8. 8.}
nec absimili caule surgit, uerum longe breuiori, & mo-
do capitis superne quiddam gerente, radice autem sub-
rotunda innuitur.

^c Herbaradicibus pluribus, & fixilibus non con- ^{c. h. 1. 9.}
stat. ut ordeum, & triticum. ^d Et tantum ab radice fo- ^{d. h. 7. 9.}
liata est.

^e Herculana spinæ genus est, & ad medicamenta ^{e. h. 9. 15.}
utilis.

^f Hybiscum ad medicamenta utile est. ^g Et radicem ^{f. h. 9. 15.}
hybisci aquam posse addensare aiunt si tritam inieceris, ^{g. h. 9. 19}
sub Diuoq; humorem posueris. Constat hybiscum
folio maluæ, maiori tamen, pilosiori, caule molli,
flore mellino, fructu maluæ caulibus proxima, usus
eius ad ruxta, & tusses à uino dulci, & ad ulcera in
oleo. Aliam si carinibus concoquis in idem aggrega-
re, ac ueluti congelutare posse affirmant, alias uim
attractoriam possidere modo magnetis, lapidis, atq;
succini.

^h Hirci barbula inter olera est, cui radix lon- ^{h. h. 7. 7.}
ga, & dulcis, folia Croco similia, nisi quod lon-
giora: Caulis brevis, super quem calix ampla, & bar-

THEOPHR. DE PLANTIS.

- ba de summo uertice cana pendens proluxa, unde no-
men accepit.
- a. h. 9. 1. ^{11.2} *Hircispina lachrymam gignit.* ^b & succus spon-
te consistit, spissaturq; lachrymæ modo, quapropter
cedere hanc opus nequaquam est. ^c *Hircispina large*
c. h. 9. 13. *in Arcadia nascitur, nec deterior Cretica existima-
tur, sed etiam uisu pulchrior.*
- d. h. 7. 14 ^d *Hirundinaria aduentu hirundinis suum excitat flo-
rem, & hæc partim naturalem, partim fortuitam ha-
berè causam apparet.*
- e. h. 3. 18. ^e *Humirubus rubi species est. Vide Rubum.*
- f. h. 6. 7. ^f *Hyacinthis exit cum Narcissus, & linum exeunt,
& ad coronas conficiendas coronarij his utuntur.*
- g. v. 2. 23. ^g *Hyphear in terra (mirandum) pullulare nequit,
sicut Stelis, & Viscum. uerum hyphear uocabulum
Arcadum est, stelis Euboensium, Viscum commune,
& inter se differre aiunt. Vide abunde Viscum.*

I



C. M. A. in lacu Orchomenio nascitur. a. h. 4. 11.

^b Iasione flos ex illis est, quæ folio uno b. h. 1. 21.
emergunt; descriptionem tantum plurium
ostendentes; in hac enim haud quaquam folium unum
quodq; discernitur, nec conceptaculo pars infima eget,
sed postremo in angulos exeunt, oleæ quoq; flos penē
ialis esse uidetur.

^c Idea Pinis picem producit. Vide pinum. c. h. 9. 2.

^d Ilex medullam magnam, atq; per spicuum habet, d. h. 1. 9.
nec uti robur. ^e Et utret perpetuo. ^f folia cum extremo, idem, h. 5. 7.
tum lateribus sinuata concidunt, ut roboris, smilacis,
e. h. 1. 15.
rubi, paliuri, & aliterum. ^g in montibus proprie na- 3. 4.
scitur, ut abies, pinæ strū, & alia. ^h fructum uerò sero f. h. 1. 16.
perficit, immo nonnulli anno reddere uolunt, ut lunt- g. h. 3. 4.
peri, & ilicis, germinationes in uere proventunt. ⁱ ra i. h. 3. 7.
dic in altam ilex dimittit, ut omnia syluestria. ^k Ve- k. h. 3. 8.
rum cum quibusdam datum sit, ut plura producat, ilex
granum puniceum producit. ^l Ilex folio Roboris est, l. h. 3. 16.
uerum minori, a culeatoq; cortice leuiori, quam ro-
bur, arbor ipsa magna assurgit, modo roboris, si locū,
solumq; adipiscatur idoneum, materies spissa, robu-
staq; radix al a admodum, atq; multiplex, fructus
glandosus; sed glans ipsa pusilla est, ueterem nouus
occupat; nam sero maturescit, quam obrem hæc à non-
nullis

- nullis bifera existimata est, fert præter glandem granum quoddam puniceum, & uiscum, atq; hyphear habet. Quapropter ut fructus quaternos habeat nonnumquam contingit binos proprios, binosq; alienos, Visci scilicet, atq; hyphearis. fert à Septentrione uiscum, a. h. 4. 18 à meridie hyphear. ^a Illici si detrahantur partes, potest
 b. h. 5. ul- interire, licet in eritus diuturnior sit. ^b Terebrum etiã
 timo. ex illice fit, ut ex rhamno, & Tilia.
- c. h. 7. 7. ^c Intubus inter olera numeratur. ^d Et post Vergi-
 lias germinat, & incunee uere tam caulem, quam flo-
 d. h. 7. 8. rem emittit, sicut omnia intubacea. ^e quæ ab radice tam-
 e. h. 7. 11 tum foliata sunt. ^f uerum Cicoreæ. s. Intubi caulis ma-
 f. h. 7. 11 gnus multisq; ramulis brachiatus, lentus item, & di-
 uidi contumax est, qua de causa pro uinculo eo utun-
 tur. radice quoq; germen laterale mittere potest, &
 alioqui radice prolixum est, ideoq; emori contumax est,
 decerptis enim quæ ad usum cibarium capi soleant, re-
 liquum generationis rursus capescit principium: euenit
 autem, ut pars eius alia, atq; alia floreat, idq; assidue
 fiat, usq; ad autumnum, quamquam durus caulis esse
 uideatur. Fert & siliquam, in qua semen circa postre-
 mas caulium partes, cuius plura sunt genera, ut Por-
 cellia, Candralia, & Aphaca, quas uide suo lo-
 co. ^g Intubus sine ampulla, utrinq; foliatus est. Cicho-
 rea etiam diutius floret, ut solaris. ^h Intubo erratico
 i. h. 2. 7. folia illico ab radice exeunt, ut capæ, & allio. ⁱ ue-
 rum

rum ad summam uniuersa genera Intulorum amara sunt.

^a Indus herba, quam indus attulerat ad rem uehementem mirum in modum pollebat, Non enim solum eden- 4. h. 9. 20
tibus, sed etiam tangentibus tantum genitalibus uim
dixere uehementem adeo fieri, ut quoties uellet coire ua-
leret. Et quidem qui usi fuerunt, duodecies egisse di-
xerunt. Indum autem ipsum qui uel magno, atq; robu-
sto corpore erat, septuagesies aliquando couisse fa-
tentem licuit audire: uerum emissionem seminis gutta-
tim fuisse, demumq; in sanguinem deuenisse. Mulie-
ris uero uehementius etiam citari libidinem, cum eo me-
dicamine usa fuerint, dicebatur. Hæc igitur uis siue
re narratur, mirifice omnes excedit naturas: tamen
quasdam constare, quæ citationes ad coitum facerent,
haud quaquam inepte putaueris, nam et alimentis
ipsis tam siccis, quam humidis uires eiusmodi, atque
etiam aliarum plerarumq; affectionum efficaces mani-
feste sentimus, aquam enim nonnusquam esse, quæ pro-
lem mulieribus largiatur, affirmant. ut apud The-
spias contra aliam apud Pyram esse, quæ sterilitatem
eisdem inferre possit. Causam enim sterilitatis mulie-
rum loci illius talem medici reddiderunt. De Vino di-
cemus in litera V, quibus in locis sterilitatem reddat.

^b Iouis flamma figura per similis est Ceraso, ue- 6. h. 1. 13
rum Iouis flammæ nucleus durius, Cerasi mollis, na-
scitur.

scitur ubi Tilia, in plenum ubi amnes, & rigua.

- a. h. 6. 1. ^a Iouis flos inter coronaria muneratur, & surculo
est, minutisque conditus folijs constat; frutexque red
ditur. sicut rosa, Sampsucum, Serpyllum, & cate-
ra eiusmodi. ^b Verum flos iouis, & flamma sine odo-
re est. ^c Et omnes prædicti flores semine exennt, nam
& ipse, & eorum radices ligno constant. ^d uere se
ostendit, & paulo post Lilium exit.
- e. h. 4. 11. ^e Ipnium in lacu Orchomenio reperitur, sicut Icma,
& mensi flora.
- f. h. 6. 7. ^f Iphij flos semine exit, ut Iouis flos, flammula, quo-
rum radices (ut diximus) ligno constant. ^g Iphium &
alia quædam ex coronarijs ante foliorum, & caulium
ortum flores emittunt, ut inter arbores amygdala.
- h. h. 1. 16. ^h Isirinchio folia ab radice exeunt, sicut bulbo, &
scyllæ, & in totum bulbosis, quorum non solum quod
primum oritur, uerum etiam caulis omnino sine fo-
lijs est.
- i. h. 1. 15. ⁱ Juniperus ex syluestribus perpetuo uiuet. ^k Et in
idem 3. 24. montibus proprie nascitur. ^l At Macedones incolæ
k. h. 3. 24. Juniperum florere non arbitrantur, nec etiam Scissi-
l. h. 3. 6. mam agrestem, nec ilicem; nonnulli binas Juniperos
esse dicunt, & alteram florere quidem, sed fructum
non ferre; alteram non florere, sed protinus fructum
ostendere, ut ficus, poma præcidua, itaq; penè fieri,
m. h. 3. 6. ut sola hæc arbor fructum in biennium habeat. ^m Et rar-
dissime

dissimè omnium fructus suos perficiunt *Iuniperus*, *Ce-* idem sere di
cit c. 1. 13
lastrus, & *Ilex*. *Iuniperus* enim anniculum habere ut-
 detur, quippe cum nouus anni exacti fructum occupet;
 utq; aliqui uolunt nec maturari solet; quapropter de-
 cerpitur, & aliquantum temporis reſeruatur: quod si
 in arbore relinquatur marceſcit. ^a facillimè uerò auge- a. h. 3. 7.
 tur, & per summa innititur, ueluti *Cedrus*. ^b Idei di- b. h. 3. 12.
 cunt *Iuniperum* similem esse *Cedro*, sed folio maxime
 distat, quippe *cedro* durum, acutum, spinosumq; *Iu-*
nipero mollius, excelsior quoq; *iuniperus* nasci uidetur.
 Cæterum alij nominibus minimè diuidunt, sed ambas
Cedros appellant. *Cedrum* tamen cum additione *Ce-*
drum nuncupant. Vide *Cedrum*. ^c *Iuniperus* & *abies* c. h. 4. 1.
 excelsa quidem nascuntur, sed non in excelsum sicut etiã
 circa *Cyllenium* promontorium. ^d Tectis commoda, co d. h. 1. 8.
 ptiosior est, *pinus*, *abies*, *Iuniperus*. ^e *Gummam* uerò e. h. 9. 1.
Iuniperus fert, sicut *abies*, *pinus*. *Terebinthus*, &
 aliæ, sed non ex cortice, uerum in uase. ^f locis algenti- f. c. 1. 16.
 bus *iuniperus* perdurare ualet, & plus caloris sortitur,
 sicut *abies*, *pinus*, & *Cedrus*; super his enim nec ni-
 uem posse durare autumat, scilicet ratione caloris.
 Item tortuosa hæc eadem esse, perueritq; ob calorem
 medullæ asserit. ^g Verum cortex sponie detrahatur, si g. c. 3. 23.
 cut uiti, & *Tiliæ*; In his enim natura ipsa, quæ cõ-
 moda sit, ostendere, cum corticem disgreget, & tan-
 quam alienum reiciat, damnosum autem est omne alie-

Q

num;

THEOPHR. DE PLANTIS.

num; sicut etiam quod aridum est.

a. h. 4. 13. ^a Inguinalis herba semen nigrum non absimile semini iunci habet.

b. h. 1. 8. ^b Iuncus ex illis est, quæ in lacu, et paludibus nascuntur, & in septa pariter, atq; æqualia conspiciuntur.

c. h. 1. 13. ^c E nodis autem est Iuncus, seu Tipha, & gladiolus; sed ita enodes accipi uolo, ut nodos paucos naturæ ordine habeant.

d. h. 4. 8. ^d Iunci quoq; lapides apud mare reperiuntur, quos nemo uisu à ueris potuit discernere.

e. h. 4. 14. ^e tria uerò sunt eius genera, ut nonnulli distinguunt. acutus, et sterilis, quem marem appellant: frugifer, quem atriferum uocamus, quoniam semen nigrum ferat, crassior hic atq; carnosior. Tertius, magnitudine, crassitate, carnositateq; insignis, qui mariscus uocatus est. Ex his atrifer per se suo genere prouenit: acutus, atq; mariscus eodem cespite exeunt, quod absurdum apparet, uisq; mirabile fuit, toto cespite iunci deportato quippe pars maior steriles erant eodem exorti frugiferi autem pauci. Igitur de hoc cogitandum. fructus omnino minor habetur: commodior autem ad texendum mariscus, quia mollis, carnosusq; est. Omnino frugifer in Callum de regulari furculo ipso tumescens, mox ueluti oua parit, circumdantes enim spicatum pediculo tunco lineari affixos initio gerit, quorū summitatibus paululo laterales orbes uasculorum leuiter hiscentis inducit. Huius semen exiguum effigie cuspidis sagittarum ingerit:

gerit : nigrum non absimile herbæ inguinalis , uerum
exilius , radice longa adhæret , multoq; crassiore , quàm
acutus . Hæc omnibus annis moritur , deinde altera rur
sus à iunci cacumine defigitur : Quod uel uisu percipi
facile potest : quippe aliæ siccae , aliæ uirides demissæ
cernuntur . caput capis , & Gethyis simile , ut pote
quod in unum ex pluribus cōglobatum , prælatumq; in
ferius , tegumentisq; subrubris intectum constet . Er
go proprium his radicibus eueniat , si quidem per an
nos exarescant , ac desuper denuo generentur . Talis
tuncorum natura intelligitur .


^a Iuncus odoratus trans libanum montem , inter ip- 4. h.9.7.
sum libanum , & alium quendam montem paruum , ual
le minima exit , ubi etiam & calamus odoratus , uerum
ea parte qua calamus , & iuncus proueniunt , lacus in
amplum spātiatur , iuxtaq; eum pallustribus siccatis
isti assurgunt occupant locum pl. s. quam triginta sta
dia . Virides nequaquam esse uidentur , sed sicci ; for
ma uerò nihil ab alijs differunt , locum ingredienti pro
tinus odor assirat , non tamen longius spirat , & ad un
guenta his utuntur .

^b Iuncus calidus est , sicut aquatilia omnia , ut arun- b. c.1.26.
do , & gladiolus , à gelu proinde torpere hæc eadem
minime possunt . ^c radix Iunci , Iridis , arundinum , atq; c. c.6.17.
omnino generis aquatiliū , uiridis nihil olet , siccata
autē redolet . ^d Calamus , et iuncus in Syria odorati sunt . d. l.6.17

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. c. 6. 13. ^a Iris odorata est, & à gratia palati agnomen acce-
 b. c. 6. 17. pit, sicut Anethum, & fœniculum. ^b Verum radix.
 idem 6. 22. Iridis uiridis nihil olet, siccata uerò redolet. ^c Iris in
 c. c. 6. 28. Illyride odorator est, propter locis tractus.

L

- a. h. 3. ^{ulti}  ^{mo.} ^a Ambrusca fructus cum fluuidarum fru-
 b. h. 6. 32. ctu rubescit, & similis Smilaci est. ^b Sur-
 g. h. 6. 7. git uerò similis atragenæ, & arbores scâ-
 dere solita est. ^c flos specie constat racemi, candi-
 dusq; est.
 d. h. 3. 4. ^a Lacara in plano etiam descendit. & auctu fa-
 cillima est.
 e. h. 1. 16. ^a Lactuca folia ab radice exeunt, & folijs iam per-
 fectis caulis conuenienter assurgit, ut Ocymi, Apij,
 & frumentorum, uerum caulem primo mitem, post
 f. h. 1. 19. horridum spinulis gerit. ^f succum aquosum habet, ^g se-
 g. h. 7. 1. men lactucæ quarto aut quinto die erumpit. ^h caule ue-
 h. h. 7. 23. rò recto facile regerminant, immo regerminatos cau-
 les suauiores affirmant, primos enim lactuosos esse, atq;
 amaros, ut pote nimis concoctos. Alij e contrario uo-
 lunt secundos scilicet lacte refertiores constare, sed dul-
 ciores sentiri, quandiu teneri sint. ^a Lactuca diminuta
 h. h. 2. 20. teneritatis, alimentiq; probi ratione melior, sapidiorq;
 euadit

euadit, sicut octimum, & alia.^a breui radice illa con-
 stare notantur, lactuca, portulaca, breui in quan-
 tum ea recta, quam deorsum mittenda est, tum ipsa,
 quæ in latus porrigi solent. lactuca ea ipsa multiplici
 radice quasi omnino caret, sed fibris tantum cohaeret,
 quoniam uni stirpem hanc (ut ita dixerim) maxime
 omnium esse putaueris. Lactuca translata radice est
 breuior. quam sata, illa enim ex lateribus magis mit-
 tit, Breuior etiam sylvestris quam urbana, & super-
 ne multicaulis est. Semen lactucæ lanugine obducitur.
 b. plura sunt etiam eius genera, & candida dulcior, b. h. 7. 4.
 atq; tenior, & tria genera addunt; Laticaulis, rotun-
 dicaulis, & Laconicum; huic folium carduo simile, &
 recta, ampla, & a caule minime brachiata hæc est. In-
 ter latas adeo quædam laticaulis fiunt, ut pro ualuis
 hortorum hisce nonnulli utantur: Quæ uero lactis ad-
 modum copiosa, & folio pusillo, & caule candidiori
 consistit. Sylvestris similis est. c. Verum Eruca, &
 uermiculi lactucis innascuntur. d. fit autem lactisuccatio
 a caulibus lactucæ, & lactariæ, at plurimum succi per
 incisuram manent, quorum nonnullos statim in uasa col-
 ligunt, sicut lactariæ, siue lactuca Caprinæ, uoca-
 tur enim hoc etiam nomine, atq; in totum quibus lactis
 copia sit, quibus minus, lana eorum succus excipitur,
 ut lactuca. e. Lactuca sylvestris folio breuior, quam
 sativa est, idq; consummatum aculeatur, & caule si-
 mili.

THEOPHR. DE PLANTIS.

mili modo breuiori perficitur, succum acrem, ac medicatum habet.

- a. h.9.12 ^a Lactariarum plura genera, & quod maritimum granum appellant, folio est rotundo, caule, totaq; magnitudine ad palmum, fructu candido, demetitur cum uua nigrescere incipit, siccatusq; fructus tritus potest datur acetabuli tertia parte, mascula autem uocitata olea folio constat, & magnitudine cubitum aequat; huius lac cum uindemia incipit, exprimunt, & praeparato utuntur, purgat inferius. (^b Hæc loto fructum similem parit, & arbor non est, sed frutex terrenus est) Myrtaria uero cognominata candida, lactaria est, folijs myrti condita, uerum aculeatis parte postrema, sarmentula in terram demittens longitudine palmi, quæ nõ simul, sed alternatis annis fructificant, alia hoc anno, alia postero, quamquàm omnia eadem radice exorta, loca montuosa desiderat; fructus nux appellatur, demetitur cum hordeum turgescit. & exiccatus, purgatusq; datur elotus cum papaueris nigri duabus partibus, ita ut totum modo acetabuli sit. Trahit pituitam per aluum, at uero si nucem ipsam placeat dare, trita dabitur ex uino dulci, aut cum sesema tosta, torrefactaq; comedenda. Ergo hæc folijs, succis, fructibusq; utilia constant. Lactaria ad medicamenta utilis, ex qua Hippophaes, quod optimum confici apud Tegeam nouimus, maximeq; haberi in pretio.

Lanaria

^a Lanaria spinosa est. ^b Et æstate floret, sicut con- ^{a. h. 6. 3.}
secratrix, flos aspectu pulcher, sed caret odore. ^{b. h. 6. 7.}

^c Lappa amplexi caulis constat, sed si non habet, ^{c. h. 7. 8.}
quibus accumbat, humi serpit, & humicaulis dici po-
test ceu petina etiam. ^{d. h. 7. 14} ^d notabile & hoc in lappa est
quæ suæ asperitatis causa uestibus adhærescit, ut dif-
ficile auferri possit. Nasctur enim flos in eo ipso hir-
suto, & aspero non exiens ^e neq; euidens, sed intus ma-
turescens, & semen pariens, ut illis simile sit, quod in
galeis, ac uiperis euenit, illa enim ubi intra se oua pe-
pererunt, mox animalia gignunt, & hæc florem in se
continens, concoquensq; fructum deinde parit. ^{e. h. 8. 8.} ^e non-
nulla etiam sunt, quæ plus inter aliqua ualeant, pro-
pria eorum putantur, exempli gratia. Eriunga Erut,
& Lappa Lentis, quod altera eruum potissimo uin-
cat causa imbecillitatis, altera inter lentem, maxime
coalescat, quæ quidem Eriungæ proxima est, etenim
pari modo aggreditur, & herbam totam, ueluti brac-
chijs capeßit, nec secus angit, atq; obstrangulat. ^{f. h. 6. 4.}

^f Lappago folium iuxta aculeum gerit, ut phleum ^{f. h. 6. 4.}
tneuris, Ononis, Tribulus, Spinamuralis, & alia
pleraque.

^g Larix radicem lignosam habet ueluti abies, & pi- ^{g. h. 1. 9.}
nus. ^h & folia cum extremo, tum lateribus sinuata con- ^{h. h. 1. 16}
cidunt, ut Cedri, & Cedriæ, quæ extremitate pun-
gentia sunt. ^{i. h. 1. 19.} ^k Succi pingues, & in lachrymæ modum ^{k. h. 9. 1.}

THEPHR. DE PLANTIS.

- d. h. 2. 2. ut oleæ, lauri, nucis, amygdalæ, & cætera. ^a Verum ex semine larix tantum nascitur, ut Abies, &
- b. h. 4. 16. pinus. ^b si quis larici cacumen auferat, uel palmæ, ste
- idē c. 5. 24. rilefcere ambæ uidentur, nec penitus interire. ^c Cor-
- e. h. 5. 1. tex uerò detrahitur, ut abieti, & uere istæ ceduntur.
- d. h. 9. 2. ^d Picem larix producit, ut pinus. ^e & cum perpetuo
- e. c. 1. 21. uireat, serò perficit fructum, sicut omnes semper uiren-
- f. c. 6. 17. tes. ^f Et hoc adnotandum in larice, abiete, pino, &
- cupresso: quòd diuersi in his odores, saporesq; sunt, et in una, & eadem planta hoc patet.
- g. h. 1. 11 ^g Laserpitium natura radicibus tota constare uide-
- h. h. 3. 2. tur. ^h et aliquando ex pluuis orta est, in locis enim ubi
- idem fere, e. 1. 5. nunquam uisa erat, extitisse aiunt, ⁱ Verum cum ur-
- i. h. 3. 3. bana plus fructificant. solum ex syluestribus urbanis
- maturiora, suauioraq; tradunt, Sorbum & cornum
- k. c. 1. 19. scilicet, & ex minoribus. ^k quæ culturam non patiun-
- tur ut Laserpitium, & Capparis, & in leguminum ge-
- nere Lupinum, quæ quidem uel natura esse Syluestria
- l. h. 6. 3. dixeris ^l uerum nunc in totum de Laserpitio indicandū
- est; cui radix multa, crassaq; , caulis quantus ferula,
- & crassitudine ferè proximus; folium quod māssetum
- uocant, apio simile est: semen latum foliaceum, scili-
- cet, quod folium appellatur; caulis annuus, sicut feru-
- la. Ergo uere ineunte māssetum hoc exit, & pecus eo
- purgatur, pinguescitq; uehementer, & carnes mirabi-
- lem in modum suaves redduntur post hac caulem edie
- boninum

hominum cibo idoneū omnibus molis, elixum, assumiq;
 corpora eo quoq; purgari ferunt: Quadraginta die-
 bus succus capitur duplex, alter ex caule, alter ex ra-
 dice. Qua de causa alterum Scaparium, alterum radi-
 carium uocant. Radix nigro cortice tegitur, eumq; de-
 trahere solent, sunt ueluti certæ mensuræ cedendæ radi-
 cis, quibus quantū conferre putetur ad futuram cæsura
 reseruantes, reliquum abscindunt. Nec .n. deuic, neq;
 plus constituto cedere licet: corrumpitur enim putre-
 scitq;, si diu mansit, præparant id, conficiuntq; in Py-
 ræum portum aduectum hoc modo: Cū in uasis conie-
 cerint, farinamq; admiscuerint; quatiunt longo spatio
 temporis: hinc etiam colorem capeßit, & conditum ita
 incorruptum perdurat. Præparatio, cæsuraq; ita se
 habet: locum Africæ amplum occupat, ampliorem,
 quam quatuor Stadiorum milia in hortis Hesperidum
 ferunt: sed maiorem partem colligi apud Syrtes. Pe-
 culiare huius culta fugere loca proditur, quamobrem si
 colatur, mitescatq; solū; deuia atq; omnino degenerat:
 ut pote natura culturæ aspernans, ferocitatisque con-
 stans ueneraculum. Cyrenenses annis septem prius,
 quā ipsi urbem habitarent, Laserpitium extitisse af-
 firmant. Habitabant uerò annos maxime trecentos,
 usq; ad Simontidæ Athenis magistratum. illi sic refe-
 runt. Alij radicem Laserpitij cubitalem fieri tradūt,
 aut paulo maiorem: Hanc in medio extuberare in ca-

R

put

put, quod sublime penitus extat, ut ferè super terram
 esse appareat: Vnde primum quod lac appellant erum-
 pit, dein caulis assurgit, ex quo magydaris; & quod
 folium dicitur, exeunt: folium id semen est; quod cum
 Myster ingenue post canticulam flauerit, discutitur:
 atq; ita laserpitium nascitur, eodemq; anno radix con-
 sumatur, & caulis: Sed hoc haud quicquam peculiare
 notetur: nam alijs quoq; idem tribuitur, ni dixeris;
 quod discussum id protinus nasci potest; ortum pecu-
 liarem sortiri, supradictisq; præterea diuersum accipi
 posse. Ad hæc circumfodiendum id annuum censent:
 Nam si relinquatur semen omne, caulemq; totum pro-
 ferri, & de teriora tam hæc, quam radicem reddi exi-
 stimant: Defossa autem fieri meliora scilicet solo suba-
 clo, beneq; gluto. Sed huius contrarium illi uolunt, qui
 culta recusare id inquiunt. Mandi quoq; radices in
 aceto recens decisas referunt, folium colore aurum
 æmulatur. contrarium etiam quod pecora folio esitato
 purgari minime indicant; nam & uere, & hyeme pe-
 cus ad montem dimitti affirmant. Cibus non solum hoc,
 sed etiam altero quodam abrotano simili administratur
 Vim ambo calefactoriam sortiri planè uidentur, &
 purgare quidem nequaquam ualere, exiccare autem,
 & concoquere unice posse. Quod si qua pecus agre-
 scens, aut aliàs minus benè se habens ingressa sit, mox
 cam sanari, aut emori aiunt, sed magna ex parte posse
 seruari.

seruari. hæc igitur utra tandem sint modo querendum.
 Quod uerò magidarim uocant, nimirum à *Lascerpitio*
 differt; tenerius enim, minusq; uehemens. Id sentire,
 & sine lascre est. necnon & aspectu manifesta exper
 ta homini constat. Nascitur in Siria, nam apud Cy
 renam & monte Parnaso largè prouenire eandem af
 firmant, sed quidam *Lascerpitium*, id appellant; An
 culta id quoq;, modo *Lascerpitij* fugiat quærendum.
 Verum apud montuosa nascitur. ^b Et lachrymam tum
 in radice, tum in caule habet, & gustu lachryma *La*
serpitij uehemens est, modo ipsius *Lascerpitij*. Quod
 enim *Lascer* uocant, lachryma est. ^c Quorum autem
 & caulis, & radix inciditur, horum caulis antea fer
 rum recipit, ceu *Lasceris*. Eorum deniq; succum alte
 rum cauliam, alterum radiciam uocant præstantior ra
 dicias est; purus enim, translucidus, & siccor, cau
 lias uerò humidior, & ideo farinam ei inspergunt, ut
 satis coagulari possit. Incisuræ tēpus idoneū Pœni no
 uere. *Lascer* enim illis legendum natura largita est. ^d Ve
 rū uis omnis medica uel in radice, uel fructu, uel ramo,
 respondent his, quæ in gustatu quandā uehementiā mon
 strāt, ut *Lascer*, *Capparis*, *Rumex*, *Satureia*, et *Cunt*
la, & *Thymū*. Sed de lascre, et lupino eadē ratio est.
Lascer enim non æquē uehemens est, quia copiosior,
 humidiorq; alimento uescatur, *Lupinum* syluescens,
 atq; luxurians redditur infecundum folium *lasceris* sua

d. h. 6. 5.

b. h. 9. 1.

c. h. 9. 22

idem fere. 2.

6. 17.

d. c. 3. 1.

c. c. 6. 19.

ue, fructus mollis est propter humorem.

- a. h. 1. 8. ^a *Laurus cortice tenuis est, ut etiam Tilia.* ^b Et
 b. h. 1. 9. radices crassiores, æqualiores alijs habet, sicut olea.
 c. h. 1. 13. ^c *uerum enodis est, sicut Iuncus, & alia, quæ corti-*
 idem. 5. 4. *ce leuit, & corpore concauo, lassoq; surgunt.* ^d Viret
 d. h. 1. 15. *& Laurus ex urbanis perpetuo, sicut palma, Myrtus,*
 e. h. 1. 18. *& alia. ^e sed lauro caro in nucleo est, sicut oliua, &*
 f. h. 1. 19. *alijs. ^f succus pinguis est. ^g & arbor hæc inter urbanas*
 g. h. 1. 24. *reponitur. ^h Aliquando Laurus, & myrtus degene-*
 h. h. 2. 3. *rant, nec colorem quidem seruant, sed ex fructu rubro*
 i. h. 2. 7. *fieri nigrum inquiunt, ut in Antandro: ⁱ uerum serere*
 j. h. 3. 4. *crebras lauros, punicas, & myrtos præcipiunt, & nō*
 k. h. 3. 4. *plus, quam quingentos pedes distantes. ^k Et ex syluestri*
 l. h. 3. 6. *bus perpetuo uirent. ^l Et ante fauonium, uel statim*
 m. h. 3. 8. *post fauonium germinat, sicuti alius.*
 n. h. 4. 6. ^m *Laurus uiam producit, et fructifera est, quan-*
 o. h. 4. 8. *quam non omnis, sed genus quoddam, uerum sterilis*
 p. h. 4. 8. *copiosius, quàm masculam nonnulli appellant. ⁿ Sed*
 q. h. 4. 8. *loca feruida amant Laurus, & mirus, & minime in*
 r. h. 4. 8. *frigidis durare affirmant, minusq; myrtū, argumentoq;*
 s. h. 4. 8. *captunt. Quod in Olympo Laurus multa, Myrtus*
 t. h. 4. 8. *nulla omnino. in Ponto autem toto neutra est, quan-*
 u. h. 4. 8. *quam summo studio, omniq; solertia serere conātur ad*
 v. h. 4. 8. *usus religionis. In Propontide uerò Myrtus, & Lau-*
 w. h. 4. 8. *rus montibus, multis in locis prouenit sed fortasse sunt*
 x. h. 4. 8. *etiam, quæ locorum propriam poni debeant. ^o In mari*

rubra

rubro *Laurus* exit, & ex toto similis est *Afric.*^a sed^a h. 4. 14.
 sunt quædam, quæ senescunt quidem, putrescuntq; ue-
 locius, sed ex iisdem latere suo germinant, ut *Lauri*,^a 21. 20.
 mali, punice, & auidarum aquæ pars maior.^b Lau-^b h. 4. 20
 rus & brassica uittem offendunt, olfacere quippe eam,
 & attrahere dicunt; quamobrem germen cum illis pro-
 pinquum fuerit recedere, atq; auerti; ut pote inimicū
 fugiens odorem.^c Ex *Lauro* semles, & pulchros, &^c h. 8. 5.
 præleues baculos faciunt.^d *Latinus* ager aquis totius^d h. 5. 9.
 abundat, & plana *laurum*, *myrtumq;* habet.^e Et ex ea
 terebrum faciendum censent.^e h. 5. nli-
 mo.

^f *Laurus* tenuifolia figura similis est *Sorbis*.^g Lau-^f h. 3. 12.
 rus latifolia folium molle, atq; oblongum habet, sicut^g h. 3. 13.
Sambucus. Vide *sambucum*.^h *laurus* etiam propter^h c. 1. 3.
 tenuitatem auulsione germinare nequit, nisi difficile,
 causaq; eius quoq; siccitas est, atq; raritas. Quod .n.
 raro, lassoq; corpore constat, infirmius est, quàm ut
 humorem; caloremq; seruare diutius possit. Verum
 propter regerminationem à radice robustior est, &
 mori contumax.ⁱ Sed fœminæ arbores facilius augeriⁱ c. 1. 9.
 possunt, quàm mares. (ut etiam in nomine præcipue ui-
 deri potest) quoniam natura humidiores; solutioresq;
 creauerit, *punica* enim, & *ficus*, & *utis* auctu facti
 les sunt, *cupressus*, *laurus*, *pinus*, & *olea* difficiles.
 quanquam ex his quædam meatuum reclinudinem ha-
 beant, nerum aut densitas, aut utrunq; impedimento
 est.

- est, facit enim & siccitas ne satis augeri possint. Ad
 hac imbecillitas plerisq; in causa est; nam quæ debilia
 sunt, difficile augeri, nutricariq; possunt. ^a Laurus
 facile perit, quamvis non copiose fructificat (vitam
 enim longiorem habent arbores infœcundæ) sed in lau-
 ro obraritatem, infirmitatemq; hoc patet. ^b hoc etiam
 ostentum narrant, aliquando laurum in Platano or-
 tam esse. ^c vitibus laurus nocet, sicut brassica. ^d Et
 umbram amat, sicut pirus, & punica. ^e Et aliquan-
 do sponte nascitur, & fructu suo creatur. ^f Et licet
 breui putrescat, tamen non breui uermiculatur. ^g a ge-
 lu non facile corrumpitur, quam uis rara, sed resistit,
 perduratq; sui caloris potentia. ^h fructus lauri pinguis
 sentitur, sicut etiam abietis, pini, & piceæ.
ⁱ Laurus Alexandrina fructum super folijs gignit.
^k Leguminum alia folia rotundo constant, ut faba,
 maxima ferè pars, alia oblongiori, ut Pisum, Cicer,
 Cicera, & reliqua huiusmodi. alia item neruata, alia
 sine neruo, uena. sed omnia uide suo loco.
^l Lecticrotaria Aceris species est.
^m Lens ut crassescat paxillo dimittitur. ⁿ & plura
 sunt eius genera. ^o & serò scriitur, sicut aphaca, & pi-
 sum. ^p Caulis lentis in latus potius tendit, ut Ciceris,
 & Erui, & maximè inter Legumina fertilis est. &
 summatim quæ semen ferunt pusillum, copiosius fer-
 me fructificant, ut etiam inter olera Cuminum. ^q Se-

men profert leuiter latum, ut aphaca. ^a uerum legumē ^a 4. 8. 9.
 hoc secundum loca coctibile, & incoctibile fit, sicut ^{idē 4. 4. 6. 3.}
 faba, sunt enim loca permulta, quæ semper legumina
 coctibilia ferant, & alia, quæ incoctibilia. ^b lens suo hu ^b 6. 4. 16.
 more animal creat, sicut lenticula, & pisum, & alia.
^c uerum lappa, quæ simul prouenit, lentē interimmit, & ^c 6. 5. 22.
 hoc euenit, quia pabulum tollit, tam quod terra mini-
 strat, quam quod à sole, & aere ueniat. ^d Et cum præ ^d 6. 6. 13.
 arida lens sit, sine ullo odore est. Lens ampla efficitur,
 si semen stercore bubulo in uolutum feratur.

^e Lentiscus lachrymam gignit, quæ mastican red- ^e 6. 9. 1.
 dit. ^f Et omnia, quæ lentisco, aut scyllæ inserta terræ ^f 6. 5. 7.
 mandantur, meliora euadunt; etenim utraq; humorem,
 caloremquē aliquem habet, & fit ueluti in sitio quæ-
 dam. ^g Adde etiam, quod minus uermiculationem sen ^g 6. 5. 11.
 tiunt, odoris, ferui orisq; causa.

^h Ligusticum ad unguenta idoneum est. ^h 6. 9. 7.

ⁱ Lignum illud dicitur, quod fissile est. ⁱ 6. 1. 4.

^k Lilitum & rosa caulibus concisis, ut etiam gramen ^k 6. 2. 2.
 exeunt. ^l flos lilij uariari liquido patet, & purpureus ^l 6. 6. 6.
 est, uerum omnia unicaulia ferē assurgunt. bicaulia
 raro, quod Cali terræq; rattoni attribuēdum est. Sin-
 gulis caulibus alijs unum lilium, alias plura exeunt:
 pars enim postrema effundit; sed hæc rariora, radice
 copiosa, caruosa, orbiculataq; adhæret, fructus de-
 tractus germinat, & lilium reddit, uerum minus; fa

- a. idem h. 1. 8. ^{g. 1. 1.} ^a lachryma cæcum quoddam confluutum, quod
 b. h. 6. 7. ^b etiam ferunt, ut dictum est. ^b Exit autem nonnunquā
 uere cum uiola alba, aut paulo post.
- c. h. 8. 7. ^d ^c Linum lolium gignit. ^d sic enim mutatio, & linum
 d. c. 3. 21. lolij speciem capeffit. hæc ergo mutatio, si uere aiunt,
 idem 4. 6. corruptio quædam propter humoris nimietatem esse ap-
 pareat, sic enim cum imbres incesserunt, mutato autem
 principio diuersum sit, quod inde erumpit, necesse est:
 lolium uerò aquam uehementissimè amat.
- e. h. 1. 8. ^e Linogenistæ cortex multiplex tunicis cadit.
- f. h. 3. 22. ^f Limodorum sænum græcum interimit protinus ra-
 dici adnascens.
- g. h. 6. ul- ^g ⁸ Litrium quod sine odore est, autumno florere in-
 timo. cipit, sicut Crocum montanum. ^h semine uerò exit, si-
 h. h. 7. 12. cut astula regia, pugio, & bulbus, ⁱ litrium carnis,
 is 2. 1. 4. succiq; bonitate uacare minimè debet, ceu amaracum.
 7. 9. recens, & cætera generis eiusdem, has enim tantum
 k. e. 1. 10. modo radices feri, transferriq; posse uidetur. ^k Verum
 2. 2. 1. aculeis constat, & radice in caput excrescit, ceu ne-
 l. e. 6. 21. pa, Tiphym, & spina regia. ^l Excoctio in flore est,
 & odoris grauitatem suis quandam præsentat, ut Li-
 lium, & eiusmodi.
- m. h. 1. 8. ^m Lolium ex lino gignitur. uide Linum. ⁿ necnon tri-
 idē c. 2. 21. ticum in lolium transit. ^o uerum cum arandi tempora
 n. h. 2. 5. uniuersi frumenti duo uidentur statuere, alterum hyber-
 o. h. 8. 5. num, alterum uernum, quo etiam legumina ferunt.

Ad hæc

Ad hæc ingenere frumeotorum aliud purum lolij na-
 scitur, ut Ponticum, & Aegyptium: purum & si-
 culum satis, & præcipue agrigentinum sine lolio exit,
^a Lolium uernum nequaquam esse, quemadmodum reli ^{a. h. 8. 7.}
 qua herba, quod quidem affirmare conantur, rationi-
 bus illis constat. Confestim enim hyeme incunte id ex-
 ortum patescit, multisq; differt, habet namq; angustum
 folium, & pilosum, & pingue, eiusq; peculiare pin-
 guitudo notatur, pilositas enim Auenæ etiam datur.
 Hoc igitur proprium eorum animaduersum est, atq;
 etiam lini: nam uel ex hoc ipso lolium fieri uolunt. ^b na- ^{b. b. 8. 8.}
 scitur etiam ex hordeo, & tritico corruptis, uel si id ^{idem c. 4. 1.}
 minus, nasci quidem inter triticum solitum esse nulli du-
 bio est. & Syluestre penitus est. ^c licet inter triticū, ^{c. c. 5. 22.}
 & ordeum proueniat, sicut auena. ^d uerum non solum ^{d. c. 4. 6.}
 ex tritico lolium fit, sed etiam ex lolio fit triticum, ^{idem c. 5. 3}
 mirandum sane est, quamorbeim his ipsis ut ratione ua-
 cantibus persuasum quibusdam est, nullam mutationē
 eiusmodi fieri posse, sed frequentia imbrium lolium pro-
 uenire, atq; consistere, quod etiam per se facere ip-
 sum, patescit locis admodum pluuiis. (^e ut sponte na- ^{e. c. 4. 17.}
 scatur) nullo penitus tritico, ordeoq; disperso: Sed obie-
 ctiones istæ conuinci à rebus ipsis plane uidentur. per-
 multi enim (ut aiunt) cum triticum, uel hordeum ser-
 uissent, lolium messuerunt; Ergo generis illam mutatio-
 nem ratione utraq; fieri posse, id est seminis alteratio,

THEOPHR. DE PLANTIS.

aq; radices debemus statuere. Ad hæc homines exper-
ti rem rusticia, folium protinus nascens lolij esse affir-
mant, quod sit pinguius, & uiridius, & angustius,
nec postmodum in eiusmodi formam transire.

- a. h. 7. 9. ^a Lotus herba in caule tantum foliata est, sicut ere-
b. h. 7. 14 pti, nigella, foliosa, & uiola alba. ^b Et licet nomen
unum habeat, tamen plura sunt eius genera, ut ferme
æquiuoca sint, folio, caule, flore, fructuq; discreta.
c. h. 9. 7. ^c ad unguenta loto utuntur, sicut Cassia, Cinamomo,
d. h. 5. 5. & alijs. ^d Ex loto arbore simulachra sculperc solent,
e. h. 4. 16. ut ex Cedro, Cupressso, & Buxo. ^e lotus Aegyptia
in planis parte maxima prouenit, cum rura inundantur
huic natura caulis similis fabæ, & fructus eodem mo-
do, uerum minores, gracilioresq;. Nascitur fructus
in capite modo quo in faba, flos candidis lilijs folio-
rum angustia pruximus; multi, ac densi promiscui exeunt,
sole occidente se comprimunt, caputq; integunt, ad or-
tum aperiuntur, & super aquam assurgunt, idq; facit,
dum caput perficiatur, floresq; defluant: Capitis
magnitudo quanta papaueris maximi, & percingitur
incisuris, non alio modo, quam papauer, nisi quod in
his fructus frequentior habetur, qui milio non ab simi-
lis est. In ^f Euphrate caput, floresq; mergi referunt,
atq; descendere usq; in medias noctes, tantumque abi-
re in altum, ut ne demissa quidem manu capere sit: di-
luculo deinde redire, & ad diem magis, Sole Orien-

te iam extra undas emergere, floremq; patefcere, quo patefactio amplius insurgere, ut planè ab aqua abfit alte. Ægyptij capita ipsa accrius putrefaciunt, cūq; tegumenta putreuerint, in flumine lauando separant fructum, & siccantes pinsentesque panem faciunt, eoq; cibo utuntur. Radix loti Corflum appellata rotunda est, cotonei mali amplitudine. Cortice nigro quali nux castanea tegitur, corpus internum, candidum, elixum, assumq; in specimen albumenis uertitur, gratum cibus, mādatur etiam crudum sed gratius decoctum seu aqua, seu pruna. Quæ non nisi in aquis comperiri queant, tot ferè explorata habentur; locis autem arenosis haud procul à fluuio nascitur terrenum, quod mali nathallam appellant figura rotundum, magnitudine Messpilii, sine nucleo, sine cortice: folia ut gladiolus mittit, hæc incolæ legentes in brito hordeaceo decoquunt, dulcia admodum efficiuntur, hisq; pro bellarijs utuntur. Omnia nascentia inibi bobus, pecoriq; cibo idonea sunt. Sed inter omnia genus quoddam præstantius stagnis, paludibusque exoritur, quod & uiride pascit, & siccatum bobus hyeme præbetur. Est etiam aliud frumentis sponte internascens, quod cum sincerum à frumento secreuerint leuites pinsentes, hyeme solo humescite ferunt: editum metunt, & siccant, atq; ita bobus, equis, iumentisque, id quoq; cum fructu subnascente, pabulo præbent, fructus magnitudine scsamæ, ro-

- tundus, colore uiridis, bonæ frugis maiorem in modum
 a. c. 4. 7. hæc ferè in Aegypto superuacua notari possunt. ^a ue-
 rum loti semen non simul nascitur, sed particulatim, ut
 bulbi, & auenæ, & tale est, quod uel certè fructum
 complectitur, ut facile absolui non possit, neq; parem
 capere crassitudinem: sed lotus arbor fructum proxi-
 mum loti herbæ parit.
- b. h. 6. 7. ^b Lucernula florem æstate mittit, ut Iouis flos,
 Cerinthus, tephium, sansucum, & phrigium.
- a. h. 1. 7. ^c Lupinum loca frigida, & niuosa amat. ^d Et man-
 d. d. 1. 13 di difficile potest, & si sub alta seratur materia. radi-
 ces obersistentes summum uersus terræ perscindit, ualen-
- s. h. 3. 3. terq; germina edit ^e uerum culturam non patitur, & in
 f. h. 8. 1. ter syluestria potius est reponendum. ^f mature uero se-
 ridem ferè ^c. ritur, post arcam enim serendum protinus censent. ^g et
 4. 6.
 g. h. 8. 2. ex eadem parte radicem fundit, & caulem, qua etiam
 nexus siliquarum consistit, inq; ea uelut principium
 quoddam germinandi bant quaquam obscurum, quod in
 quibusdam uel ad mentulæ formam effigiatum sanè in-
 stituisse possis, ceu in faba, & Cicere, sed maxime
 in lupino, his enim radix deorsum uersus, folium uerò
 & caulis sursum tendunt. ^h siliquas uerò magnopere cir-
 h. h. 8. 5. cum septas habet, & concavas. ⁱ Et cum cicer & erui-
 i. h. 8. 10 omniū maxime durat, Lupinum longe his diuturnius
 est, atq; etiam in siliquis nondum messum maxime dura-
 re potest, sicut in spica nondum messum triticum. ^k Et
 k. h. 8. 11 licet

licet robustissimum sit, tamen nisi protinus, ^a ab area ^{c. 4. 8.}
 terræ mandaueris, male proueniet, quemadmodum di-
 ctum est, atq; in totum condi hoc legumen subter ter-
 ram recusat: Qua de causa ne subarantes quidem id se-
 runt, & sæpe si in materiem, aut herbam prædensam
 quampiam incidat, eam ut summa impellendo diducit,
 radiceque terram contingit, & germinat: solum are-
 nosum, & uitiosum potius poscit, atq; in totum cultis
 prouenire non uult. ^b uiribus enim ualet terram disiu- ^{b. c. 2. 23.}
 gere, & sese abscondit. ^c ucrum cum leui, gracilique ^{c. c. 2. 25.}
 corpore constet, facile arbores scandit, & offendit, ut
 Volucrum, & siliqua. ^d Lupinum uerò syluescens, ^{d. c. 3. 1.}
 atq; luxurians redditur infæcundum. ^e Et incoctile, qua ^{e. c. 4. 1.}
 si toto est. ^f Lupinum propter araritudinem, acritu- ^{f. c. 4. 2.}
 dinem uero longo tempore durat. ^g Verum post dies fer- ^{Idi c. 4. 16.}
 uentes acre humefacto mane demetitur, quoniã si prius ^{g. c. 4. 14.}
 tangatur decedit, & capi non potest. ^h & nunquam ^{h. c. 4. 17.}
 sponte sua tunditur, sicut milium, Aucna, lolium, se-
 fema, & cicer.

a. h. 9. 13



Adonia^a radix Nymphaea est. uide Nymphaeam.

b. h. 1. 11.

Magidaris radice tota constare uidetur non aliter ac Lascepitum.^c licet à lascepitio differat. Vide Lascepitum.

c. h. 6. 3.

d. h. 1. 51

Malua ob culturã diuersa efficitur, atq; à sua natura discedit, in altum enim se attollit, atq; in arborem transit. Quippe ita fit neq; tempore longo, sed mensibus senis, aut septentis, ita ut longitudine, crassitudineq; instar hastae possit grandescere; quapropter comòdè ad usum baculi uenit, tempore uerò longiore ex alto pro ratione magis quoq; incrementa capeßsit, & simili modo de Beta.^e quæ uel arboris figuram capeßsit.

e. h. 1. 14.

f. h. 7. 7.

g. h. 7. 3.

h. c. 2. 26.

coquitur malua, & cibo idonea est, ut Beta, Rumex, Vrtica, & alia.^g Verum annicaulis est, ut Scandix, cucumis syluestris, & solaris.^h folia maluae assidue circumaguntur cum sole, seq; eodem inclinant, quò sol perferatur, ut etiam alia multa.

i. h. 9. 13.

idem. 9. 22.

Malum Terræ olfatu, odoratum, gustatu uehementer amarum est: colore nigrum, nascitur montibus optimum quoq; ; folio constat muris auriculæ simili, tamen rotundiori; perutile ad caput, & reliqua ulcera, & ad serpentes, & ad somnum, & ad alia multa; Ulcibus capitis adhibere præcipiunt in aqua subactum

Elum, reliquis rasum in melle, & oleo: contra ictus serpentium ex uino acido bibi debet, atq; instergi mor-
fuit; ad somnum in uino nigro austero pertritum datus.

Si uulua prociderit, decocto abluisse iuuabit; ^a uerum a. h. 9. 14
utile est quinq; aut sex annis. ^b Et apud Archades b. h. 9. 15
etiam nascitur, & medici eo utuntur.

^c Maspetum. uide Laserpitium. c. h. 6. 3.

^d Malus nisi saepius purgetur deterius fructificat. d. h. 1. 5.

^e Verum cortice leui constat, ueluti ficus, ^f radices ue e. h. 1. 8.
rò paucas habet, ut punica; & summæ terræ adherē f. h. 1. 9.

tes. ^g malo profecto nodi peculiare sunt, facieb. g. h. 1. 13.

belluarum similes extant, unus prægrandis, alij circa
eum parui complures. ^h cuius uerò caudex simplex, & h. h. 1. 14

illico in ramos spargitur. ⁱ folia carnosæ sunt, quia pul i. h. 1. 16

pa constant ^k semina distantia, atq; discreta, tamen k. h. 3. 18.

putamine aliquo, aut tunica continentur, sicut semina
punicæ, piri, uitis, mali, & sic ^l succus uerò quorun l. h. 1. 19.

dam malorum acidi sunt, ut punicorum, licet omnes, qui
uel huic generi contribuantur uinosos putādum, ut etiā

aquosos, ut uitis, piri, mali, & aliorum. ^m flores ue m. h. 1. 21.

rò foliati sunt, ut amygdalæ, piri, & pruni. ⁿ uerum n. h. 1. 22.

eos flores super fructum ipsum insidentes emittit, ut pu
nica, myrtus, prunus, & amerina. Sed inter flores

mali medicæ, qui ueluti colum quandam erectam i.
medio habent, fecundos hos fere affirmant, qui uerò

non habent, hos fore infecundos. ^o malus, & pirus ra o. h. 2. 1.
idem. c. 1. 3.

THEOPHR. DE PLANTIS.

a. h. 2. 3. rō ex ramis exurgit^a Quædam uerò interim sata dege-
 b. h. 2. 7. nerant, ut uitis, malus, ficus, punica, & pirus.^b Ve-
 rum malos paulo distantiores Lauro, & myrto, se-
 c. h. 2. 9. re debet. fructū uerò antequā coquāt amittere possunt,
 d. h. 3. 6. Amygdala, malus, punica, & pirus^d et primis frigo-
 e. h. 4. 6. ribus sua perficit poma.^e Et in monte Olimpo permul-
 f. h. 4. 14. ta habentur.^f Sed breui profecto uiuit malus punica,
 idem h. 4. 16. & ficus, & præcipue uerna, & dulcis minus, quam
 acida, ut inter punicas quæ nucleo caret anteriori.
 g. h. 4. 17. ^g Sed non ita facili infestantur malus, amygdala, & pi-
 h. h. 4. 19. rus, ueluti ficus, quæ facile infestatur.^h licet caudice
 i. h. 5. 4. fisso intereant, immo ab ulcere ampliori, altioriq.ⁱ cum
 k. c. 1. 10. raræ corpore sint.^k Et facile floret.^l Verum inculta
 l. c. 1. 17. priusquam culta germinare incipiunt, ut malus, uitis,
 m. c. 3. 2. olea, ficus, & reliqua.^m Quæ quidem omnia pruden-
 ne purgandi alia ferro, alia manu, alia quibusdam adu-
 cis detrahenda præcipiunt, ut oleæ, piri, mali, ne labo-
 rent ulceribus propter ramorum gracilitatem, & sicc-
 itatem, his enim præ arida, & tenella detrahi tantum-
 modo iuuat.ⁿ Autumno uerò ea baud serenda sunt,
 quippe cum sicca natura consistant, byemen ob debilita-
 tem sufferre non ualent.^o minus uero recidi desiderant,
 quoniam plagis infirmantur, ut malus, & pirus, &
 quicquid, siccum, & cortice tenui uestitum est.^p sunt
 autem in singulis generibus alia præcoques, alia sero-
 tinæ,

tinæ, ut uitis, ficus, malus, & pirus. ^a fructuum ma-
gnitudo, quos ramis suis annexos, ollis inclusos flexu se-
quaci de ductos in terram obruunt, ceu punicarum, aut
malorum ratione contingit. quantum enim humoris à so-
le, aereq; detrahatur olla coercendo utiq; seruat, & si-
mul uaporem ex humo attrahit fructus, quo se alere po-
test. ^b Verum cum nulla sint ferè, quæ à uermibus non
infectentur; alia tamen pluribus, celeriusquè intere-
unt, ut malus, ficus, & pirus. ^c sed ad summam uitis,
punica, amygdala, olea, & malus non solum discissio-
nem tolerant, sed etiam fissiōnem Caudicis. cætera
omnia fixo caudice intereunt.

^d Malum persicum in Persia prouincia nascitur, et
hæc arbor folium simile, & penè æquale atq; Portu-
laca, aculeos quales pirus, aut spina acuta, sed leues
acutosq; uehementer, & ualidos. Pomum eius non
manditur, sed odore præcellit, necnon & folium arbo-
ris odoratissimum est. Et si inter uestes pomum pona-
tur, in offensas conseruat. Vtile & cum medicinam
mortiferam quis biberit, uel ad oris suauem olentiam;
quippe si quis interna pomi in iure, aut aliquo humore
concocta in os expresserit, digesseritq; suauem hancum
reddet, semen detractum uere sulcis seritur, diligentissi-
mè cultus; rigatur deinde quarto, aut quinto die, cum
autem moluscula fuerit, transfertur uerè iterū ad mol-
le riguumq; solum, nec ualde tenue, tale enim deside-

I rat.

a. c. 3. 6.

b. c. 3. 11.

idem ferè c.

3. 13. &

addit fru-

ctus uermi-

culos senti-

re.

c. c. 2. 23.

d. b. 4. 4.

rat, fert poma omnibus horis, alijs decidentibus: alijs
 subnascentibus, alijs maturescentibus: floribus his tan-
 a. h. 1. 22. ^a tum fructus enascitur, qui (ut ^a diximus) ueluti colum-
 quandam extantem in suo medio gerunt, qui enim ea ca-
 reant, infocundi labuntur. Scribitur etiam ficulibus in
 uasis perforatis, quemadmodum palma.

b. c. 1. 11. ^b Malo persica omnibus temporibus germinat, et
 floret, et fructum parit; sed uide etiam Persicum.

c. h. 4. 16. ^c Malus uerna ex omnibus infirmissima est, et ca-
 idem. c. 2. 17 rum potissimo dulcis. ^d Verum hæc si rigetur melio-
 d. c. 3. 23. rescit.

e. h. 4. 4. ^e Malus medica peculiaris in prouincia Media na-
 f. c. 1. 22. scitur, ut Malo persica in Persia. ^f Verū hæc perco-
 quere, germinare, florereq; simul potest, et alijs, atq;
 alijs partibus ualet. Malus enim medica pleniorē quā
 dam, et peculiarem certē sortitur potentiam, siquidē
 hæc agere potest perpetuo.

g. c. 2. 11. ^g Malus sæpiissime fructus deperdit. ^h et ex toto
 h. c. 6. 21. penē fructus, qui gustu suaues sunt, bene olent, nam
 i. c. 6. 22. et malum, et pirum, et Mespilum tale est. ⁱ Sed
 cum aliquid concoctionis per se ipsa recipient, fit, ut a
 suis decerpta arboribus odoratiores reddantur, sicut ma-
 k. c. 6. 24 la, et alia. ^k fructus autem agrestes odoratiores urba-
 nis sui generis sunt, ut mala, pira, sorba, mespila, et
 reliqua, et ipsorum malorum tam syluestrium, quam
 urbanorum, quæ acerbissima sunt, suauissime olent.

At qui

Atqui cum odor per concoctionem acquiritur, quæ
 maximè cocta sint, hæc olere melius putaveris oportet.
 ex dulcibus nullus ferè bene olet, nã & mala dulcia
 minime omnium odorè reddunt, & eò minus, quò dul-
 ciora sunt. Ratio, quod succus dulcis crassior, atq; ter-
 restrior est, præsertim cum mustus fuerit in fructu,
 odor autem humoris tenuioris, siccioris, aptiq; diffuari
 potius est. Mala sylvestria humorem, saporemque
 suum serò recipiunt, & ideo non ita maturescunt, sed de-
 cerpta arboribus maturescere possunt, ut pirum agreste
 & sorbum, & si non eadem maturitate, quàm arbore,
 tamen ita aliquid dulcedinis capiant, cibosq; reddantur
 idonea, siue putredinè genus hoc maturitatis deceat ap-
 pellare, ut in drupis oliuis, seu etiã alium quempiam ha-
 bitũ naturalem. Verum mali raritas prohibet conco-
 ctionem, facit enim raritas arboris, ut frigus transcat,
 nec aliqua parte arceatur.

^d Mandragora caule proximiori ferulæ constat,
 et fructus peculiaris, quod niger, racematus, uinosusq;
 sapore sentiatur. Verum eam antequam effodienda
 sit, ter ense circumscribere tubent, & alterum succide-
 re ad occasum spectando, alterum circumsaltare, plu-
 rimaq; de re uenerea dicere, quod maledictis, & ex-
 crationibus sanè proximum est, quas satui cumini ne-
 cessarias putant, sapores mandragore somnum conc-
 liant, & si copiosius dantur, mortem afferunt.

T ii Mellus

- a. h. 3. 9. ^a *Melleus humor cælo cadens alijs magis nō infidet frontibus, quam roboris.*
- b. h. 4. 13 ^b *Mariscus genus est Iunci. Vide Iuncum.*
- c. h. 9. 19 ^c *Marifica herba. Vide Fœminificam.*
- d. h. 9. 12 ^d *Maritimum Granum genus Lactartarum est. Vide Lactariam.*
- e. h. 6. 1. ^e *Marrubij duo sunt genera, aliud folio herbido, fer-
ratiore, incisurisq; profundioribus, & proinde conspe-
ctioribus discreto constat, quo unguentarij uti ad non
nulla consueverunt. Alterum rotundius, squallensq;
uehementer, sicut Sphaceli, incisurisq; habens obscu-
riores, minusq; ferratum.*
- f. h. 1. 4. ^f *Matrix est, quod in medio ligni tertium à cortice
continetur, ueluti medulla in ossibus.*
- g. h. 8. 8. ^g *Medica herba uocata Stercoris, & urinae cau-
sa perit. ^h uerum diminuta & tonsa, melior redditur,
ut porrum, brassica, lactuca, & ocimum, hæc enim
omnia teneritatis, alimentiq; probi ratione meliora, sa-
pidioraq; euadunt.*
- i. h. 9. 11 ⁱ *Melampodium Ellebori species est. Vide Elle-
borum.*
- k. h. 8. 5. ^k *Melampirum proprie siculo agro datur, &
res innocens est, nec sicut lolium graue, & caput ten-
tans.*
- l. h. 7. 14 ^l *Melfrugum loti species est.*
- m. h. 3. 18 ^m *Melorum fructus similes smilacti habet. ⁿ Et
cuius*

eius plura sunt genera.

^a Mēstiflora in Lacu Orchomenio nascitur, ut Iema, T. 2. 2.
 & quod ipsum appellant. d. h. 4. 11

^b Mentam fructu carere omnino affirmant, ut ser b. h. 6. 7.
 pillum, belenium, & sysimbrium; sæpe enim hæc exic-
 cata tritaq; seruasse se inquitunt, sed nunquam germen
 erupisse. ^c uerum ex Sysimbrio fit mutatto in mentam, c. c. 5. 8. |
 nisi cultu retineatur. ^d licet illud quoq; naturæ aduer- c. 2. 21.
 sum sit, menta enim radice alta firmatur, Sysimbrium c. 4. 6.
 per summa Cesspitum innititur, nec tam numerosam ra- d. c. 2. 22.
 dicem sortitur.

^e Mentastrum inter olera reponitur, & cibo idæ c. h. 7. 7.
 necum est.

^f Mespili tria sunt genera, Anthedon, Setanea, f. h. 3. 12
 Gallica, ut Idæi diuidere consueuerunt. fert Setanea fru-
 ctum grandiozem, candidiorem, solutiorem, lignumq;
 intus mollius habentem. Reliquæ minorem, sed odore
 præstantiorem, magisq; gustu astringentem, ita ut ser-
 uari diutius possit. ^g Verum fructus Mespili uermi- g. h. 4. 17
 culationem sentit, sicut oleæ, piri, mali, & punice.

^h tamen quia acerbus est, diutius seruari potest decer- h. c. 2. 10.
 ptus. ⁱ bene uerò olet, quia gustu suauis est. ^k Sed i. c. 6. 21
 syluestris fructus mespili odorator urbano est. h. c. 6. 24.

^l Milium in folliculo ex annis durat, ueluti Triti- l. h. 1. 18.
 cum. ^m & in æstiuis seritur ⁿ Caulis milio & panico m. h. 8. 1.
 arundinaceus est, & inter Legumina milium fertilissi- n. h. 8. 3.

- a. h. 8. 7. ^a *mum est.* ^a *Panicum* & *milium* minus aquarum indigeat, nam cum plus habent, folia dimittunt; sed ualidius *milium*, dulcius *panicum*: quanquam infirmius est. ^b *radicem numerosam habet*, & facile germinat, & celerrimè consumitur, & reseruari egregiè potest, & etiam *panicum*. ^c *fertur uerò in Media, Cicer, Lupinum, Eruum, milium*, & reliqua id genus longè diutius durare posse, quod etiam locis Græciæ fieri potest. ^d *Verum cum milium paruum sit, feracius inuenitur, radicem enim ualidam habet, & multiplicem, et sic etiã de panico: quæ cum à principio exigua sint, multi proueniunt Caules, fructum quoq; abundè producunt, ratio autem est, quia facilius augeri possunt, celeriusq; aeris qualitati obtemperent.* ^e *durat autem plurimum, quia pluribus tunicis uestitur.* ^f & *Siccum est.* ^g *Verum aliquando sponte suæ naturæ traditur, sicut Lupinum, auena, lolium, & reliqua.*
- b. h. 4. 9. ^h *Mnasion in Aegypto nascitur, & cibo idoneum est, præstat enim dulcedine, copiaq; alimonæ: sicut papyrus, & sari.*
- a. h. 9. 15. ⁱ *Moly apud fucum exit, atq; apud Cyllenam esse, (quemadmodum Homerus dixit) affertur, radice rotunda non absimili capæ; folio Scyllæ. Vfus eius contra Veneficia summa, non tamen effodi difficulter, ut ait Homerus.*
- k h. 7. 6. ^k *Montapium plurimum distat ab Equapio, & paludapio;*

paludatio; folio nanq; *Cicutæ* simile constat, radice tenui, caule ancibi; minutiori tamen, datur in uino austero gratia menstruum.

^a Morbi communes arborum tales sunt. *Vermiculatio*, *Syderatio*, *radicatio*, licet etiam sint priuati, sed uide locum citatum. a. b. 4. 16

^b Morbi frugum communes *rubigo* est, licet quædam propria dentur quibusdam, ut *Tabitudo radices Ciceri*, & *iricarum infestatio*, alijs etiam *pulicum bestiolarum erosio*; nonnulla etiam *scabiæ*, atq; *salsugine* percunt, ut *Cuminum*, sed abundè uide in loco prædicto, & de *Causis lib. i. i. cap. xxvii.* & libro *v. cap. ix.* b. b. 3. 10

^c *Morus* *scrotina* germine esse solet, sed nihilo (ut ita dixerim) tardius, quàm aliæ folia deperdit. ^d *fructus* eius ex humore, & uite constat. ^e *Succus* uerò uinosus est ^f flores sunt lanuginei, ut *uitis*, & *hædæra*, c. b. 1. 15.
d. b. 1. 18.
e. b. 1. 19.
f. b. 1. 21.

^g *Morus* (ut *Menes* ter uult) calida est. ^h & æterna potissimum arbitratur, simulq; ualida, & in operibus facilis, atq; uetustate nigrescit, modo celtis. ⁱ *Tornatus* nauibus rotundis ex moro fit, sicut ex *fraxino*, *ulmo*, & *platano*, *testudo* etiam, & *auriculæ* ex his fabricantur propter firmitatem. g. b. 1. 42.
h. b. 5. 5.
idem 8.
i. b. 5. 8.

^k *Morus* *Ægyptia* candice fructum gerit. ^l & si milis quodammodo moro nostrati est. quippe folio magnitudine, aspectuq; proxima. *Pomum* est magnitudine l. b. 1. 1.
idem 23.
l. b. 4. 2.

dine

THEOPHR. DE PLANTIS:

dine ficus, succo, atq; sapore caprificus sane simile,
 uerum longe dulcius, gransq; internis omnino carens,
 multitudinem numerosior maturefcere nequit, nisi scal-
 ptum; quod unguibus ferreis scalpitur. quæ cum scal-
 pta sint, ad quartum diem maturefcunt: hisce ablatis,
 alia sub eodem loco subnascuntur nullo diuersa, idq; alij-
 ter, alij sæpius faciliare affirmant: Lactucosa arbor
 admodum est, & ligno ad multa percommodo. Pro-
 prium id præter cetera habere uidetur, quod casum
 continuo uiride est. Siccatur autem in profundo aquæ
 mergitur enim in profundas fodinas stagnaq; protinus,
 atq; conditur, madefactumq; in profundo siccatur;
 cumq; siccum omnino fuerit, superfluitat, atq; innat-
 rat, itaq; probe conditum esse uideatur, sit enim leue,
 atq; solutum, morus proprietates has sortita est.
 Morus non summatim, sed particulatim fructum
 per coquere solet, unde diutissime perseuerat, nec hu-
 moris tenuitas, atq; aquositas amittenda est. his
 de causis uelociter maturefcere potest, sed ut Mene-
 stor autor est germinat serò hæc arbor propter loci fri-
 giditatem, excoquit cito propter suam debilitatem.
 creat autem fructum quendam leuem, dilutumq;, &
 minime pro sua magnitudine amplum. Verum morum
 acutum ex acerbo, & dulce ex acuto efficitur, quippe
 uinosa dulcedini proximè adiacet sapor acutus, quam-
 obrem qui quatunt, cur morum cum rubet, acutius est,
 quam

quàm cum albescit, cum proprius tunc ad finem exco-
 ctionis sit, non rectè quærunt, tunc enim uelut genera-
 tio ipsius destinati saporis obtingit, prius autem cum
 albescit acerbitas remotior à dulcedine, atq; commu-
 nior est: qua de causa & siccius albescens, humectius
 est cum rubescit, ceu iam succum, saporemq; suum ad-
 pisci accipiat, omnino quisque fructus primum siccus
 consistit, mox humescit: & hæc generatio est sapo-
 rum, humore scilicet plenius influente, ac uelut articu-
 lato perfectius, & assidue maiorem in modum augen-
 te. Quo fit, ut non temere maior pars fructuum acer-
 ba principio esse soleat, quoniam sicca est.

^a Mule herba folium sic uocata sterilitatem mulie-
 ribus facere uolunt, & aliquid ungulae, ac seminis multi-
 animalis miscendum præcipiunt; constat hæc folio lin-
 guæ ceruinæ appellata; radice numerosa, & tenui, mō-
 tanas planicies, & saxosas amat, mulas hæc herba plu-
 rimum delectari affirmant. *Usus eius uel ad lienes quæ
 admodum uolucris.*

^b Muricida. hæc herba muralis est. ^c Et nerulcau-
 lis est, uelut fœniculum.

^d Myrra in Arabia, Syria, & India nascitur, si-
 cut aliæ plantæ odoratæ, ut Thus, Cassia, Laser, et
 Cinnamomum. ^e Sed sunt nonnullæ arbores, quæ Thus
 quæ Myrram præstant, lachrymis enim hæc quoque
 annumerantur. ^f Et sub cane Thus, & Myrram, fer-

V uentis

a. h. 9. 3. *uentissimisq; diebus incidi referunt.* ^a *Etiam sponte,*
b. h. 9. 4. *quàm incisura prodire possunt.* ^b *Myrra arbor minor*
est altitudine arbore Thuris, & fructuosior est. cau
dice duro, contortoq; iuxta terram crassioriq; sura ho
minis, cortice leui, similiq; protulaca: *Alij uerò, qui*
se uidisse affirmant, de magnitudine ferè consentiunt:
neutrum earum arborum magnam referunt, & mino
rem Myrra, humilioremq;. Sed Thuris folium Lauri
num, leueq;: Myrræ aculeatum non leue, ulmeo simile.
Crispum tamen, extremo spina horridulum ilignei mo
do. Idem ea navigatione, qua ex sinu heroum uehemē
ter egressos sese aquam in monte quassisse dixerunt, atq;
ita uidisse has arbores, & lectionem notasse hoc modo
ambarum: & caudices, & ramos incisos quidem, sed
alios ueluti securi percussos uideri, alios tenuiores inci
suras habere: & lachrymam aliam decidere, aliam ar
bori in herere, nonnusquam etiam subiectas tegetes ex
palmis contextas, alibi solum tantummodo circumpau
mentatum. Et purum thus, quod tegete exciperetur pu
rum esse, atq; perlucidum, quod terra minus, quod ar
boribus inhaeret ferro depecti, et corticem ideo nonnul
lis adiungi. Montem autem uniuersum Sabets diuisum
dixerunt. hos enim loci illius dominos esse, iussittaq; mu
tua degere, quamobrem nullum suas arbores custodi
re: unde & thus & myrram sese largè ad naues solitu
dine deportasse narrarunt. Illud quoq; iidem se audi
uisse

uisse dicere, myrram & thus collectum undiq; ad solis
 delubrum conuechi, quod Sabeorum esse sanctissimum
 inter omnia regionis illius, custodesq; Arabes arma
 tos habere, quibus singulos suum Thus acervatum, &
 myrrham eodem modo relinquere, posita super acervū
 tabella literis significante numerum mensurarum, &
 pretium, quod pro singulis mensuris ponendum sit.
 Mercatores uero, qui uenerint, tabellas aduertere,
 eiusque quod placuerit acta mensura precium in eodem
 ponere loco, unde merces acceperint: Sacerdotem de-
 inde uentre, parteq; tertia precij Deo accepta, reli-
 quum ibidem relinquere, idq; seruari tutissime dominis
 donec acceptum uenerint. Alij Thuris arborem len-
 tisco similem prodidere, & fructum quoq; lentisci, fo-
 lium subrutilum. Thus recentium arborum candidius
 esse, minusq; odoratum, ueterum flauius, odoratiusq;
 Myrrhæ autem arborem Terebintho similem reddide-
 re, sed scabriorem, spinosiolemq; folium paulo rotun-
 dius, gustatu proximum Terebintho. Earum quoq;
 ueteres præstantiores haberi. ambas uero nasci in co-
 dem loco terra subargilia, & sabulosa, & aquas fon-
 tescentes raras admodum comperiri, hæc ergo illis
 repugnant, uidelicet ningi, & imbris perlui, &
 amnibus locum illum exhilarari; arborum tamen istam
 similem Terebintho constare quidam alij tradunt, nec
 desunt, qui Terebithum eam esse omnino putent. Ara

bes enim, qui thus aduexere; ligna huius arboris Antigonon attulisse aiunt, quæ nihil à Terebintho differrent. Sed hi quidem altera quoque ignorantia quidè longè maiore laborarunt, Thus enim, & myrrham nasci ex eadem arbore putauerunt. Quamobrem uerissimilius illi narrarunt, quos ex heroum oppido profectos nauis retulimus. nam & arboris Thuris, quæ super Sardes apud delubrum quoddam surrexit fronde Lauri cõstat. Siquidem ex eadem ducere argumentum conueniat. quoniam eius Thus tam quod caudice, quàm quod ramis excerpitur proximum, & uisu, & odoratu cum ardet aduecto thuri percipitur. sola hæc arbor omnem penitus cultum apta est aspernari, ac suauius quidem Thus in Arabia nasci referunt, sed melius in uicinis insulis: in his. n. & figurari in arbore posse, qua forma uolueris, & fortasse id quidem haud quicquam incredibile sit, siquidem pro incisura facta, figura Thuris sequatur necesse est. Quoddam adeo magna gleba constitit, ut mole sua manum implere, pondere uerò plusquam tertiam partem minæ æquare possit. Thus omne iners aduehitur, & affectu cortici simile est. Myrrhæ aliud stillatitium, aliud fictitium constat. probatur melior gustu, eiusque norma concolorem accipiunt.

2. 1.9. 7. Verum ad unguenta ea utuntur, sicut Cinnamomo,
 1. 1.6. 17. & alijs. Thus uerò & myrrhæ arbores inscant, quò
 solis, ac aeris uis coagere melius possint.

Myrica

^a Myrica perpetuo uiuet. ^b Et folia carnosafunt, ut
Cupressi, & inter frutices numeratur ^c Et in plantis
etiam descendit. ^d Verum in Tylo Arabiae insula fe-
runt Tamaricis lignum, non ut apud nos, imbecillum ef-
se, sed ualidum, sicut Iligneum, aut aliquid ferme ma-
teria huiusmodi ibidem comperiri.

^e Myrtus nisi saepius purgetur, in fructicem transit. ^f
^g melius fructificat, & germinat. ^h & communis est
nam & terrestris est, & in mari nonnunquam uiuit,
sicut etiam salix, & alnus. ⁱ Verum ex urbanis uiuet
perpetuo, ut pinus, & laurus. ^j & folia angustiora
habet, ut olea, & punica, sed tamen ordinata myrtus.

^k Cuius succus uinosus est, ceu uitis, & mori. ^l florem
uerò insidentem super fructum ipsum emittit. ^m Et ex
annotinis surculis fructum gignit. ⁿ Nascitur sicut olea
ferè, nam & ligno, & ramo prouenit. ^o licet aliquan-
do degeneret. ^p serere uerò præcipiunt crebras, lauros
& myrtos, & non plus, quàm nouenos pedes distan-
tes. ^q Myrtus punica & ficus tam latere, quàm cacumi-
ne germinant. ^r uerum affirmant myrtum & laurum in
frigidis minimè durare posse, ut in lauro diximus. ^s Sed
in agro latino plurima est myrtus, tamen in plantis.

^t Myrti Aegypti mirandum in modum odoratae assur-
gunt. licet cæteræ omnes sine odore sint. ^u Myrti, ac
oleæ corticem detrahendum nequaquam existimant, ob
sepit enim, conseruatq; arboris uitam. ^v Sed myrtus et
punica

a. h. 1. 19
idem. 3. 4.
b. h. 1. 16
c. h. 3. 4.
d. h. 3. 6.

e. h. 1. 53
idem. 2. 8.
f. c. 3. 10.
g. h. 1. 7.
h. h. 1. 15
i. h. 1. 16.

k. h. 1. 19
idem. c. 6. 9
l. h. 1. 22
m. h. 1. 23.
n. h. 2. 1.
idem c. 1. 3
o. h. 2. 3.
p. h. 2. 7.

q. h. 3. 7.
r. h. 4. 6.
s. h. 5. 9.

t. h. 6. ult
mo
idem. c. 2. 18
u. c. 1. 4.

x. c. 1. 15.

- punica fructum secundum etiam ostendunt, sed augere nullateus possunt. ^a Verum maximè simul. conseruantur, nam myrtus sicca, & spissa est, punica raro, nec sicco corpore constat, fructum enim utraq; nucleo sum, nec humidum gerit, itaq; soli expositus mox obarescit: in Umbra autè coalescens, & solem modice sentiens, humorem suum seruire, atq; coquere nimirum potest, quamobrem, & punicas & myrtos breui intervallo conserere solent, ut se contactu operiant mutuo, atq; solis nimios æslus aufugere possint, tum etiam quod radice numerosa non sint, nullo alimenti raptu mutuo se infestantur. ^b Addit oleam, quæ etiam mutuo amore coniuncta cum myrto sit: has enim mutuo complexu radicum degere Androthion refert, ut gasq; myrti per brachia oleæ prorepere, atq; dispergi, & fructu oleæ protectum, ut nullam uim solis, flatusq; pateretur, tenerum, ac dulcem euadere, sed minorem, quàm locis expositis, aliud non est, quod feri uelit iuxta oleam. ^c uerum cum Nyrtus fructum pariat sicciorem (nam sero perficit fructum) leuiorem frigiditatem requirit. ^d & cum ampliorem magnitudinem capiat, plagas allucatas contegit, ne intrudatur sol; aut imber, & sic etiam olea. ^e Stercus myrtis uehementer congerendum præcipiunt, uidelicet spurcicias pellium, urinamq; adhiberi, cum germina profiluierint, quasi fructus ita reddi sine interiori nucleo possit. ^f à gelu facile corrumpitur myr-

tus, hæc enim celerrimè uritur, quia & ipsi ramuli te-
nues, tenelliq; sunt, & tota arbor minus calida est, &
proinde ad gelu facillima. ^{a. c. 6. 22.} fructus myrti odoratus pro-
pter acrimoniam, nam ex dulcibus nullus ferè bene
olet. ^{b. c. 6. 27.} Myrtus etiam Aegypti (ut diximus) odorata
est, quanquam cætere inodorata sint, uerum hoc cuc-
nit propter loca feruida.

^{c. c. 4. 7.} Myrtaria arbor non est, sed frutex terrenus.

N



^{a. h. 6. 6.} Arcissus. uel Litrium (alii enim hoc, alij
illo nomine uocant) folium Albuci terræ
proximum gerit, sed longè latius, modo li-
lij habet caulem sine folio herbaceum, flore suo floren-
tem cacumine, in membrana ueluti uasculo inclusum lar-
gè amplum, coloreq; nigrum, figura oblongum. ^{idem h. 7. 12.} Hic
decidens spontè germinat: Cæterum & qui legunt de
figere eum solent. Quin & radicem serunt, quæ carno-
sa, rotunda, amplaq; constat. Scrotilius admodum,
post æstuum enim et circa æquinoctium floret. ^{b. h. 6. 73.} Na-
statim post lilium, & Violam flammicam exit.

^{c. h. 9. 73.} Nardus ad unguenta utilis est, & etiam Narta.

^{d. h. 7. 1.} Nasturtium post æstium solstitium seritur, ut
beta, lactuca et alia: et ex uetere semine celerius exit.

Et

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 4. 7. ^a Et eius plura sunt genera.
- b. h. 6. 1. ^b Nepa ex toto aculeata est, sicut corruda. & dif-
 c. h. 6. 3. ficile quidem quicquam ferme inueniris præter Nepam, & Corrudam, quæ post æquinoctium Autumni florescunt. Nepa enim florem in carne extuberante sub extremo aculei profert initio candidum, postea leuiter accedentem ad purpuram. Corruda propter aculeos pusillum quandam producit pectiolum, ex quo flosculus ipse tandem erumpit. Nepa radice singulari, eademq; breui adhæret. ^d Et speciem Scorpionis representat radix, & utilis ad eius ictum, & ad alia quædam habetur. ^e Et in caput extuberat.
- f. c. 2. 22. ^f Nepita. uide Sysimbrium.
- g. h. 9. 7. ^g Nerium ad unguenta utile est, ut nardus, & alia.
- h. h. 7. 9. ^h Nigella ab radice tantum foliata est, ut Silago, Anchusa, & alia, & in caule etiam tantum.
- i. h. 1. 2. ⁱ Nodus idem quod ramus. Vide Ramum.
- k. h. 1. 18. ^k Nux semen habet protinus post tegmen ambiens,
 l. h. 1. 19. & carnosum est. ^l Succus pinguis. ^m Thmolus, Olympusq; mysius nucem & castaneam plurimam ferunt.
- m. h. 4. 6. ⁿ fomites tamen si ex multis fieri possint, tamen optimi, qui ex nuce, ut Mnestor est autor, Celerrime namq;
 n. h. 5. 10. largissimeq; respirant. ^o semina putamine ligneo, aut pelliculari copia ambiuntur, ut nuces, & glandes, fer. idem c. 3. ultimo. quæ suis munita tegminibus ad germinandi usq; tempora illa sã

ra illa sa seruati nimirum possunt. ^a Oleum ex nuce sic ^{d. c. 6. 9. 11}
expressis seminibus. ^{15.}

^b Nux Auellana nisi sa pius purgetur, ueluti myr ^{l. h. 1. 5.}
tus, in fruticem transiit, quæ quidem & fructum me ^{idem fere c.}
liorem, copiosioremq; fert; si quis plures uirgas reli ^{2. 18.}
querit, scilicet & quæ sua natura potius fructico, ^{c. h. 1. 16.}
sa sit. ^{d.} folia in secta habet, ut ulmus, & robur, ^{d. h. 3. 6.} Ve
rum quidam florere existimant nucem auellanam, ro-
bur, & castaneam. ^{e.} Sed nuci Auellana postquam ^{h. 3. 7.}
fructus decidit, recematum quiddam, uermis prægran
dis magnitudine singulari, pediculo pingue emergit,
quod nonnulli ^{f.} tulum appellant. Hoc ex minutulis ^{h. 3. 8.}
squâmis innumeris ordine nucis pineæ constat, ut si e-
ciem non absimilem nuci pineæ nouellæ, ac uiridi gerat,
si quod oblongius, & per totum ferè pariter crassum
tendat. Hyeme hoc augetur, in eunte uere dibiscit, et
squammata illa flauescunt, & in longitudinem trippol
licarem incresecunt. cum autem uere folium existit, ista
decidunt, & nucis caliculacea tegmina totidem quot
flores super pediculum contracta gignuntur, eorumq;
singulis nuces singulae insunt: germinat latere tantum,
sicut fit in nuce iuglande, & auellana, & quibusdam
alijs; Quarum omnium germina in folium unum finiu
tur. Arcades, & Idæi nucem Auellanam radicem
altissimam habere inquit, sed tenuem, atq; robustâ.
^{g.} Verum natura quoq; syluestris hæc est quoniâ sylue ^{h. 3. 15}

X

stis

stris nullo, aut multo deterius, quam urbana fructificer, & hyemes quasque perferri possit, montibusque magna ex parte proueniat, & quidem fecundissima tempora ubertate. Ad hæc quòd non caudicosa, sed fructicosa, uirgis sine alis enodibus, uerum breuibibus, crassisque nonnullis assurgit. Cæterum & mansuescere potest, differt tamen, quòd fructum meliorem, foliumque amplius habeat, circumserratum folium ambabus similimum alno, sed latius, atque arbor ipsa amplior, fecundior assidue redditur uirgis præcisæ. Ambæ bino genere constant. Quædam enim rotundam, Quædam oblongam nucem largiuntur: sed urbanarum fructus candidior est, locis aquosis potissimo fructificat melius. Syluestres translatae mansuescunt, corticem summum habent tenuem, maculis albidis peculiariter uariatum. Materies admodum lenta, ut prægraciles uirgæ, desquamatae, crassæ, derastræ, renouentur habent medullam tenuem, flauam, qua concuantur; peculiare his iulus callo compactus, ut retulimus.^a semina maxime perdurât, cum denso putamine sint, ipsa quæ pinguluscula consent; tamen ista efficiuntur amara.

a. c. 4. 2. ^b Nux castanea syluestris est, ut ingrans nux, quæ cupidæ frigoris, montanæque potius sunt. ^c mature uerò germinant, & incunæ uere. ^d habent autem quod amenum uocant. ^e & plurimam nucem, & castaneam habent Thmolus, Olympusque mysius.

Nux

^a Nux Euboica natura perpetuo est, ut Cedrus, f. h. 5. 5.
 Ebenus, & Cupressus, & in aqua nequaquam pu-
 trēscit. ^a & ei solum opacum, atq; roscidum conuenit, a. c. 3. 7.
 uerum fructum perficere haud potest, sed ad florem
 tantum proficiscitur. ^b fossio omnibus prodest, sed ma- l. c. 3. 14
 xime Amygdala, & nuci Eubotea, quæ meliores
 fructus producunt, tegmina enim tenuiora, intestina
 uerò ampliora sunt. .1. c. d. .

^a Nux Iuglans sylvestris est, & loca montana amat, c. h. 3. 3. 4
^a & incunte uere germinat. nec caret amēto, ut in nu- d. h. 3. 6.
 ce castanea diximus. ^a Verum frangi se sonitu pronun- c. h. 3. 7.
 ciat; est enim uel eius materies ampla, ususq; ad opus f. c. 5. 7.
 rectorium, ita ut præsentire homines possint, quod & id. m. c. 5. 8
 in Antandro accidisse omnesq; è balneis terrefactos
 profugisse traditum est. ^a Carbones optimi sunt, et ex g. h. 5. 10
 peti solent ferreis metallis, & cum exarserint, argen-
 teis, qui confecti ex picea sunt, nam artes carbonēs suos
 desiderant. ^b semina nucis iuglandis minimum perdu- h. c. 4. 2.
 rant: quia præ raro, minimeq; continuo putamine ob-
 teguntur.

^a Nymphææ radix dulcis est, quæ nasci in lacustri- i. h. 9. 13.
 bus solet, ut in Orchomeniensi agro, & Marathone,
 & in Creta insula. Boeoti madoniam hanc appellant,
 fructumq; mandunt gerit folia super aquam amplam:
 plagæ trita imposita sanguinem sistere traditur, utilis
 & ad difficultates intestinorum pota.

a. h. 6. 7.



ENANTHA^a semine quoq; obse-
renda est, nec enim hæc excludi à flori-
bus debet.

b. h. 7. 8.

^b Oculus caninus, spicosa est, ut cauda uulpina,
& plantago, dicta agnina lingua, uel conturnix.

c. h. 9. 21.

^c Oenethera folio amygdale constat uerum maiori
flore rosaceo; loca amat montuosa, id tamen absurdum
nequaquam appareat; sit enim quasi recreatio quædam
ex uiribus, quas radix ista utnaceas possidet, sed potius
illa absurda putentur, quæ alligata, & ueneficiorum
aduersantia uocitantur, & tum corporibus, tum domi-
bus unice opitulari creduntur.

d. h. 1. 9.

e. 10.

idem h. 7. 3.

e. h. 1. 16.

f. h. 7. 1.

g. h. 7. 2.

h. idem fere

e. 1. 4.

i. c. 2. 20.

j. c. 2. 20.

k. c. 2. 20.

l. h. 7. 3.

m. h. 7. 4.

n. h. 7. 5.

^d Ocimum radices lignosas habet. ^e & folijs iam per
fectis caulis cõuententer talis assurgit, ut lactuca, apij,
& frumentorum. ^f Scribitur mense Martio, ut blitum,
cucurbitæ, & aliæ. ^g Et non solum semine prouenit,
sed etiam germine: caule uerò ^h reciso facile regermi-
nat. ⁱ (& melius redditur) & ei unica quoq; radix da-
ta est, quæ crassa esset, atq; descenderet. Cæteræ
uerò, quæ de latere prætenues orientur admodum pro-
lixæ adhærent. ^k difficile uerò siccatur, & fecundissi-
mum est. ^l Et plura sunt eius genera. ^m Rigantur cæ-
tera quidē hora matutina, aut ad uesperam, ne aqua fer-
uens sole afficiatur. Ocimo etiam meridie aqua datur,

germinare

germinare nanq; celerius id existimant, si inter initia
 feruenti aqua rigetur. Aqua admodum multa confer
 re creditur, praesertim si finus non adsit, saepe enim ole
 ra exurire dicuntur, idq; olitores peritos haud difficile
 posse intelligere. Ocimum etiam sub canis ortum palle
 scit, & corianum salescit. ^a Semina ocimi durare non ^{a. h. 7. 6.}
 possunt, ut atriplicis, & cucurbitae. ^b Verum ligno- ^{b. c. 1. 10.}
 sum est, & siccum attamen hoc ante feruentes dies ger
 minare ita, ut perdurare, atq; perfici possit, minime
 ualet. ^c uerum cum seritur tertio die exit & cum siccum ^{c. c. 4. 3.}
 sit, hyemem nequit tolerare. ^d loco autem soli expositum ^{d.}
 transiit in Serpyllum, quia uehementer siccatur, folio
 nanq; minus, odoreq; uehemētius redditur, quippe cum
 alimenti minus habeant, quæ sicca sunt.

^e Olea arbor est, & multifida. ^f & frangi celerior ^{e. h. 1. 5.}
 potest. ^g Medullam paruam, & incertam gerit, ut bu- ^{f. h. 1. 8. c.}
 xus, radicem etiam illam paruam habet, ceteras gran- ^{1. 24.}
 diores, contortioresq; uelut nodosas, uillosasq; gerit. ^{g. h. 1. 9.}
^b Et non solum olea nodosa est, sed etiam pinaster, & ^{h. h. 1. 13.}
 oleaster, gongros uero à quibusdam uocatos habet, uel
 quod pro arboris natura respondeat; quippe cum no-
 men id maxime oleæ conueniat, eoq; morbo plus quam
 ceteris laborare uideatur. premnum id nonnulli appel-
 lant. alij crotonam, alij alio nomine utuntur. rectis uni-
 stirpibus, minusq; ab imis plantigeris, id aut nullo pa-
 cto, aut minus accidere solet: Olea, & oleaster, uel
 caudicum

THEPHR. DE PLANTIS.

- caudicum concavitates peculiarem in modum habere ut
a. h. 1. 15 dentur.^a uiret uerò perpetuo ex urbanis olea, sed non
non semper eadem durant folia, sed alia proueniunt,
alia exarescunt, idq; circa æstiuum solstitium facilitari
b. h. 1. 16 maxime uidetur.^b Et angusta sunt^c Verum olea pe-
c. h. 1. 16. diculum breuem habet.^d semen carnosum, et nucleus in-
d. h. 1. 8. teriacet, caro enim in nucleo est.^e Succus pinguis.^f flores
e. h. 1. 19. uerò oleaginei foliati quidem, sed pusilli.^g et circa fru-
f. h. 1. 21 ctū ipsum producuntur, et prostrati perforati spectan-
g. h. 1. 2. tur, idq; argumento capitur propè arborē defloruisse:
nā si exaruerint, aut madefacti fuerint unā cum fructi-
h. h. 1. 23 bus defluent, atq; ita nullatenus perforabūtur.^h fructū
i. h. 2. 1. uerò olea ex annotinis producit.ⁱ Et omnibus rationi-
bus prouenit, præter quā in surculo, defixa enim nequit
germen citare, uenit autem omnibus modis, sed ex trun-
co, ramo con ciso radice ligno uirga, & adminiculo.
k. e. 5. 1. ^k Interdum etiam non defixa germinat, ut ligna oleæ.
l. h. 2. 3. ^l nonnunquam etiam nucleo, & etiam syluestris olea,
m. h. 2. 4. nec ex oleastro fit olea.^m Verum folijs amissis fructi-
n. h. 5. 4. ficauit. ⁿ folium enim ut pote imbecillius frigori magis
obnoxium est, uel alicui euentui factum est. quippe fru-
ctus maturi sponte ruunt, sed antequam sint maturi ua-
lenter adharēt, quamobrem perticis oleas percutiunt.)
quod & Thessalo Pisis trati filio accidisse proditum
est, nonnunquam ratione hyemis, aut alias ob causas
quædam accidunt, quæ normæ naturali in congrua iu-
dicantur,

dicantur, cum tamen non ita sit, ut olea penitus aliqua
do.^a adusta regerminauerit tota, Bactrae uero germi
nibus à locustis derossis iterum germinauit, Sed hæc
haud quamquam pro absurdis animaduerti forsitan de
bent, quippe cum ad manifestas causas redigi possint.
^b sed ut facilius aduersa pati possit, uiuunt radices facien
dum apud arbores ipsas, seruntur ex olea, & myrto ra
mi, quibus geminantibus terram semper assidue accumu
landum, quoad satis corroborentur.^c licet sint, qui du
rissimam, & ualidissimam oleam, & myrtum esse af
firmant.^d At in Cyrenensi agro olea optime proue
nit.^e In mari nimirum exeunt laurus, & olea, & fo
lia tantum similia Ariæ habet, fructum proximum
his nostris oliuiis parit, & lachrymam emittit, ex qua
medici sistendo sanguini medicamentum conponunt.
quod fieri laudatissimum solet.^f durat longo tempore
olea, sed magis oleaster (sunt enim syluestres arbores
robustiores urbanis) tamen oleam Athenis referunt
(ut fabulantur) longo tēpore durasse.^g durat enim per
petuo.^h Verum præter uermes, qui & ficum interir
munt fortificantes in ea clauum patitur, quod fungum
appellant, alij ollam, hoc est ueluti solis exustio: non
nunquam etiam nouellæ propter nimiam fertilitatem in
tereunt. in Myleto oleas cum florent, cruxæ erodunt,
aliæ frondes, aliæ florem: genere diuersæ arbores di
spoliant. Nascuntur tempore austrino: & uento si
sol

- a. c. 3. 13 sol acrior infecutus fuerit rumpuntur. Cui pluuia, quæ
 .2. maxime oleæ nocet. Circa tarentum fructum uberem
 oleæ semper præmonstrant, sed sub flore pars magna
 b. c. 3. 27. perditur. ^b Carpæ etiam creantur in oleis. ^c Et magna
 c. c. 3. 12. ex parte ei impetigo accidit. ^d Oritur et alius morbus
 d. h. 4. 17. oleis, qui *Arachimum* appellatur: Nascitur enim hoc,
 idem c. 3. 13. et fructum absorbit. Adurunt et æstus quidem et
 oliuas et uuas, et alios fructus: Sentiant et uermicu-
 lationem fructus quorundam, ut oleæ, piri, mali, mæsti-
 .2. li, punicæ, uermis oleæ natus sub cutæ fructum ademit;
 .1. at si in ipso nucleo erodens, prodest, sub cute gigni pro-
 .2. hibentur pluuijs, quæ post arcturum sequantur. Et in
 drupis quoque oleis uermes nascuntur, qui ad lacturam
 priores certè deprehenduntur, et marcidi, putresque
 omnino uidentur hinc et austrinis nascuntur, et riguis
 magis, uerum ex arboribus ficus præcipuè, secundo lo-
 co olea infestatur, oleaster magis laborauit quamquã
 e. h. 4. 18. robustior, quod mirum fuit. ^e præcisa uerò olea melior
 f. h. 3. 5. redditur. ^f Et teredinem minime sentit, nec oleaster,
 quas amaritudinis causa neque teredo, neque tinea rodit.
 g. h. 4. 20. ^g Oleum (et pix) omnia necat, qua de causa radicum
 c. 3. 22. extirpandarum reliquijs oleum infundunt, ualet oleum
 ubi idem. magis in nouellis, et in præsens nascentibus, sunt namque
 debiliores, qua propter et tangi eas agricolæ prohi-
 bent. ^h olea plus temporis destimatum, cum diutius suos
 h. c. 1. 5. parturiat oculos, ⁱ difficilique augetur sicut cupressus, et
 i. c. 1. 9. *laurus.*

laurus. ^a inculta prius germinat quam culta, quoniam ^d. c. 1. 17.
 calorem amplius retinere ualet, cū non fodiatur. ^b Eue. b. c. 1. 29.
 nit autem ut cum bene germinet, male fructificet, tan-
 quā natura utriq; satisfacere parti non ualeat. ^c Oli- c. c. 2. 3.
 uæ autem germinibus omnino intereunt, cum alimentum
 deducatur ad germen, cui fructus diuturniores, plusq;
 alimenti, concoctionisq; desiderantes hi seriores etiam
 imbrēs intempestiui accedunt, ut uiti, punica, et olea.
^d Quæ in locis frigidis germinare nequit, nō modo pro ^d. c. 2. 4.
 pter debilitatem uel huiusmodi, sed etiam alijs quibusdam
 de causis, quia per summa terræ radice cohercat, fri-
 gidas enim partim tollit humorem, partim ad conue-
 nientem cocturā perducere nequit, quod porro in oleis
 patescit. hinc etiam aliæ fructum nulla carne, sed oleo
 refertum profundunt, aliæ carnosum sine oleo præstāt.
 plus enim caloris ad oleum concoquendum requiritur.
^e olea, Tilia, & ulmus sua folia æstiuis solstitiis uer- e. c. 2. 26.
 tunt. ^f & uerno tempore serenda olea est, ut etiam om- f. c. 3. 4.
 nes arbores, & plantæ. ^g Scrobes autem non pari al- g. c. 3. 5.
 titudine faciunt his, quæ per summa coherent, ut olea,
 & fico. ^h solum solidum, & sitiens olea, & ficius amāt. h. c. 3. 7.
ⁱ Argillaceum, & magis candidum addit. ^k Et ad me i. c. 2. 5.
 ridiem spectare debent. ^l reciso maxime conuenit olea, k. c. 3. 9.
 & Myrto. ^m quæ maxime ablaqueantur, ne siccentur, l. c. 3. 10.
 cum radix prima partem terræ natara solcat. ⁿ Sterco- m. c. 3. 11.
 ratio oleæ etiam prodest, ad latē fructificandum. ^o Et n. c. 3. 12.
 o. c. 3. 15.

Y

cum

cum myrto mutuo amore coniuncta uiuit, sed uiti, &
 alijs molestissima est. ^a cuius semen ligno natura ope-
 ruit. ^b Et longo tempore perdurat. ^c Verum olea non
 solum discissionem tolerat, sed etiam fissiōem caudicis.
^d Et hoc peculiare de olea notatur, si uerum est. Nihil
 enim plus olei post arcturū fieri posse autumat, simulq;
 nucleus tum obdurescere, quo facto non amplius humo-
 rem posse in oleum conuerti, sed oleum sincerius. est ex
 oliuis priusquā nigrescat, quoniam albius, quod ex phau-
 lijs promitur, nec mirum, si quam in eo, quod albis ex-
 primitur, sentimus amaritudinem, quæ postea excocto
 fructu aboleatur, hæc & plura Theophrastus in loco
 citato. ^e odore autem caret oliua in locis frigidis. Ge-
 nus olearum, quod Aegyptium appellamus, ubertate,
 ac magnitudine fructus excellit, reliquum abunde oleū
 fert.

^f Oleaster plura fert quā urbana, sed urbana me-
 liora. ^g uerum nodosa est, sed nodi inuicem respondent,
 & concauitatem peculiarem in modum habere uide-
 tur. ^h & nec obleaster olea, nec piraster pirus, nec ca-
 prificus ficus fieri potest. ⁱ tamen uita syluestribus lon-
 gior, quā urbanis. ^k sed ut diximus in olea, aliquando
 oleaster magis infestatur. ^l cum strisissima sit. ^m in olea
 stro, qui Megaris in foro stabat, hoc euenisse accepti-
 mus, quo succiso Urbem capi, ac diripi oraculum erat,
 sicuti actum est, in hoc enim præscisso, reperta ocreæ
 sunt,

*Sunt & alia quædam Atticiritus, parte qua primum
affixa fuere, ad ramorum ambitum concavata. Huius
oleastris quod adhuc superest parum admodum extat.*

*Alijs quoq; locis permultis complura eiusmodi facta
produntur, & pluribus publica habentur.^a nam perpe
tua habetur, ut cupressus, & pinus.^b ligno autem cõ
ualefcere, & germinare pollet, ut myrtus, & olea.*

*Et si urbana syluestribus inserueris, plus alimenti ut-
res subditæ arboris subministrant. Quamobrem satis
oleastris inserere postmodum, uel inoculare præc-
eptum. Cocunt enim & apprehendunt ualidius, & ra-
dix plus attrahens nutrimenti, probe fructificare arbo-
rem facit. Nam si è contrarto syluestre in urbano ser-
ueris, tametsi differentia quædam erit, tamen bone fru-
gtis arbor nunquam profectò reddetur.*

*^dOleagnus in Laco Orchomenio nascitur, & natu-
ra fructuosa est, nec cæteris amerinis absimilis folio,
figura quidem proximo cæteris, sed molli, ut malus,
lanuginosq; flore populi albæ, uerum minori, fructu
nullo. Nascitur plurima super insulas fluitantes. sunt
enim & in eo quædam fluitantes, ut in Aegypto circa
paludes, & in Thesprotide, alijs quæ stagnis, sed il-
læ minus aquæ implentur, talis est oleagnus.*

*^eOlera uocitamus, quæ nobis usui cibario sint, quæ
quidem in summa uniuersorum contineantur necesse est.*

Quamobrem nec ea dimittamus oportet. Ergo olera

Y i i appellan

THEOPHR. DE PLANTIS.

appellantur. *Intubum*, *Aphaca*, *Andryala*, porcellia, senecio, atq; in totum quaecunq; intubacca sunt.

a. c. 1.7. ^a & in omnibus seminibus olerum aliquid alimenti continetur. ^b Verum folijs, & radicibus utimur, ut olerum ea ipsa excoctio perfectior est, quamquam eorum finis in seminibus sit, quibus ad pastum nonnunquam utimur. ^c Verum cum parti maiori, solum pingue incommodum sit, exiccat enim supra modum, et hac de causa plantas offendi, atq; ægrefcere creditur, tamē prodest ijs, quæ macilentæ, tristi, ieiunæq; constant natura, Argumentum quod olera, frugesq; solo tali exuberent, quæ quidem naturæ eiusmodi sunt. Ieiuna enim plus cibi desiderant.

d. h. 6.1. ^d Ononis iuxta folium aculeata est, altero quoq; folio conditur, ut Tribulus, & pbleus, quam nonnulli Stebam appellant. ^e uerum ramis aculeigerum est, anno tantum perdurans. folio rutæ similis, sed per totum apposito caulem, ut ueluti coronam ex internallis totâ speciem representet. florem minutulum, & in siliqua non undiquē septum edit. Nasceitur lento, plenoque solo, & præcipuē in segetibus, atq; cultis: Qua de causa agricolis inimica est. *Viua* admodum est: cum .n. altam noctem tellurem fuerit, protinus sua infima pellit, & singulis annis surculis in latus emissis, rursus anno postero, deorsum uersus pellere solita est. Effodienda tota, extirpandaq; penitus est, quod solo madefacto

facto agendum, sic enim facilius interit, nam si uel par-
uulum relinquatur; ex hoc assurgere iterum potest.
Incipit germinare æstate; perficitur autumno. Ergo
sylvestre genus suffruticum intelligere ex his licet.

^a Opitto bulbosa est, ut Cyix, & sisyrinchium. ^{a. h. 7. 13}

^b Orbis ligni uocant, cum facta conuolutatio quæ-
dam ampla, circulis pluribus circum acta sit, quam ne-
quæ nodum omnino dixerim, neq; ipsius crassitudinem
ligni, hæc enim per totum ferè, atq; æqualiter amplia-
tur, longe id iniquius, tractusq; difficilius, quam nodus
artifici obstat, proxime, atq; in lapidem, qui stimulus
uocitatur, nasci omnino uidetur.

^c Ordeum radicem numerosam habet, ueluti tri-
ticum. ^d & semen membrana quadam obtegitur, ^{c. h. 1. 9. d. h. 1. 18}

quam caro fructus obducit. ^e Quidam ex ordeo Triti-
cum; & ex tritico ordeum gigni, eodemq; fundo fieri
aiunt, sed hæc profabulosis quibusdam accipies. ^f mu-
tatur tamen triticum sylvestre, & ordeum cultura, &
loci mutatione. ^g uerum frumentaceum ordeum est, &
mature seritur, & plurimum septimo die exit. ^h & tan-
tum uno folio, per multisq; radicibus innititur, qua de
causa numeroso ramo, numerosoq; caule se attollit, ta-
men frumentago, & ordeago. (ut uocant) brachiat
omnino possunt; Hyeme in herba frumentacea manent.
Omnia tempore mitescente, caulem de medio mittunt,
atq; genticulantur, euenit, ut protinus intertio genu,
quædam

^{f. h. 2. 5.}

^{g. h. 8. 1. idem. c. 4. 8 h.}

quædam in quarto gerere spicam incipiant, se d' nondū
 aliqua mole conspicuam. Equidem per totum culmum
 spica digeritur, & ferme cum culmari inceperint, mox
 eam conspici sit, sed latet antequam adulta in folliculo
 fuerit: tum enim fætus suæ crassitudine molis evidens
 extat, mox folliculo absoluto, quarto, aut quinto die flo
 rere tam tritici quam ordeï incipit, totidemq; diebus fe
 re floret, qui uerò plus temporis referunt, septimo die
 deflorere notant. Postquam uerò defloruere crassan
 tur, perficiunturq; cum plurimum intra dies quadra
 ginta. differt terra à terra, & cælum à cælo ad fru
 ctuum perfectionem. quædam etenim loca proferre in
 tra pauciores dies uidentur, ut cum alia, tum & maio
 rem in uiodum conspicue Aegyptus: illic enim ordeū
 sexto à satu mense, tritici septimo metitur, quod apud
 plurimos octauo. Cæterum nec illo tractu sic multitu
 dine tota fieri solet, sed quo ad religionis primitijs tan
 tum statutum est, portatur enim ad sacrorum quorun
 dam usum farina noua sexto mense, & hæc à locis supe
 rioribus super memphim. Quin & Sicilia apud Mi
 las uocatas agri mesam celerem quandam fieri consu
 mationem serorum affirmant: esse nanq; sementem eo
 rum menses sex, sed tamen cum primis unâ metere pos
 se, qui mense nouissimo seuerit. Regionem istam adeo
 fertilem produunt, ut triginta choes reddere ualeat, pa
 scua mirifice habeat ubiq; sed mirabilius quod in Me
 li

ho fieri aiunt. sata enim intra triginta, aut quadragin-
 ta dies metere incipiunt. Quamobrem eius loci in co-
 las fari consueuisse. Eatenus ferendum, quatenus ma-
 nipulum uideris, sed hæc nec coctu facilia, nec multa
 apud eos fieri traditur. locum istum in exhibendis alime-
 tis mancum affirmant. Frumenta enim oleasq; ingenuè
 ferre, uitæ autem modice. sed omnibus mirabilius, quod
 in chalcta Rodiorum insula fieri solet, illic, enim locum
 quendam præcoquem, fertilemq; adeò narrant, ut or-
 deum satum in eo, cum cæteris fereretur in locis metere,
 iterumq; ferere, atq; cum reliquis una frugibus rursus
 metere possint. Maximam igitur hanc differentiam, si
 uera sit, arbitrari debemus. ^{d. b. 8. 4.} Triticum angustiori fo-
 lito quàm ordeum conditur, & caulem leuiorem, ruptuq;
 difficiliorem id habet: ad hæc triticum tunicis integri-
 tur multis. Ordeum nudum consistit, id enim omnium ^{idem c. 4. 2.}
 maximè caret tegumento. ^{b. b. 8. 6.} Solum siccum amat Ordeū,
 & triticum, ut pote quæ maximè ualeant perdurare,
 ubi non auihus, aut alijs bestiis tellus obnoxia sit, sed
 triticum frequentiam imbrium magis tolerat, quàm or-
 deum, tamen aqua cum omnibus proficit, ordeo, & tri-
 tico, reliquisq; frumentaceis florentibus obest, & nul-
 lum ex seminibus corruptis mutari in aliud aptum est,
 præterquam triticum, atq; ordeum, quæ mutari in lo-
 lutum asserunt, magisq; triticum, idq; imbris frequen-
 tibus fieri, & præcipuè locis humidis & imbre longe
 dilutis.

- a. h. 8. 8. dilutis. ^a Athenis itaq; ordeum, quod farina partem maiorem conficit (is enim ager. Ordeum eximie fert) non cum plurimum fuerit, sed cum quandam temperiem obtinuerit commendandum euadit. In Phocide uero circa elatiam non solum ordeum, sed etiam triticum optime redditur, Ergo semina meliora, deterioraq; tum cultura, tum terræ natura fieri possunt. ^b fruitur potissimum terra triticum, tum ordeum, quamobrem.
- c. h. 8. 10 triticum terram bonæ frugis exposcit; Ordeum uel in graciliori solo proficere satis potest. ^c Verum ordeum rubiginem magis sentit, quam triticum, & inter ordea aliud plus, aliud minus, sed præcipue dixerim. ^d Schilleis. intereunt etiam maxime uel flatibus.
- d. c. 3. 27. ^e triticum, & ordeum, cum aut florentia perflantur, aut flore dimisso protinus infirma concutiuntur, sed ordeum magis ita perire certum est. Triticum uero, & quoddam ordei genus non penitus exiccati patiuntur, quod ad redendam farinam in meliora minus arefacta putantur; qua de causa in acruos tam triticum quam ordeum componere assolent: uidetur enim in acruo crassescere potius, quam attenuari. ^f apud Babylonem sunt, qui ordeum, & triticum resilire in area narrent, modo eorum quæ fruguntur. ^g Indicum magnam differentiam facit, quandoquidem ramis natum sit brachiari, ut proposui, & spice uero alijs grandiores; rariioresq; constant, alijs minores, frequentioresq; & alijs distantiores à folijs,

lijis, alijs proximiores, ut Achilleis cognomine. Et
 ordeorum ipsorum aliud rotundius, minusq; aliud ob
 longius, maiusq; atq; spica rarius. Item aliud candi-
 dum, aliud accedens ad purpuram, quod & farinam
 reddere copiosius creditur, & contra hyemem, & fla-
 tus, & in totum contra Cœli mutationes candido ua-
 lidius esse uidetur. ^a Verum cum ex uno plures culmi
 prodierint, sic enim plures sticas emergi necesse est.
^b Verum ordeum uitibus amicum est. & solo pluuiio,
 atq; frigido ad tritici, & ordei fructificationem conue-
 niunt, sed magis solum gracile ordeum præstat. ^d So-
 la autem de radicibus enascuntur anno sequenti triti-
 cum, atq; ordeum; quin & anno primo hæc prætunsa,
 regerminant culmo è latere subnascante, ratio quòd
 hæc sola radicis copiam, uimq; obtinent.

^e Origanum cacumine perdurat, & uiuet. ^f Succus
 acris est, ut Satureiæ. ^g Verum plura sunt genera,
^h nam nigrum sterile constat; candidum fructuosum
 est. ⁱ Nasctur uerò Origanum, & Satureia spatio
 triginta dierum, & ex uetere semine celerius exit. ^k li-
 cet etiam germine defigatur. ^l Syluestre Origanum et
 satureia aspectu uicina urbanis sunt præterquam quod
 folijs ista minoribus, caulisq; Scabrioribus constant,
 & succo potissimum acriori uehementiori conduntur.

^m Verum difficile germinat in totum.

ⁿ Oriza (ut uocant) scribitur, & semini nuncupato si

Z milc

THEOPHR. DE PLANTIS.

mile est, pistumq; tanquam alica, redditur concōctū
perfacile, aspectu Lolij simile: statq; magna parte
temporis in aqua, effundit non spicam, sed ueluti iubam
modo milij, atq; panici.

- a. h. 1. 13. ^a Ostryis cornus nodosa est, & tam mas quam fo-
mina, licet mas nodosior sit. ^b Verum & in montibus,
i. h. 3. 6. & in planis nascitur. ^c & auctu facillima est. ^d &
d. h. 3. 10. species simplex Ostryis, quam nonnulli Ostriam uo-
cant, tam corpore, quam cortice Scissimæ uicina, folio
piri, præterquam quod id multo oblongius, inq; acutum
depressius, atq; maius, neruo multiplici de medio con-
stans. Reliquis autem rectis in modum costarum tum
prolixius, tum crassius porrectis: item per neruos ru-
gatum, & ambitu leuiter serratum; materies dura, de-
color, exalbida, fructus pusillus, oblongus, ordeo simi-
lis, colore flauus, radices sublimes, aquas, conuallesq;
arbor hæc gestit; domum inferri minime idoneam tra-
dunt; quippe mortiferam esse, & partus quacunq; fue-
rit, difficiles reddere. ^e Et à gelu minime comprimitur.
cum robustissima sit.
f. c. 5. 22. ^f Orobancha uocata eruum necat amplexu, compres-
suq; suo.
g. c. 1. 7. ^g Ouum inter semina est, et aliquid in se alimēti cōtinet,
quod unā cū generādi principio natura profundit, qua
h. c. 4. 3. de causa non inepte ^h Empedocles, oua solēt excelsis gi-
4. 7. gnere ramis, inquit. n. uerò natura seminū ovis proxima
est.



Paliurus^a frutex est.^b & spinosa.^c folia^{d. h. 1.5}
 cum extremo, tum lateribus sinuata concidunt.^{d. h. 1.8.}
^{c. h. 1.16.} Verum & in montibus, & in planis nascitur.^{d. h. 1.4.}
 & post occasum Vergiliarum fructum^{e. h. 3.6.}
 reddit.^{f. h. 3.17.} habet quoq; nonnullas differentias: omnes autem fructiferæ. Et paliurus quidem in siliqua fert, in qua terna, aut quaterna semina gignit, quibus medici contra tussim contusis utuntur; habent enim lentitiam quandam, atq; pinguedinem, ut semen lini. nascitur locis dilutis, & aridis, sicut rubus, sed non minus diluta querit, folijs deciduis est, non perpetuis, quemadmodum Ramnus.^{g. h. 4.4.} In Africa plurima est, quippe apud Hesperides hisce urendum utuntur, & fructicosior est, folio huic nostrati simile fructu diuerso, non, n. lato, sed rotundo, rubroq; magnitudine qua cedri, aut paulo minore: nucleum non mandendum, modo acthorum punici habet, fructum uero iucundum per se, atq; si quis uinum infundat, tum ipsum suauiore, tum uinum suauis reddi asseuerant.^{h. h. 4.9.} nonnunquam uero & ^{4. 13.} paliurus, & rubus in fluuiis, & locis aquosis prouenit.

^{i. h. 1.4.} Palmæ lignum ex neruo, & carne constat, sed cum indurescit transit in lignum, ut ferula, & quicquid lignescat.^{k. h. 1.7.} Verum cum terrestris sit, mari nonnunquam uiuit.^{l. h. 1.8.} Cortice uero scabro constat.^{m. h. 1.9.}

- lam omnino nullam habere uidetur, nam palmæ nullum
 a. h. 1. 14. penitus discrimen colligi potest. ^a Tamen ad longitu-
 dinem tantum apta palma augeri, ut etiam Abies,
 b. h. 1. 15. & cupressus. ^b quæ perpetuo uirent. ^c folia palma
 c. h. 1. 6. arundinacea habet. ^d Semina protinus post tegmen am-
 d. h. 1. 18. blientia subeunt, ut nucis, & amygdalæ, sed cautita-
 tem nullam habent, sed tota plena, atq; persolida sunt;
 e. h. 1. 22. tamen his quoq; humor quidam, calorq; inest. ^e Pal-
 marum mas quidem floret, foemina minime, sed protit-
 f. h. 1. 23. nus fructum promit. ^f & quodammodo cacumine gi-
 g. h. 2. 3. gnit. ^g Palma inter ea, quæ semine exeunt, & pinus
 conifera, & picea, tincosa maxime (ut ita loquar)
 h. h. 2. 8. persistere in totum uidentur. uerum palma in Græcia
 sterile scit. ^h Palmarum autem satus, cultusq; sequens
 præter ceteros peculiaris esse uidetur. serunt enim li-
 gna, quæ infructibus insunt, bina iuxta, composita sub
 ter, binaq; supernè colligantes, omnia prona, germen,
 enim non de supinis, cauisq; partibus mittunt, ut quæ-
 dam uolunt, sed de supernis, quapropter in eorum con-
 iunctione, quæ superponuntur, minime est operien-
 dum principia, unde germen. plura autem simul serun-
 tur, quoniam satio unius infirma est, horum radices.
 amplexu mutuo connectuntur; At illico primi ortus
 i. c. 1. 2. fe promiscui coalescunt, ut unus ex cunctis caudex consti-
 re idem, sed tiatur. Satus ex seminibus talis fieri solet, Ex trunco
 uide locum. autem palmæ ipsius cum partem abstulerunt supernā,
 qua

quæ cerebrum includitur, (auferunt autem cubitorum
 duorum longitudine) quam fissuris humore ipso detra-
 cto defodiunt. Solum arenosum, saluginosumq; con-
 cupiscit. ^a Idcirco ubi tale non sit agricolæ salem asser-
 gunt, quod quidem circum radices facere haud quaquā
 oportet, sed longius mandando accumulare quantum
 semisestarius. Quod talem appetat locum, illud quoq;
 argumento capiunt: nam ubi palmarum copia sit, hu-
 mius arenosa concernitur, quippe apud Babylonem,
 qua palmæ nascuntur, sic esse aiunt, quin & in Afri-
 ca, & Aegypto, & Phænice, Syriæ quoq; caua co-
 gnominata, tribus tantum in locis arenaceis eas gigni,
 quæ condi, reseruariq; possint; reliquias autem, quæ
 cæteris in locis proueniunt, niinimè durare, sed prott-
 nus putrescere. Virides tamen suaves esse, gustu gra-
 tas, atq; ita consumi amat, & crebram rigationem.
 De fimo diuersa sententia est, quidam enim has fimo
 delectari negant, sed abhorrere omnino statuunt: alij
 usum fimi cōcedunt, clementumq; magnum capere eo as-
 firmat, riuus tamen misceri finū oportere inquit, quē
 admodū Rhodij facere solent. Sed abunde uide totum
 caput. ^b Fructū autē ante quā coquant, maximè amit-
 tere possunt palma, & ficus. ^c Sed apud Babylonem
 fructum mitrum in modum largitur, in Græcia uerò ne
 fructum quidem maturat, apudq; nonnullos nec fructū
 ullum ostendit. ^d parte autem Africæ, qua nunquam
 pluit,

4. c. 2. 7.
 Idē c. 3. 22.
 23.

d. 1. 1.
 2. 2.

2. 1. 2.
 2. 2.

b. h. 2. 9.
 Idē c. 2. 11.
 c. h. 3. 5.

Idem fere 4.
 1. & c. 2.
 4.

d. h. 4. 4.

pluit, pleraq; alia, & palmas magnas, atq; optimas
 prouenire aiunt. Caterum ubi palma Salsiginem, &
 rigrum esse locum, nec admodum in profundo aquam
 comperiri, & dulcem, & ibi salsam inuicem propin-
 quas. ^a Palma pelagica, est caudice admodum breui,
 uirgis rectis ferè, quæ subtus excunt: nec in ambitu si-
 cut rami uirgarum, sed uelut in latitudinem sigillatim
 continuata, nonnunquam etiam inter se differentes.
 Virgarum autem, seu surculorum ipsorum similis na-
 tura quodammodo est, folijs spinarum acanicarum, ut
 soncis, atq; similibus. Hi tamen erecti, nec quemad-
 modum illa circunflexi, & folijs à mari corrosis: nã eo,
 quod medius caulis transmeat per totum, reliquũ quoq;
 aspectus proximum est: color his & caulibus, atq;
 uniuersæ plantæ ruber intense, atq; puniceus. ^b Ve-
 rum palma si quis cacumen auferat, non interire peni-
 tus aiunt, sed sterilefcere. ^c quoniam leuis est, tractu
 facilis, mollisq; est, quemadmodum suber. ^d tamen præ-
 ualida. ^e (Durat enim longo tempore) & in diuersum
 quàm cætera incuruatur, quippe cum reliquæ omnes
 in inferiora flectantur, palma è contrario fornicatim
 se flectit. ^f & suapte natura fumosa est, ex quo illud
 Cheremonis carmen, palmeq; uenas usq; fumosissimæ
 radice natas. ^g Semina ligno constant ^h (Et diuturnis-
 sima sunt, cum siccissima sint) non enim annotinis qui-
 busdam, aut nouellis hæc ferre solet, sed ijs, quæ præ-
 gnans

gnans gestat modo spicati seminis fructum condit. Vir-
ga enim, quæ fructum gerit, quemadmodum stica
erumpit: Causam uerò siccitatem, formamq; uniuersa-
sam arboris dixerim. Cum enim custodiam fructus de-
siderent siue extra cōsistant, siue intus formati demum
erumpat: cæteris custodiam illam folia præstant, pal-
mæ quoniam fructus non apud folium hæreant, concre-
scent intra arborem necesse est. ut ualidi, formatiq; tan-
dem reddantur aeri, quapropter in utero parentis natu-
ra partum seruauit, quòd similiter atq; frugibus inspi-
candis agatur.^a Omnia ferè, quæ se in altum extollunt,^{a. c. 3. 9.}
compescenda agricolæ censent, præter quàm illa, quæ
apta sint excelsa consistere, ceu palma, pinus, & cu-
pressus.^b pereunt de cacuminatæ.^c immo palma uulne-^{b. c. 5. 24.}
rata quoq; in cerebro perit.^d Verum picea, & palma^{c. c. 5. 23.}
dimutilatione animalium non intereunt, sed sterile-
scunt: Animalium enim depastio damnosa est, quod
dum germen ædit, ac detrahit, simul quoq; adurit, fit
enim hinc, ut plantæ grauius infestentur.

^e Paludapium differt ab Equapio, & Montapio,^{c. h. 7. 6.}
apud enim aquæductus, & in paludibus prouenit, fo-
lio raro, nec hirsuto consistit, sed simile quodammodo
apio est, odore, sapore, figuraq;.

^f Panacis pleraq; assignantur commoda, nec omnia f. h. 9. 10.
ad idem fructus, sed ad abortus, & distentiones, &
cuiusmodi genera dolorum. Item ad aures, & uocis lan-
gorem,

THEPHR. DE PLANTIS.

gorem, radix ad partus, & mulierum profluua, &
ad iumentorum morbos, nec non ad irinum unguentum
utilis, addit enim suauem olentiam, sed fructus radice
uvalidior est. Nasquitur circa Syriam, scatur per mes-
sem tritici. uerum plura sunt panacis genera. panacem
enim appellant primam, quæ in Syria nascitur, de qua
supra retulimus. Secundam Chironiam. Tertiam
Æsculapicam. Quartam Herculanam. Chirontia
folium habet simile rumici, florem auri specie, radicem
longam amat loca pingua, utuntur ea aduersus uipe-
ras, & phalangia, & tineas uestium, & cætera re-
ptilia data ex uino, & uncta oleo: Viperæ autem mor-
sui aspergitur ex acido, & potui datur, ualere aiunt, et
ad ulcera ex uino & oleo, & ad nascentia ex melle.
Æsculapicum radice constat magnitudine palmi, can-
dida, & crassa uehementer cortice crasso, & salso, &
caule geniculato undiq; folio thapsiæ simili, sed crassio-
ri. ualere aiunt aduersus serpentes, si bibatur crassum,
& ad lienem, cum sanguis circa eam constiterit ex
mulso, & capiti trito ex oleo, & unctum, & si qua
alia parte obscura laboret quis, & uentris doloribus
ex uino rasum, posse etiam & longas ægritudines de-
pelli. Insuper & ulcerosis humidis quidem siccum
aspersum, prælotumq; uino calido; siccis autem ex ui-
no subactum, & aspersum. Herculana uero constat fo-
lio magno, et amplo, ut quoquo uersus tres palmos per-
ficiat

ficiat, radice crassitudine prope digiti, bifida; aut tri-
fida, gustu subamara, odoratu sincerum. ^a Huius sedo-
lente, utili contra morbum comitalem pota; coagulo
uituli marini admisto ad quartam partem, & contra
tormina è uino dulci, comuoda etiam ad uulnera sicca,
ex melle admadida. Igitur hæc differentiis illas sortiū-
tur. Sunt uel alia quædam panaces, una folio tenui,
altera non tenui, sed uires hisce ambabus eadem ad mu-
lierum profluvia, & ulcera; tam cætera, quàm putri-
da. & pascentia, ^a Panacea circa clitoriam nascitur. ^{a. h. 9. 13}
^b Panacem æsculapicam cognominatam effodientes ua-
rium genus frugum uicissim terræ injicere aiunt, &
placent im ueluti mercedem quandam exolueri, & en-
se bina adacto acie ter circumscribentes succidere. ^{b. h. 9. 9}
Quodquæ primum inciderint, sublime tenere, dein-
de alterum cedere, & eiusmodi alia complura nar-
rant.

^c Panicum æstiuus feritur, ut Milium, & Sesa-
mum, & horum generatio simplex, & una est, quip-
pe semine tantum omnia exeunt, nisi quid rarenter par-
ceq; radice profiliat. ^d Caulis arundinaceus, flos lanu-
gineus. ^e & minus aquarum indiget. ^f Verum facile
germinat, consumaturq; celerrimè, & reseruati egre-
gie potest, ut etiam de milio diximus. ^g Semina uerò
quo minora eo fertiliora sunt, ut milij, & panici, &
papaueris, quæ etiam radicem ualidam agunt, & pro

c. h. 8. 1.

d. h. 8. 3.

e. h. 8. 7.

f. h. 8. 10.

g. c. 2. 17.

c. 4. 16.

A a sue

THEOPHR. DE PLANTIS.

suae radicis modo caules reddunt, uidelicet à ualidis
ualidos, atq; multiplices; Quapropter cum à princi-
pio exiguo, multi prouenerint caules, fructum quoq;
abundè profundior ratio est.

- a. h. 1. 15. ^a Papauer suffrutex est, & semper uiuet. ^b Semina
b. h. 1. 18. uasculo inclusa habet. ^c & succus lacteus est. ^d & à
c. h. 1. 19. tertio capite lactisuccatio fieri solet. ^e Verum sylue-
d. h. 9. 8. stris papaueris genera plura notantur, quoddam enim
e. h. 9. 13. corniculatum appellatum, quoddam autem nigrum est,
folio constans uerbasci nigri, sed minus nigro: cauli al-
titudo cubitalis, radix breuis, per summaq; cespitum
f. c. 2. 17. fructus inflexi, ut cornicula figurantur. ^f (uerum cum
4. 16. exiguum fructum ferat, fertilissimum est) Legitur cir-
ca messes, & aluum purgare potest, folium albuginè
ouibus aufert: nascitur iuxta mare locis saxosis. Aliud
Erraticum uocatum non absimile intubo erratico con-
stat: quamobrem in usum uenit cibarium: nascitur in
aruis, potissimum inter ordea, florem ruffum producit:
caput unguis pollicalis magnitudine auget, legitur an-
te ordeis messes, atq; utridius etiam purgat inferius.
Aliud Herculanum nuncupatum, folio constat stru-
thi, quo splendorem linteis tribuunt, radice in summa
terræ eunte, fructu albo; Huius radix purgare supe-
rius nata est. Non desunt, qui contra comitalem mor-
bum ea utuntur in uino mulso, hæc igitur uelut aequi-
ua quædam subiungere placuit.

Papyrus,

^a Papyrus, sari, & mnasium dulcedine, copiatq; ali^a b. 4.94
 moniæ præstare uidentur. Sed Papyrus nascitur non
 in altitudine gurgitum, sed propè intra duo cubita non
 nusquam etiam minus.^b (in Aegypto papyrus feru- b. b.6.2.
 laceus constat, ut etiã laferpitium.) Crassitudine radi-
 cis, qua uola uiri robusti, longitudine super dena cu-
 bita prouenit: super terram ipsam radices obliquas, te-
 nues, densasq; in limen demittens sursum, quos papy-
 ros dixere, profert, triquetros, angulatos, magnitu-
 dine quaternorum fernè cubitorum, coma inutili, exi-
 liq; fastigiatos, fructus nullius facundos, hosque ex
 multis partibus mittit, radicibus pro ligno utuntur, non
 tantum ignis gratia, sed ad uasa quoq; plurifariam fa-
 cienda. Quippe materiem amplam probamq; præstāt.
 Papyrus ipse ad plurima utilis, etenim ex eo nauigla fa-
 ciunt, & è libro uela, tegetesq; texunt, & uestem quan-
 dam, atq; stragula, ac funes, aliaq; plura. Et quidem
 externis hominibus Chartæ euidentissimæ habentur:
 sed summam, frequentissimamq; opem, & in re cibæ-
 ria præstāt. Omnes enim incolæ & crudum, & eli-
 xum, & assum manducant, & succum deuorant: man-
 ducamentum autem expuunt. Talis papyrus est, talesq;
 usus præbet. Nascitur & in Syria circa Lacum, quo
 & calamus odoratus, unde & Antigonus in re na-
 uali funes fecisse proditur.

^c Pastinaca specie lauri colore croci apud Archæ. c. b.9.15.

A a ii des

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 9. 22.* ^a *des nascitur. Sed agro spartensi Achaia pastijac. laudatissimam referunt: natura calefactoriam, radice nigram.*
- b. h. 1. 15.* ^b *Phellodris (ut Archades uocant) semper uiuet.*
- a. h. 3. 16.* ^c *natura huiusmodi est, ut simplici quidem ratione inter ilicem, & robur hanc esse putaueris: Et quidem foeminam ilicem esse putarunt, ideoq; ubi ilex non prouenit, hac ad palustria similiaq; utuntur opera. ut Lacedemonij, & Elij Dores quidem uel agrestem eam appellant: Est mollior, ac subtilior ilice, durior, ac spissior quercu, colore ligni decorticati, candidior ilice, fuluio quercu, folio similis ambabus, uerum maiori quam ilex, minori quam Quercus, & fructum pro magnitudine minorem quam ilex habet, maiorem quam quercus: fructum ilicis, huiusq; nonnulli Aylum uocant, roboris autem glandem, est & medulla manifestior, quam ilex. Phellodrys natura huiusmodi est.*
- d. h. 1. 22.* ^d *Pepo singulis feminibus singulos flores annexos gerit, quippe flos in postremo fructus, & crescentibus fructibus.*
- e. h. 7. 3.* ^e *Etibus, flos diu infixus seruatur. Verum breuem radicem sortitur, sicut omnia aestua.*
- f. h. 1. 11.* ^f *Perdicium (quod uocant) quod perdices se ad id uolent, terramq; suffodiunt, radice eiusmodi continentur, ut aspalax, & Crocum.*
- g. h. 2. 3.* ^g *Persicum Aegypti sterile scit. Sed aliquando*
h. h. 3. 5. ^h *ibi & locis proximis fructificat, quamquam in Rhodo*
i. h. 4. ⁱ *usq;*

usq; florem duntaxat deuenit. ^a est & in Aegypto ^{a. h. 4. 22.}
 alia quoq; arbor persea dicta aspectu magna, formo-
 saq; folio, flore, ramo, totaq; figura potissimum piro
 uicina, nisi quod altera folio perpetuo, altera deciduo
 est, fructum abunde parit, omniq; tempore perficit,
 quippe nouus anniculum semper occupat. Maturitas
 anniuersariorum afflatu conficitur: reliquum crudio-
 rem auferunt, atq; recondunt. Est magnitudine piri,
 figura oblongus amygdalæ modo, colore herbidus, nu-
 cem intus, quemadmodum prunus continet, uerum lon-
 ge minorem, mollioremq;: carnem uehementer dulcem,
 suauem, concoctumq; facilem; nil enim eos, qui nimium
 comederint, tentat, radice arbor exuperat, tum longi-
 tudine, tum etiam crassitudine, multitudineq; mate-
 riam robustam, & uisu gerit decoram, atram, ut fa-
 ba græca.

^b Pes gallinaceus inter olera numeratur.

b. h. 7. 7.

^c Petrea circa Psophidem plurima, & optima pro-
 uenit.

c. h. 9. 15.

^d Peucedenum radicem crassam, & spissam habet, ^{d. h. 9. 14.}
 quæ quinque, aut sex annis perdurat. ^a nascitur etiam ^{a. h. 9. 15.}
 apud Archades. ^e Verum radix uim calefactoriam ^{f. h. 9. 22.}
 habet: Quamobrem unguentum quidam uel ex ea
 subdatorium faciunt, datur & ad Lienes radix peu-
 cedani: Semen inutile est, nec succus ulla in re
 prodest.

Pbleum

THEOPHR. DE PLANTIS.

4. h. 4.9. ^a Phleum in fluuijs, & paludibus nascitur. ^b & iuxta aculeum folium gerit, ut tribulus, & Cest parisi; quæ peculiare nimirum obtinent, ut non solum caulem aculatum, sed etiam folium habeant hispidum. ^c in lacu Orchomenio phleum fructificare proditum est, et phlei antellam uocatam quod ad Lixiuum utuntur, id placentaceum quoddam est, molle, rubidum, & phlei uero, & Butomi saxmina sterilis est, ad nexus utilis, mas inutilis, uerum non solum in aqua nascitur, sed etiam in terra. Radix sola pecudibus pabulo est: cum aut squalor uiget, nec humor qui perlueret, cacumina incessit.
- d. h. 6.5. ^d Verum folio constat carnoso. Phleum multifidum, multi stirpsq; est, non tamen aliè descendit, germinat, cuius Vergilijs, primoque aratro una, nec folia id dimitte, non enim annuum, sed diuturnius est.
- e. h. 1.15. ^e Philyca ex syluestribus perpetuo uiuet. ^f & in montibus proprie nascitur. ^g & incunte uere germinat. ^h uerum obediensissima Philyca est, candorq; ei celsi modo. sed non est admodum utilis, præterquam in alendo pecore, semper enim fronde abundat.
- i. h. 1.15. ⁱ Picca ex syluestribus perpetuo utret, ^k & cum semine exeat, tinea maxima in totum esse uidetur, ut pinus conifera, & palma. ^l Verum picca in montibus proprie nascitur. ^m Et eam quidam florere minime, sed nucamentum picæ proportionem grossis præacidis respondere existimant. sed germinat circiter quindecim diebus

bus post Vergilias. ^a & auctu facillima est, & non ^{a. b. 3. 7.}
 caret amento (ut uocant.) ^b uerum picea à pino dista- ^{b. h. 3. 10.}
 re uidetur, quod pinguior, folio tenutor, magnitudine
 minor, erecta^q minus assurgit: præterea, quod conum
 minorem, horridioremque nucleum, resina rosidiorem
 ferat. Ambabus folia capillata, & materies candi-
 dior, similiorque abietis, atq; in totum minus pinosa.
 Magnam et hanc ad pinum differentiam habet: pinum
 enim adustis radicibus nunquam regerminare, ^c piceam
 regerminare quidem affirmant, ut in Lesbo accidit in
 censo monte Pyrrhæo, qui piceis scatet. ^{c. h. 4. 19.} Verum pi-
 cea detracta coma tota perit, ut pinus, & abies. ^{d. h. 5. 8.}
^d domibus, & nauibus utilis est, sed putrescere celeri-
 ter incipit. ^e sed quæ robusta inter ea sunt, quæ scri- ^{e. h. 1. 9.}
 bere possunt, hæc diutius permanent, ut palma, &
 Pinus conferta nuncupata, & picea pediculifera. ^{f. c. 1. 2. 13.}
^f rō uerō fructum perficit, sicut omnia perpetuò uiuentia.

^g Pinus proceræ, & longo caudice est, & nodosa. ^{g. h. 1. 8.}
^h medullam lignosam habens, unam uerò radicem pre- ^{h. h. 1. 9.}
 grandem in ima descendentem, sed parua complures ^{idem fert. h.}
 ab illa exeunt. ⁱ folia rara sunt sicut abietis, & cedri, ^{i. h. 1. 10.}
 & extremitate pungentia. ^k succus resinaceus ^{k. h. 1. 19.}
 (lachrymæ modum) ut omnium conferrarum, ^{l. h. 9. 10.}
^m quæ om- ^{m. h. 2. 2. 3.}
 nes ex semine exeunt. ⁿ Quidam pinum florere existi- ^{n. h. 3. 6.}
 mant. omnium itaq; arborum germinationes conspicua,
 sed abietis, piniq; maximè, quoniam genicula inuer-
 sus

THEPHR. DE PLANTIS:

a. h. 3. 7. sus rectos porrigantur, ramiq; conditi ex æquo spectentur.^a habet autem amentum, & difficile augetur.^b cau-
b. h. 3. 8. dice uerò præciso pinus & abies radicitus omnino eo-
c. 3. 9. dem anno inarescunt, etiam deciso cacumine.^c Si quis
e. h. 4. 18. corticem detraxerit statim moriuntur.^d Et plura sunt
d. h. 3. 10 genera, aliam enim urbanam, aliam Syluestrem assignant, syluestris binum statuunt genus, quorum alterum Idæam, alterum Maritimam uocant. Harum rectior, celsior, materieq; crassior Idæa: folio tenuiori, imbecillioriq; Maritima, & cortice leuiori, utiliq; ad
 coria, quod alteri minus. Nux maritimæ rotundæ, breuiq; de hiscens tanquam syluestrior: lignum maritimæ ualidius, nam eas quoq; terrenorum differentias sumi par est: haud enim incognita sunt usus causa, Idæa ramosior, crassiorque stat. Ad hæc picem ipsa omnino copiosius præbet, pix nigrior, dulcior, tenuior, odoratuque gratior sentitur, dum cruda est, decocta uerò deterior euadit: quoniam multum habeat ferum. Sed quæ isti nominibus proprijs distinguunt, alij mare, fœminaque diuidere solent. Macedones uerò etiam genus quoddam pini sterilem dicunt, & marem breuiorem, folioq; duriolem, fœminam proceriorem, folijs pinguem, mollem, procliuioremque. Mari lignum circuncincta medulla durum, & operi fabrili uersuale. fœminæ tractu omnino facile, atq; mollius, quod quidem omnium ferè marium, fœminarumq; publica
 differentia

differentia est, ut caesores materiae asseuerant. Quippe
 omnis mas securi breuior, & contortior, operique
 difficilior est, coloreq; nigrior, faemina procerior, atq;
 facilior: nam & quod ægidem appellant, pinus faemina
 gignit, id autem est cor eius. Ratio, quod minus
 pinosa, minusq; tædam ingerens, & leuior, cursuque
 uenarum probior est. fit in arboribus magnis cum pro
 stratae parte candida, & circinante putruerint: his
 enim detractis medullæ relictæ securis adigitur; est de
 color omnino, neruoque tenui compacto, quam Idæi
 Tedarij ficum appellant. quod uerò pinis subnascitur,
 colore tæda rubidius potius inest, odoris grauißimi,
 nec tædam redolens, nec flagrans, sed ab igne dissiliens.
 Igitur genera pini hæc assignant, urbanum, atq; sylue
 stre, syluestrisq; marem, & faeminam, ac tertiam ste
 rilem, hæc, & plura uide in capite prædicto. ^{a. h. 5. 1.} uere
 istæ caduntur, cum germinant, nam materies odora
^{b. h. 5. 2.} tior redditur. ^{b.} distant uerò inter se pinus & abies. pi
 nus enim carnosior, neruisque paucis est, abies nerua
 cior, atq; rigidior, ita ut utrunque è contrario habeat
 neruos ualidos, carnem mollem, & raram. uide Abie
 tem. ^{c. h. 5. 5.} Verum pinus natura perpetua est, durat enim
 maximopere, sed dicunt plusquam abietem corrodi à
 teredine posse. ^{d. h. 5. 6.} ambarum uerò nodus difficilimus con
 stat. ^{e. h. 5. 7.} at ad nauigia aptissimæ constant. ^{f. h. 5. 9.} in agro La
 tino pini, & abietes, tum magnitudine, tum pulchri

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 5. 10. tudine inter omnes italicas præstant. ^a Carbores pi-
 b. c. 1. 26. neos excussores potius quarunt. ^b Verum inter reliqua,
 quæ locis argentibus ualcant perdurare plus caloris son-
 tiuntur, ut abies, pinus, cedrus, hedera, & iuniperus;
 super his enim nec niuem posse durare autumant, scili-
 cet ratione caloris. ^c Sed pinus & hedera loca potius
 frigida amant, has enim locis feruidis peruenire non
 d. c. 2. 9. posse nulli dubium est. ^d tamen locis apricis pinus gau-
 e. c. 3. 15. det. ^e benigna uerò omnibus est, quod radice simplici,
 altaq; sit, scribitur enim sub ea & myrtus, & laurus, et
 alia pleraq;: nec quicquam prohibet radix, quo minus
 hæc libere augere ualeant, ex quo intelligi potest radi-
 cem plus infestare, quàm umbram, quippe cum pinus
 e. 5. 15. umbram amplissimam reddat. ^f Arborum autem genus
 etiam aliquod fortasse est, cui corruptio secundum na-
 turam sponte, nec ullo pacto afflictato, sed bene uigen-
 ti ueniat, ut pino cum radices mutatae in tedam fuerint,
 idem. c. 6. ita enim ex nimietate nutritionis, atq; excessus, cumq;
 15. pertedam transmittere pabulum arbores nequeant, mo-
 riuntur. Quod proximum illi uidetur, quod animalibus
 euenit, quæ extra modum crassantur, atq; pingue-
 scunt, cum enim auram attrahere nequeant, nec ullo pa-
 cto spiritu uti possint propter obesitatem, condensatio-
 nemque, & illa strangulantur, & pinus. Quamobrè
 non ineptè rustici uocabulum istud de pinu usurpant.
 pinum enim strangulari aiunt obesitate, atq; pingue-
 dine:

dine: quippe omnia spiritum desiderant aliquem, uel
 solutionem, uel meatuum libertatem. Ergo corruptio-
 nes naturales tales sunt. Verum teda detractu serua-
 ri potest. huic etiam pinguedo pro magno habetur. sed
 hæc omnia, ceteraq; non nisi bene adulta sufferre pos-
 sunt, & hinc quamuis putruerint, seruari tamen, ac ui-
 uere quæunt, nam & primum haud semper redificare
 consuevere, sed cum uiget, ætateq; maior est. caret
 enim teda nouella, qua humorem non excoquit, neq; ag-
 gregat; sed totum ad germina, incrementaq; altitudi-
 nis absorbit. Statim enim ac dilatari inceperit, uis illa,
 & habitudo thedæ uidetur consequi. fructus omnino
 pinguis est, ut abietis, piceæ, & Lauri.

Piper fructus est, eius genera duo: unum enim ro-
 tundum erui modo, tegmine, carneque constans; sicut
 laurina bæcha, subrutilum, alterum ob longum nigrum
 semina papaueris continens, longe hoc ualidius altero:
 ambo uim calefactoriam obtinent. Quamobrem con-
 tra cicutam auxiliantur, & etiam Thus.

Pirus natura fructificosa est, & sæpius purgan-
 da. folia orbiculata. Semina congesta, & aliquo
 putamine, & tunica continentur. Succus aquosus est.
 flores foliati, & raro ex ramis prouenit. Verum
 cum nascitur ex eius fructu degenerat. Verum in se-
 rendo maxime considerandum est positum, scilicet, quæ
 in Aquilonem, in meridiem, & in orientem spectent.

a. c. 3. 27. *stant.* ^a *Vermes generantur in ipso, & aliis legumi-*
 idem fere. c. nibus, ob alimenti, cœlique intempericm, uidelicet,
 4. 16. cum plus, minusue alimenti præbetur, aut aer inmor-
 dice humidus, siccusue est, uel etiam cum non tempesti-
 b. c. 4. 16. ue humescit. ^b *Ucrum pisum fragilissimum omnium est,*
 21. 4. 3. *quippe eruginem uehementissime sentit, quia multifo-*
 02. 5. 3. *rum, terrenum, uagumq; est, implet enim locum to-*
tum, etiam si amplo interuallo positum sit, & frigori-
bus, atq; gelationibus id obnoxium maxime, quia ra-
dice imbecilla cohæret.
 c. h. 3. 10. *Pix è pino gignitur. Vide Pinum.* ^d *Verum pt-*
 d. h. 3. 9. *ccm urere hunc in modum consuevero, cum locum æqua-*
 21. 1. 1. *lem præparauerint, & ueluti arca facta cœcursum ha-*
 21. 1. 1. *bente, in medium diligenter pauimentarint, truncos*
 1. 1. 1. *perfixos componunt; proxime sanè compositioni carbon-*
 1. 1. 1. *em facientium, præterquam quod sine fossa opus per-*
 21. 1. 1. *ficiunt, lignis exēctis, & inter se cohærentibus, ita ut*
 21. 1. 1. *altitudinem assidue pro multitudine capiant. Quos fî-*
 21. 1. 1. *ri aiunt, cum compositionem descripserint, circuitu cœ-*
 21. 1. 1. *tenorum octuagenorum cubitorum, altitudine uerò cū*
 1. 1. 1. *plurimum sexagenorum, aut centenorum, & quingua-*
genorum ambabus, si tharsa pinguisima sit; cum igitur
Tedam ita construxerint, & materiem pertex-
erint aliqua terra super infusa undiq; summa cum dilige-
tia occultant, ut ignis nulla ex parte emicare possit, pix
enim peribit, si id acciderit. Succeedunt autem per adi-

tum relictum, de in eam quodq; partem stipant materie, & obstruunt terra, reliquisq; omnes obseruant, & quacumq; fumum protrudi uiderint, scalis scandentes terram, assidue infundunt, quo nullo pacto flamma erumpere possit. Canalis uero per medium structus aceruum, picem fluentem infoueam ducit, cubitis circiter quindecim ab aceruo pix effluens tactu frigida fit. uritur duos dies, & totidem noctes cum plurimum. sæpe enim postridie ante solis occasum exusta iam est: ro-
 gusq; cessit, id enim euenit, cum nihil reliquum est, quod amplius fluat, totum autem tempus, quo teda uritur uigilantes obseruant, ne quid ignis erumpat, & sacrificiant, atq; concelebrant, præcanes, ut pix sibi copiosa, bonaq; benignitate fiat Deorum. Macedones hoc modo urere assolent. In Asia uero Syrios non detrabere tedam aiunt, sed in arbore ipsa adurere instrumēto inuento quodam industrie fabricato. Hoc enim partem unam accendi, qua liquefacta aliam, atq; aliam ut ce pari successione ignem recipere, finis autem operis, & cessandi inditium, cum scilicet nihil defluit, Terebinthos illi urunt, Pinum enim nequaquam Syria fert, resina & pix modo fieri solent. ^a uerum picem, Te-
 dam, & resinam nullam penitus arbores nouelle habent. ^b Habet uero maximam uim necandi plantas nouellas, sicut Oleum.

^c Placida quercus genus, uide Quercum.

Plantago

4. 16. 16.

1. 5. 22

1. 3. 9.

suæ radicis modo caules reddunt, uidelicet à ualidis ualidos, atq; multiplices; Quapropter cum à principio exiguo, multi prouenerint caules, fructum quoq; abundè profundi ratio est.

- a. h. 1. 15. ^a Papauer suffrutex est, & semper uiuet. ^b Semina uasculo inclusa habet. ^c & succus lacteus est. ^d & à tertio capite lactisuccatio fieri solet. ^e Verum syluestris papaueris genera plura notantur, quoddam enim corniculatum appellatum, quoddam autem nigrum est, folio constans uerbasci nigri, sed minus nigro: cauli altitudo cubitalis, radix breuis, per summaq; cespitum fructus inflexi, ut cornicula figurantur. ^f (uerum cum exiguum fructum ferat, fertilissimum est) Legitur circa messes, & aluum purgare potest, folium albuginè ouibus aufert: nascitur iuxta mare locis saxosis. Aliud Erraticum uocatum non absimile intubo erratico constat: quamobrem in usum uenit cibarium: nascitur in aruis, potissimum inter ordea, florem rufum producit: caput unguis pollicalis magnitudine auget, legitur ante ordeæ messem, atq; uiridius etiam purgat inferius. Aliud Hierculanum nuncupatum, folio constat struthi, quo splendorem linteis tribuunt, radice in summa terræ eunte, fructu albo; Huius radix purgare superius nata est. Non desunt, qui contra comitalem morbum ea utuntur in uino mulso. hæc igitur uelut æquiuoca quædam subiungere placuit.

Papyrus,

Papyrus, sari, & mnaſium dulcedine, coptaq; ali
 monie præſtare uidentur. Sed Papyrus naſcitur non
 in altitudine gurgitum, ſed propè intra duo cubita non
 nuſquam etiam minus. ^b (in Aegypto papyrus feru- ^{b. h. 6. 2.}
 laccus conſtat, ut etiã laſerpitium.) Craſſitudine radi-
 cis, qua uola urri robuſti, longitudine ſuper dena cu-
 bita prouenit: ſuper terram ipſam radices obliquas, te-
 nues, denſasq; in limen demittens ſurſum, quos papy-
 ros dixere, profert, triquetros, angulatos, magnitu-
 dine quaternorum ferme cubitorum, coma inutili, exi-
 liq; ſaſtigiatos, fruſtus nullius ſæcundos, hoſque ex
 multis partibus mittit, radicibus pro ligno utuntur, non
 tantum ignis gratia, ſed ad uafa quoq; pluſifariam fa-
 cienda. Quippe materiem amplam probamq; præſtat.
 Papyrus ipſe ad plurima utilis, etenim ex eo nauigla fa-
 ciunt, & è libro uela, tegetesq; texunt, & ueſtem quan-
 dam, atq; ſtragula, ac funes, aliaq; plura. Et quidem
 externis hominibus Chartæ euidentiffimæ habentur:
 ſed ſummam, frequentiffimamq; opem, & in re ciba-
 ria præſtat. Omnes enim incolæ & crudum, & eli-
 xum, & aſſum manducant, & ſuccum deuorant: man-
 ducamentum autem expuunt. Talis papyrus eſt, talesq;
 uſus præbet. Naſcitur & in Syria circa Lacum, quo
 & calamus odoratus, unde & Antigonus in re na-
 uali funes feciſſe proditur.

^c Paſtinaca ſpecie lauri colore croci apud Archæ- ^{c. h. 9. 15.}

h. 9.22. des nascitur. ^a Sed agrospartensi Achatae pastinacae laudatissimam referunt : natura calefactoriam , radice nigram.

b. b. 1.15. ^b Phellodris (ut Archades uocant) semper uiuet.

c. h. 3.16. ^c Natura huiusmodi est , ut simplici quidem ratione inter ilicem , & robur hanc esse putaueris : Et quidem foeminam ilicem esse putarunt , ideoq; ubi ilex non prouenit , hac ad palustria similiaq; utuntur opera , ut Lacedemonij , & Elij Dores quidem uel agrestem eam appellant : Est mollior , ac subtilior ilice , durior , ac spissior quercu , colore ligni decorticati , candidior ilice , fuluior quercu , folio similis ambabus , uerum maturi quam illex , minori quam Quercus , & fructum pro magnitudine minorem quam illex habet , maiorem quam quercus : fructum ilicis , huiusq; nonnulli Aylum uocant , roboris autem glandem , est & medulla manifestior , quam illex . Phellodrys natura huiusmodi est.

d. h. 1.22. ^d Pepo singulis feminibus singulos flores annexos gerit , quippe flos in postremo fructus , & crescentibus fru-

e. h. 7.3. ctibus , flos diu infixus seruat^e . Verum breuem radicem sortitur , sicut omnia aestiua.

f. h. 1.11. ^f Perdicium (quod uocant) quod perdices se ad id uolunt , terramq; suffodiunt , radice eiusmodi continentur , ut aspalax , & Crocum.

g. h. 2.3. ^g Persicum Aegypti sterile scit. ^h Sed aliquando

h. h. 3.5. ibi & locis proximis fructificat , quamquam in Rhodo

i. 2.4.

usq;

usq; florem duntaxat deuenit. ^a est & in Aegypto ^{a. h. 4. 2.}
 alia quoq; arbor persca dicta aspectu magna, formo-
 saq; folio, flore, ramo, totaq; figura potissimum piro
 uicina, nisi quod altera folio perpetuo, altera deciduo
 est, fructum abunde parit, omniq; tempore perficit,
 quippe nouus anniculum semper occupat. Maturitas
 anniuersariorum afflatu conficitur: reliquum crudio-
 rem auferunt, atq; recondunt. Est magnitudine piri,
 figura oblongus amygdalæ modo, colore herbidus, nu-
 cem intus, quemadmodum prunus continet, uerum lon-
 ge minorem, mollioremq;: carnem uehementer dulcem,
 suauem, concoctusq; facilem; nil enim eos, qui nimium
 comederint, tentat, radice arbor exuperat, tum longi-
 tudine, tum etiam crassitudine, multitudineq; mate-
 riam robustam, & uisu gerit decoram, atram, ut fa-
 ba græca.

^b Pes gallinaceus inter olera numeratur. ^{b. h. 7. 7.}

^c Petreæ circa Psophidem plurima, & optima pro-
 uenit. ^{c. h. 9. 15.}

^d Peucedenum radicem crassam, & spissam habet, ^{d. h. 9. 14.}
 quæ quinque, aut sex annis perdurat. ^e nascitur etiam ^{e. h. 9. 15.}
 apud Archades. ^f Verum radix uim calefactoriam ^{f. h. 9. 22.}
 habet: Quamobrem unguentum quidam uel ex ea
 subdatorium faciunt, datur & ad Lienes radix peu-
 cedani: Semen inutile est, nec succus ulla in re
 prodest.

Pbleum

THEOPHR. DE PLANTIS.

4. h. 4.9. ^a Pbleum in fluuijs, & paludibus nascitur. ^b & iuxta aculeum folium gerit, ut tribulus, & Cef paris; quæ peculiare nimirum obtinent, ut non solum caulem aculatum, sed etiam folium habeant hispidum. ^c in lacu Orchomenio pbleum fructificare proditum est, et pblei antellam uocatam quod ad Lixiuum utuntur, id plantaceum quoddam est, molle, rubidum, & pblei uerò, & Butomi saxmina sterilis est, ad nexus utilis, mas inutilis, uerum non solum in aqua nascitur, sed etiam in terra. Radix sola pecudibus pabulo est: cum aut squalor uiget, nec humor qui perlueret, cacumina incessit.
- d. h. 6.5. ^d Verum folio constat carnosum. Pbleum multifidum, multi stirpsq; est, non tamen aliè descendit, germinat cum Vergilijs, primoque aratro una, nec folia id dimittit, non enim annuum, sed diuturnius est.
- e. h. 1.15. ^e Philyca ex syluestribus perpetuo uiuet. ^f & in montibus proprie nascitur. ^g & ineunte uere germinat. ^h uerum obedientissima Philyca est, candorq; ei celastri modo, sed non est admodum utilis, præterquam in alendo pecore; semper enim fronde abundat.
- i. h. 1.15. ⁱ Picea ex syluestribus perpetuo uiuet. ^k & cum semine exeat, tinea maxime in totum esse uidetur, ut pinus conifera, & palma. ^l Verum picea in montibus proprie nascitur. ^m Et eam quidam florere minime; sed nucamentum piceæ proportionem grossis præciduis respondere existimant. sed germinat circiter quindecim diebus.

bus post Vergilias. ^a & auctu facillima est, & non ^{4. h. 3. 7.}
 caret amento (ut uocant.) ^b uerum picea à pino dista- ^{6. h. 3. 10.}
 re uidetur, quod pinguior, folio tenuior, magnitudine
 minor, erecta ^p minus assurgit: præterea, quod conum
 minorem, horridioremque nucleum, resina rosidiorem
 ferat. Ambabus folia capillata, & materies candi-
 dior, similiorque abietis, atq; in totum minus pinosa.
 Magnam et hanc ad pinum differentiam habet: pinum
 enim adustis radicibus nunquam regerminare, piceam
 regerminare quidem affirmant, ut in Lesbo accidit in
 censo monte Pyrrhæo, qui piceis scatet. ^c Verum pi- ^{e. h. 4. 19.}
 ceæ detracta coma tota perit, ut pinus, & abies. ^d & ^{d. h. 3. 8.}
 domibus, & nauibus utilis est, sed putrescere celeri-
 ter incipit. ^e sed quæ robusta inter ea sunt, quæ scri se- ^{e. 1. 9.}
 mine possunt, hæc diutius permanent, ut palma, &
 Pinus conifera nuncupata, & picea pediculifera. ^f se ^{f. e. 1. 2. 1.}
 rō uerō fructum perficit, sicut omnia perpetuò uirentia.

^g Pinus procera, & longo caudice est, & nodosa. ^{g. h. 1. 8.}
^h medullam lignosam habens, unam uerò radicem pre- ^{h. h. 1. 9.}
 grandem in ima descendentem, sed parua complures ^{idem fere. h.}
 ab illa exeunt. ⁱ folia rara sunt sicut abietis, & cedri, ^{i. h. 1. 16.}
 & extremitate pungentia. ^k succus resinaceus ¹ & in ^{k. h. 1. 19.}
 lachrymæ modum) ut omnium coniferarum. ^m quæ om- ^{l. h. 9. 10.}
 nes ex semine exeunt. ⁿ Quidam pinum florere existi- ^{m. h. 2. 2. 3.}
 mant. omnium itaq; arborum germinationes conspicua, ^{1.}
 sed abietis, piniq; maxime, quoniam genicula inuer- ^{n. h. 3. 6.}
 sus

a. h. 3. 7. b. h. 3. 8. c. 3. 9. e. h. 4. 18. d. h. 3. 10
 sus rectos porrigantur, ramiq; conditi ex aquo sseclē-
 tur.^a habet autem amentum, & difficile augetur.^b cau-
 dice uerò præciso pinus & abies radicitus omnino eodē
 anno inarescunt, etiam deciso cacumine.^c Si quis
 corticem detraxerit statim moriuntur.^d Et plura sunt
 genera, aliam enim urbanam, aliam Syluestrem assi-
 gnant, syluestris binum statuunt genus, quorum alte-
 rum Idæam, alterum Maritimam uocant. Harum re-
 ctior, celsior, materieq; crassior Idæa: folio tenuiori,
 imbecilliori q; Maritima, & cortice leuiori, utili q; ad
 coria, quod alteri minus. Nux maritimæ rotundæ,
 breuiq; de hiscens tanquam syluestrior: lignum mariti-
 mæ ualidius, nam eas quoq; terrenorum differentias
 sumi par est: haud enim incognitæ sunt usus causa,
 Idæa ramosior, crassiorque stat. Ad hæc picem ip-
 sa omnino copiosius præbet, pix nigrior, dulcior, te-
 nuior, odoratuque gratior sentitur, dum cruda est, de-
 cocta uerò deterior euadit: quoniam multum habeat se-
 rum. Sed quæ isti nominibus proprijs distingunt, alijs
 mare, fœminaque diuidere solent. Macedones uerò
 etiam genus quoddam pini sterilem dicunt, & marem
 breuiorem, folioq; duriorem, fœminam proceriorem,
 folijs pinguem, mollem, procliuioremque. Mari li-
 gnum circuncincta medulla durum, & operi fabrili uer-
 suale. fœminæ tractu omnino facile, atq; mollius, quod
 quidem omnium ferè marium, fœminarumq; publica
 differentia

differentia est, ut caesores materiae assueverant. Quippe
 omnis mas securi breuior, & contortior, operique
 difficilior est, coloreq; nigrior, femina procerior, atq;
 facilior: nam & quod ægidem appellant, pinus femi-
 na gignit, id autem est cor eius. Ratio, quod minus
 pinosa, minusq; tedam ingerens, & leuior, cursuque
 uenarum probior est. fit in arboribus magnis cum pro-
 stratae parte candida, & circinante putruerint: his
 enim detractis medullae relictæ securis adigitur; est de
 color omnino, neruoque tenui compacto, quam Idæi
 Tedarij ficum appellant. quod uero pinis subnascitur,
 colore teda rubidius potius inest, odoris grauißimi,
 nec tedam redolens, nec flagrans, sed ab igne dissiliens.
 Igitur genera pini hæc assignant, urbanum, atq; sylue-
 stre, syluestrisq; marem, & feminam, ac tertiam ste-
 rilem, hæc, & plura uide in capite prædicto. ^{a. h. 5. 1.} uere
 istæ caduntur, cum germinant, nam materies odora- ^{9. 11.}
 tior redditur. ^{b. h. 5. 2.} distant uero inter se pinus & abies. pi-
 nus enim carnosior, neruisque paucis est, abies nerua-
 cior, atq; rigidior, ita ut utrunque è contrario habeat
 neruos ualidos, carnem mollem, & raram. uide Abie-
 tem. ^{c. h. 5. 5.} Verum pinus natura perpetua est, durat enim
 maximopere, sed dicunt plusquam abietem corrodi à
 teredine posse. ^{d. h. 5. 6.} ambarum uero nodus difficilissimus con-
 stat. ^{e. h. 5. 7.} at ad nauigia aptissimæ constant. ^{f. h. 5. 9.} in agro La-
 tino pini, & abietes, tum magnitudine, tum pulchri-

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 5. 10. tudine inter omnes italicas præstant.^a Carbores pi-
 b. c. 1. 26. neos excussores potius quarunt.^b Verum inter reliqua,
 quæ locis algentibus ualeant perdurare plus caloris son-
 tiuntur, ut abies, pinus, cedrus, hedera, & iuniperus,
 super his enim nec niuem posse durare autumant, scili-
 cet ratione caloris.^c Sed pinus & hedera loca potius
 frigida amant; has enim locis feruidis peruenire non
 d. c. 2. 9. posse nulli dubium est.^d tamen locis apricis pinus gau-
 e. c. 3. 15. det.^e benigna uerò omnibus est, quod radice simplici,
 altaq; sit, scribitur enim sub ea & myrtus, & laurus, et
 alia pleraq;: nec quicquam prohibet radix, quo minus
 hæc libere augere ualeant, ex quo intelligi potest radi-
 cem plus infestare, quàm umbram, quippe cum pinus
 f. c. 4. 15. umbram amplissimam reddat.^f Arborum autem genus
 etiam aliquod fortasse est, cui corruptio secundum na-
 turam sponte, nec ullo pacto afflicto, sed bene uigen-
 ti ueniat, ut pino cum radices mutatae in tedam fuerint,
 idem. c. 6. ita enim ex nimietate nutritionis, atq; excessus, cumq;
 15. pertedam transmittere pabulum arbores nequeant, mo-
 riuntur. Quod proximum illi uidetur, quod animali-
 bus euenit, quæ extra modum crassantur, atq; pingue-
 scunt, cum enim auram attrahere nequeant, nec ullo pa-
 elo spiritu uti possint propter obesitatem, condensatio-
 nemquæ, & illa strangulantur, & pinus. Quamobrè
 non ineptè rustici uocabulum istud de pinu usurpant.
 pinum enim strangulati aiunt obesitate, atq; pingue-
 dinc:

dine: quippe omnia spiritum desiderant aliquem, uel
 solutionem, uel meatuum libertatem. Ergo corruptio-
 nes naturales tales sunt. ^a Verum teda detractu serua-
 ri potest. huic etiam pinguedo pro magno habetur. sed
 hæc omnia, ceteraq; non nisi bene adulta sufferre pos-
 sunt, & binc quamuis putruerint, seruari tamen, ac ui-
 uere quæunt, nam & primum haud semper edificare
 consuevere, sed cum uiget, ætateq; maior est. caret
 enim teda nouella, qua humorem non excoquit, neq; ag-
 gregat; sed totum ad germina, incrementaq; altitudi-
 nis absorbit. Statim enim ac dilatarî inceperit, uis illa,
 & habitudo tede uidetur consequi. ^b fructus omnino
 pinguis est, ut abietis, picæ, & Lauri. ^c
^d Piper fructus est, eius genera duo: unum enim ro-
 tundum erui modo, tegmine, carneque constans; scu-
 ti laurina baccha, subrutilum, alterum ob longum nigrum
 semina papaueris continens, longe hoc ualidius altero:
 ambo uim calefactoriam obtinent. Quamobrem con-
 tra cicutam auxiliantur, & etiam Thus. ^e
^f Pirus natura fructificosa est, & sæpius purgan-
 da. ^g folia orbiculata. ^h Semina congesta, & aliquo
 putamine, & tunica continentur. ⁱ Succus aquosus est.
^j flores foliati. ^k & raro ex ramis prouenit. ^l Verum
 cum nascitur ex eius fructu degenerat. ^m Verum in se-
 rendo maxime considerandum est positum, scilicet, quæ
 in Aquilonem, in meridiem, & in orientem spectent.

Plantas etiam ipsas uiui radices faciendum, & apud
 a. h. 2. 9. arbores ipsas, ut pirus, malos, & alias. ²fructum uero
 idem. c. 2. amittere potes si pirus, antequam coquat, sicut malus,
 b. h. 3. 4. amygdala, & punica. ^b Verum piri & mali in plantis
 præstantiores non solum fructu, sed & materie inspe
 ctantur, quippe cum montibus breues, nodosæ, stin
 c. h. 3. 6. tæq; assurgant. ^c mature germinat pirus, & serò perfi
 cit fructus; est enim serotina, quippe hyeme sua persi
 d. h. 3. 7. cit poma. ^d auclu facillima est, & ex cacumine, & late
 e. h. 4. 6. re germinat. ^e genera plura sunt maiorem in modum, bo
 naq; frugis, & uernæ, præterquam si quæ serotina.
 f. h. 4. 16. ^f omnes uero uermes gignit. ^g pitorum semina modo quo
 17. c. 5. dam deuincla sunt, & uasculo comuni circum obclusa,
 11. g. c. 12. 3. uigore certe indomito permanent, hæc enim omnia fere
 pulpis plenioribus includuntur, quo plus temporis ua
 b. c. 6. 21 leant perdurare. ^h Verum ex toto penè fructus, qui qu
 stu suaues sunt, bene plent, nam & pirum, & malū,
 i. c. 6. 24. & mespilum tale est. ⁱ Tamen syluestris fructus odo
 ratiore urbanis sunt. ^k & magis resistunt, & arbo
 l. c. 2. 10. ribus decerpta maturescere possunt. ^l Verum piri, &
 1. c. 2. 17. amygdala etiam si non pluat, dummodo aer austrinus
 31. 1. 1. nubilusq; sit: amittunt & flores & primos fructus; si
 1. c. 2. 17. continuo postquam defloruere illud accidit. ^m sed cum
 bene fructificent, non tamen breui tempore uiuunt, nec
 cito senescunt, ut pirus, amygdala, quercus, quæ uel
 n. c. 3. 3. in grandiori ætate facundiora redduntur, ⁿ omnia ue
 ro

ro autumnos ferendum, sed pirus, & malus minime,
quippe cum sicca natura consistant, hyemē ob debilita-
tem sufferre non ualent. ^a minus uerō recidi ea deside-
rant, quæ plagis infirmitentur, ceu pirus, & malus,
& quicquid siccum, & cortice tenui uestitum est, hoc
enim resecta uehementer laborant. ^b at in singulis ge-
neribus aliæ præcoques, aliæ serotinæ sunt, ut uitis, fi-
cus, malus, pirus. ^c non desunt, quæ diminuta posse
melliorescere dicant, ut de piro phocide Chij referunt.

^d pirus Syluestris locis feruidis germinare non potest,
ut in Aegypto, ubi nequit germen emittere, ^e nam in
alijs locis protinus germinare incipit.

^f Piraster nodosior urbana est. ^g & antequam co-
quat fructum folia deperdit. ^h nec piraster unquam
fit pirus ⁱ tamen uita longior est, quam urbana, ^k &
aculeata est.

^l Pinastrer cultum nullum patitur. ^m & nodosa est.
ⁿ & nunquam folia deperdit. ^o Et ualidior sentitur, &
plus fructus demonstrat, & minus maturat. ^p Et in
montibus propriè nascitur ^q & diebus circiter quindecim
post Vergilias germinat. ^r Pinastrum pulcher-
rimum, amplissimumq; apricis emigrat, umbrosis autem
nasci omnino nequit.

^s Pisum legumen est, & sero scriitur. ^t & multis fo-
lijs exit. ^u & oblongioribus. ^x semina inclusa siliquis,
non intersepta, sed quasi inuicem contingentia con-
stant.

a. c. 3. 27. *stant.* ^a *Vermes generantur in ipso, & aliis legum*
 idem ferr. c. nibus, ob alimentum, cœlique intemperiem, uidelicet,
 4. 16. cum plus, minusue alimenti præbetur, aut aer immor-
 dice humidus, siccusue est, uel etiam cum non tempesti-
 ue hūmescit. ^b *Verum pisum fragilissimum omnium est,*
 quippe eruginem uehementissime sentit, quia multifo-
 lium, terrenum, uagumq; est, implet enim locum to-
 tum, etiam si amplo interuallo positum sit, & frigori-
 bus, atq; gelationibus id obnoxium maxime, quia ra-
 dice imbecilla cohaeret,
 c. h. 3. 10. *Pix ē pino gignitur. Vide Pinum.* ^d *Verum pt-*
 d. h. 3. 9. *cem urere hunc in modum consueuero, cum locum æqua-*
 lem præparauerint, & ueluti arca facta cōcursum ha-
 bente, in medium diligenter pauimentarint, truncos
 perfixos componunt; proxime sanè compositioni carbō-
 nem facientium, præterquam quod sine fossa opus per-
 ficiunt, lignis erectis, & inter se coherentibus, ita ut
 altitudinem assidue pro multitudine capiant. Quos sic
 ri aiunt, cum compositionem descripserint, circuitu cœ-
 tenorum octuagenorum cubitorum, altitudine uerò cū
 plurimum sexagenorum, aut centenorum, & quingua-
 genorum ambabus, si thæda pinguisima sit; cum igitur
 Tedam ita construxerint, & materiem pertex-
 rint aliqua terra super infusa undiq; summa cum dilige-
 tia occultant, ut ignis nulla ex parte emicare possit, pix
 enim peribit si id acciderit. succedunt autem per adi-

tum relictum, de in eam quoq; partem stipant mat-
 rie, & obstruunt terrā, reliquisq; omnes obseruant,
 & quacūq; fumum prorrūdi uiderint, scalis scanden-
 tes terram, assidue infundunt, quo nullo pacto flamma
 erumpere possit. Canalis uero per medium structus
 aceruum, picem fluentē infoueam ducit, cubitis circū-
 ter quindecim ab aceruo pix effluens tactu frigida fiet.
 uritur duos dies, & totidem noctes cum plurimum. Sa-
 pē enim postridie ante solis occasum exusta iam est. Ro-
 gusq; cessit, id enim euenit, cum nihil reliquum est, quod
 amplius fluat, totum autem tempus, quo tēda uritur
 uigilantes obseruant, ne quid ignis erumpat, & sacrifici-
 eant, atq; concelebrant, præcanes, ut pix sibi copiosa,
 bonaq; benignitate fiat Deorum. Macedones hoc
 modo urere assolent. In Asia uero Syrios non detra-
 here tēdam aiunt, sed in arbore ipsa adurere instrumē-
 to inuento quodam industrie fabricato. Hoc enim par-
 tem unam accendi, qua liquefacta aliam, atq; aliam ut
 ce pari successionis ignem recipere, finis autem operis,
 & cessandi inditium, cum scilicet nihil defluit, Tere-
 binthos illi urunt, Pinum enim nequaquam Syria fert,
 resina & pix modo fieri solent. ^a uerum picem, Te-
 dam, & resinam nullam penitus arbores nouellae ha-
 bent. ^b Habet uero maximam uim necandi plantas no-
 uellas, sicut Oleum.

^c Placida quercus genus, uide Quercum.

Plantago

4. c. 6. 16.

1. c. 5. 22

c. 6. 3. 9.

- a. h. 7. 9. ^a Plantago ab radice tantum foliata est. ^b & flo-
 ret, quemadmodum aptaca, Turdaria, & Cicorea,
 & spicosa est, ut oculus caninus, & cauda uulpina,
 sed uide oculum caninum.
- c. h. 1. 7. ^c Plantanus in paludibus omnino seclatur, ut sa-
 lix. ^d Et radices altas habet, quippe si locum expedi-
 tum habeat, subire quantumuis facile possit. ^e quemad-
 modum in Lycio apud aquæductum nouella adhuc, cir-
 eiter tria, ac triginta cubita misit, cum simul & coptā
 alimenti, & loci liberale spatium adepta fuisset. ^f cui
 nodi ueluti crada gignuntur. ^g folia ampla ^h Semen ma-
 nifestum producit, eoq; gignitur, quod tam alijs, quā
 illo præcipue inditio constat, etenim in tripode anco
 aliquando platanus prouenisse narratur. Has igitur
 generationes Syluestrium statuendam, atq; etiam stō-
 rancas illas, quas uel naturæ interpretes reddūt. Ana-
 xagoras enim aerem semina omnium habere, quibus
 cum aqua una delatis, omnia gigni assueravit. Dioge-
 nes ex aqua putrescente, misturamq; quandam cum ter-
 ra capeffente plantas nasci existimat. Cleodemus ex
 eisdem quidem atq; animalia plantas quoq; constare pu-
 tauit. Sed quanto à turbidioribus, algentioribusq; tā-
 to amplius animalium priuari constantia, atq; natura.
 Quin & alij quidā de generatione referunt, sed hæc
 à sensu quodammodo remota esse uidentur. ⁱ In creta in
 sula agro Cortinensi platanum apud fontem quendam
 stare

*stare affueverant, quæ nunquam folia deperdit. Iouem
 sub ea cum Europa concubuisse fabulantur. ^a Platanum in Andria esse negant, præterquam circa Diodoridis delubrum, inque uniuerſa Italia raram esse affirmant, quanquam multi, magnique fluij utrobique diluunt: sed locus planè recusare uidetur. Dionysius Tyrannus maior ambitiosus contendens in Rhegio conſecuit in hortis eas, quæ nunc in Gymnasio ſtane, nec ullam magnitudinem capeſſere poſſunt: contra, loca alia platanum habent plurimam. ^b In Nilo etiam platanus prouenit, non tamen multa. ^c Durat uerò maximopere, ſunt enim qui dicunt Delphicam platanum & alteram in Caphyis Arcadiæ ſtante, ſatis Agamemnonis manu. ^d Securim ita tolerant platanus & ſalix, tam ſtantes, quam à flatu proſtratae, ut reſurgant, uiuant germinenque. Quod in Antandro & Philippis eueniat, cum enim platanus procidiſſet ramis amputatis, truncoque ſecuri luxato, reſurrexit noctu leuata onere, atque reuixit, & cortex iterum circumtexit. Erat duobus lateribus circumdolata, longitudine decem cubitis maiori craſſitudine, ut quatuor uiri non facile amplecterentur. ^e uerum lentore non caret, & natura humidior eſt, ſicut ulmus, & populus. ^f & non ſolum plagam tolerat, ſed etiam lignis detractis caudici in domita manet, & germinat.*

b. b. 4. 9.

c. h. 4. 14.

d. h. 4. 19.

idem. c. 5. 4.

e. h. 5. 4.

f. 10.

f. c. 5. 23.

g. h. 1. 16.

C c

quod

- quod contra uermiculos noxtos ueſtimentis interpoſitū
 a. h. 2. 11. ualeat. ^{imo.} Verum culices gignit, cum copioſe fructificat,
 b. h. 7. 17. ^b & ſemper uiuet, ut ſolaris, atq; Capillus Veneris.
 Vide Tripolium prope Thus.
- c. h. 3. 6. ^c Populus alba mature germinat, cum lucoſa, ſte-
 e. 1. 3. rilisq; ſit, ut ulmus & Salix. ^d uerum in amribus, &
 d. h. 4. 9. paludibus exit. ^e & decifa reſurgit, nam & ſtagiris
 idem. 3. 7. ^{a. 1.} in muſeo procidua reſurrexit, ^f Populus nigra, quæ
 e. h. 4. 19 in Creta inſula naſcitur, tranſlata non uiuere poteſt.
 f. h. 2. 3.
- g. h. 3. 5. ^g Verum Arcades populum ſolam ſterilem putant,
 at uerò in Creta & populi nigræ complures fructifi-
 cant. ^h hæ enim ſatæ germinant, & celerrime, pulcher
 h. h. 3. 4. rimeq; ex auulſione. ⁱ & in planis præſtantioreſ ſunt.
 i. h. 3. 14. ^k Verum populus alba, nigraq; uniformes habentur,
 k. h. 4. 14 corpore ambæ erecto, ſed excelfior, leuiorq; nigra: fi-
 gura foliorum ſimilis, & lignum cum cæditur, albedi-
 ne ſimile eſt, utranq; ne ſtorem quidem habere exiſti-
 mant. Alpina populo albæ non abſimilis eſt, cum ma-
 gnitudine, tum uerò, quòd ramis albicantibus ſpargi-
 tur, folio hedere, ſed parte altera ſine angulo, altera
 oblongo: in que angulum exeunte acutum, colore par-
 te reſupina, pronaq; ferme ſimile: pediculo prolixo, te-
 nuiq; annexo, quamobrem non erecto, ſed inflexo, cor-
 tice aſſeriori, quàm populus alba, ſcabrioriq; ut pi-
 nus ſylueſtris. ^l uerum quæ in aqua ſunt, uita breuior-
 h. h. 2. 21. res, quam quæ in terra. Sed quædam totius arboris,
 plantæue

plantæue mutationes. exoriri uidentur, ut populum candidem transire in nigram, tum fronde, tum etiã tota specie aiunt.^a nam populus alba in totum nigrae dissimilis fronde, formaq; tota est. sed in senectâ simillima efficitur, quia exiccetur, & ieiunius nutriatur.

^b Polypodium uocitatum in quibusdam arboribus aliquando uisum est pululare, & nasci.

^c Porcellia inter olera numeratur^d & leuior est in tubo, & aspectu mitior, & dulcior est.

^e Porrum decimo nono, nonnunquam etiam uigesimo die prouenit, & ex recentioribus seminibus maturius exit, ut Gethyum, & Cucumis, uerum non anno tantum fructificat, sed etiam bimatu, & unicaule constat^f uerum subtus suo latere promit, uelut quoddam caput bulbaceum, ex quo foliorum ortus, caule tamen arefacto, semineq; sublato.^g at fecundissimum est, et si acruatim seratur, melius nasci, augeriq; posse uidetur, sicut etiam apium, hæc enim serunt in lacinijs colligata, atq; ita ampliora redduntur.^h & trãslata meliora reduntur, tamen non est immune à porricidis.ⁱ & semina firmiora sunt ad perdurandum.^k consum porrum, & diminutum melius redditur, sicut cætera olera, & herbæ.^l Verum calidum est, sicut omnia acria. & hac de causa aliquando non facile germinat.

^m Portulacæ arbori cortex cadit, ut unedoni, & ar-

C c ii buto.

- a. h. 1. 15 buto. ^a & ex syluestribus perpetuo uirot. ^b Quin &
 idem 3. 4. in montibus proprie nascitur. ^c & serotina habetur.
 b. h. 3. 4. ^d faciliq̃ augeri potest. ^e habet bautem hac arbor fo-
 c. h. 3. 6. lium simile, & penē æquale, atq; persica. ^f uerum om-
 d. h. 3. 7. nes ferē arbores detractis partibus moriuntur, portu-
 e. h. 4. 4. laca excepta, quæ tamen & ipsa siquis carnem uehe-
 f. h. 4. 18. menter præserit, germenq; futurum laxauerit, morie-
 g. h. 5. 8. tur. ^g est uerò utilis mulieribus ad opus textorium.
 h. c. 1. 10 ^h Portulaca & Cucumis in olerum genere, æstate
 idem c. 4. 3. germinant, sicut cætera humida, & frigida, nam om-
 nia humida & frigida æstate germinant, sicut calida
 hyeme, ut utraq; natura conuenienter temperata utriq;
 tempori sit.
 i. h. 1. 18 ⁱ Prunus semen habet carne & nucleo interiacente,
 idem c. 4. 1 ut olea, & aliæ ^k succos dilutos. ^l flores foliatos, &
 k. h. 1. 19. super fructum ipsum insidentes. ^m Verum serere præ-
 l. h. 1. 22. ciunt distantes prunos. ⁿ & radices numerosas. ^o (et
 m. h. 2. 7. longas) habent. ^p & folia similia sunt arbutis, & por-
 n. h. 3. 7. tulacæ, corpore parua: peculiare in hac arbore, fru-
 o. c. 1. 3. ctu lanugine pappo dicta, perire, id enim de nulla alia
 p. h. 3. 16 arbore accepimus. ^q Est & alia quædam arbor pru-
 q. h. 4. 3. nus insignis magnitudine messilis proximum, nisi quod
 rotundum nucleum habet: florere incipit mense Iulio,
 fructum circa brumam perficit, nec folia dimittit.
 r. h. 6. 4. ^r Pternix.
 s. h. 6. 7. ^s Pugio uere floret, ut Hyacinthus. ^t & semine
 t. h. 7. 12. prouenit.

prouenit, ut bulbus, *Lirium*, & *alia*.

^a *Pulicariæ* plura sunt genera. ^b Et eius *mas*, & ^{a. h. 6. 1.}
^{b. h. 6. 2.} *fœmina*, & *distant*. *fœmina* enim tenuiori folio conditur, & compressior est, atq; in totum minor: *mas* amplior, crassiorq; caule, atq; ramosior, & folium amplius, pinguiusq; habens: necnon & flere splendidiore est: ambo fructifera sunt, in totum serotina germine, floresq; constant; quippe cum circa arcturum incipiant, mari grauior odor: *fœmine* acrior: ideoq; contra bestiarum morsus commodior est.

^c *Punicis* uim magnam adeo esse, ut si in urceum bulientem eam inieceris, feruorem extingues non solum parte aliqua temporis, sed etiam ex toto, *puniceam* n. exiccare uehementissime, atq; ad se spumam totam recipere uoluit, idq; extinguendi causam esse.

^d *Punica* caudices multos habet. ^e Sed contortiores, ^{d. h. 1. 5.}
& breues. ^{e. h. 1. 8.} ^f medullam carnosam, radicem breuem, & ^{idem. c. 3.}
per summa terræ adhaerentem. ^{f. 15.} Verum in ramos spar- ^{h. 1. 9.}
gitur, & molem superiorem, grandioremq; gestat. ^{g. h. 1. 14.}
^h folia angusta sunt. ^{h. h. 1. 16.} ^{i. h. 1. 17.} ^{k. h. 1. 18.} ^{l. h. 1. 19.} ^{m. h. 1. 22.} ^{n. h. 1. 23.} ^{c. h. 2. 1.}
¹ fructus ex humore, & cute con-
stat. ^k Et acinos habet. ¹ Succus acidus est. ^m uerum su-
per fructum ipsum florem insidentem emittit. ⁿ & ex an-
notatis fructus gignit. ^o nascitur auulsione, sed quod
euellitur radicis, aut stupitis aliquid habeat oportet.

^p uerum aliquando mutatur, ut in *Aegypto*, *Cilicia*q;
euenire accepimus, nam in *Aegypto* acidam tum se

^{p. h. 2. 3. 4.}
^{idem c. 1. 2.}

THEOPHR. DE PLANTIS.

mine tum planta in dulcem quodammodo, aut uinolentam conuerti. Ciliciæ uerò circa Jalos iuxta amnē Pinariū, qua contra Darium dimicatum est, omnes sine nucleo surgunt, neglecta uerò in syluestrem transit, &
 a. h. 2. 7. è contra cultura enim maximè mutatur. ^a serere uero iubent non plus quam nouenos pedes distantem. ^b & maxime aquam diligit. ^c fructum etiam amittere potest, antequam coquat, sicut amygdala, malus, & pirus.
 e. h. 2. 9. ^d germinat autem ad ortum arcturi post uernum, & nō solum cacumine, sed etiam latere. ^e senescit quidem, putrescitq; uelocius, sed ex eisdem rursus latere regerminat. ^f uermiculationem sentit, ut olea, malus, pirus, et messilus. ^g sed ramis aculeata est, ^h potest tamen fructus referuari detractō pediculo. ⁱ Verum protinus de tractam punicam statim inserere solent, quoniam sicca est, ut ficus. ^k at facile augetur, & semine deterior
 k. c. 1. 9. exurgit ^l germinat facile quoniam uiribus ualeat, & alimēto abundat. ^m nonnunquam etiam fructum secundū ostendit. ⁿ imbres ei seriores tempestiui sunt. ^o & myrto punica maximè amica. ^p flores facile amittit, quia nexus eorum debilissimus est; itaq; cum guttæ pluuiæ, aut rores in eos deciderint, subeuntes quoquo uersus humectant, labefactantq; qua de causa deducere arbores solent. nec in excelsum eas excurrere sinunt, ne flores in erectum formati humorem suscipiant. Quidā etiam uirgas è contraria feri præcipiunt ad rationem,
 ut se

ut se subinde ualeat inclinare. ^a remordet uerò deside- ^{d.} c. 3. 23.
 rat punica, nam urinam infundunt, & pellium feces
 accumulāt, & hac de causa melior euadit. ^b uerum quæ ^{b.} c. 5. 11.
 dulcia sunt celerius putrescunt, nam punicæ dulces ma-
 gis putrescunt, quam acidæ. ^c aliqui amygdalas, & pu- ^{c.} c. 5. 12.
 nicas castigare solent, uel cum arbor firmior, atq; ro-
 bustior redditur. ^d & non solum discissionem tolerant, ^{d.} c. 5. 23.
 sed etiam fissionem caudicis. ^e dimutilata uerò durior ^{e.} c. 5. 24.
 efficitur. flores uerò quoniā aliqua mole corporis emer-
 gunt, serius se ostendunt, & hæc de Punica.

Q



Vadratoria ^a scrotino germine constat, st- ^{d.} b. 3. 6.
 cut Thuia, & taxus.

^b Quercus in agro Thurio est, ubi Sy- ^{b.} h. 1. 15
 baris perspicua, quæ nunquam folia dimittit, eam non
 una cum alijs germinare aiunt, sed post ortum Canicu-
 læ. ^c Verum sata aliquando degenerant, nam dete- ^{c.} h. 2. 3.
 ritor exit, itaq; cumpleriq; ex ea, quæ in Epyro nasci-
 tur, seruissent, nullo pacto prouentre similis potuit.
^d at mature germinat & terrena spectatur, nascitur ^{d.} h. 3. 6.
 uerò quercus, & abies super lapides, ficuliniq; carent ^{c.} h. 4. 7.
 radicibus, sed modo patellarum adhærent. folium am-
 babus uelut carnosum, oblongius, crassumq; & abie

et crassius, frequens, nec leguminum siliquis ab simile;
 concavum intus, nec quicquam intra se continens, Quer-
 cui tenue, ac potius tamaricis: color ambobus acce-
 dens ad purpuram: forma tota abietis erecta, quercus
 flexuosior, atq; in latitudinem magis ampliata: ambæ
 uel multicaules fiunt, sed simplicior abies: rami abieti
 longi, recti, solutiq; Quercui breuiiores, contortio-
 res, strissoresq;: magnitudo tota ambabus cubitalis, pa-
 rum uel altior, uerum maior, (ut simpliciter dicam) abie-
 ti. Quercus uel ad lauas inficiendas utilis mulieribus,
 ramis adnexa pendent pleraq; animalium testigerorū;
 subter alia quædam cauli ipsi adherent ad quedam tota
 obesa ingrediuntur mullipide, & alia quædam gene-
 ris eiusdem bestiole, quodq; Polypi specimen gerit.
 Hæc itaq; terrena contemplantuque constant facilia.
 Quid autem uel alteram quercum nascentem in alto
 referunt, quæ etiam fructum fert, & glans eius com-
 moda est, quin & alias magnitudine insignes quas-
 dam compertas homines nantes, seq; summergentes re-
 ferre traditur. ^a Verum nec pino, nec abieti quercus
 b. c. 2. 16. conglutinari ualet, altera enim strissa, altera rara, et
 altera similis, altera minus. ^b Sed cum ubere fructifi-
 cet, non breui tempore uiuit, nec citò senescit, ut etiam
 c. c. 2. 23. amygdala, & pinus, quæ in grandiori ætate fecun-
 diora redduntur. nascitur & in ea Viscum, et aliquan-
 do etiam Laurus in ea uisa est.

Quinquefolia

* *Quinquifolia*, siue *quinque petala* (nam hoc etiam nomine appellatur) cum effoditur rubra est, incre-
scens uerò nigrescit, atq; quadratur; habet filium ui-
tis, sed pusillum, & colore simile uirgineo, & auge-
tur, & desinit cum uite, folia omnia quinq; unde &
nomen. *Caules prætenues mittit, & crebris interna-
dijs constat.*

R



Radix caudice uno constat, & arboris qua
si naturam adipiscitur, ueluti *ruta*, quam
obrem eiusmodi olera nonnulli oleri arbo-
res uocant, & quidem omnia olerum genera certe, aut
plurima cum permanserint quasi ramos quosdam capef-
sunt, totaq; in arboris figuram mutantur, diu tamen du-
rare nequeunt. uerum radix mense Iulio feritur, ut ra-
pa, & brassica, & die tertio erumpit, tam hyeme
quam aestate, licet aestate celerius caulescat. radices
plurimum certe perdurant, & aliæ regerminant, aliæ
non. radix & rapa si terra cooperiantur, usq; ad astra
tem durare, & crescere possunt, quod olitorum nonnul-
li de industria faciunt, non enim regerminant; neq; fo-
lium mittunt, nisi accumulata humum semineas, quod
in reliquis deprehendi facile potest.

D d siliquis

4. h. 7. 4. *siliquis est; ut sinapi, & fecundissimum est.*^a Sed ta-
 men plura sunt radicis genera, ut Corinthium, Cleo-
 naeum, Liothalaesium Baotium. Amplissime corin-
 thia adolefcit, quæ uel stirpe constat detecta; hæc.n.
 sursum uersus protruditur, non ut ceteræ in terram am-
 pliari solita est. Liothalaesia, quam traciam uocant,
 ualidissima aduersus frigora traditur. Pæotia dulcissi-
 ma est, & figura rotunda, nec ut Cleonæa prælonga;
 quibus folia leuia, dulciores, suauioresq; sunt; quibus
 autem scabra sunt, acriores. genus præterea redditur,
 6. h. 7. 5. quod folijs erucæ simile constat.^b radicibus contra pu-
 14. c. 2. 25. lices ne noceant remedium: inter serere eruum, sed ne
 4. c. 6. 17. nascantur nullum medicamen compertum referunt. Sa-
 por non in folijs, sed in radice est, ut alliorum, cæpa-
 rum, & radicularum.
 2. c. 6. 4. ^d Radix quædam carduo similis hominibus in saniã
 4. c. 6. 18. importat.^a Sed tamen radices herbarum semper sunt ue-
 1. 1. 1. 1. nenosiores illis.
 f. h. 1. 2. ^e Radix est id, quo alimentum attrahitur.
 8. c. 1. 13. ^g Radices plantarum prius semper, quam germem
 producantur, cum uero hyemes tempestiuæ, sereneq;
 sunt, simul & supera, & infera incrementum capef-
 6. c. 6. 17. sunt.^h Sed quoniam de radicibus agimus hoc est anti-
 maduertendum, quod omnibus, quibus radices sicca,
 i. h. 9. 13. surculosq; sunt, nunquam stercus disponunt.ⁱ Verũ
 radicum differentia tales sunt, aliæ acres, aliæ amarae,
 aliæ

alia dulces, alia suavis olentia, alia gravis. ^a uerum ^{d. h. 6. 13}
radices tanquam uentres plantarum sunt. quoniam ci-
bus in his aliquatenus alteratur.

^b Rami sunt, qui à caule fissi multiplices spargun- ^{bi h. 1. 2.}
tur, quos nonnulli nodos appellant. ^c uerum tam parui ^{c.}
quam grandes principia quaedam utalia, quæ repera-
ta temporis indulgentia germina pariunt, etiam si nul-
la innitantur radice: quod præcipue in plantis patescit,
quas detractas uitibus, alijsq; componunt in dolijs.

^d Rhamnus frutex est, & perpetuo uiuet. ^e & alia ^{d. h. 1. 15.}
candida, alia nigra, fructusq; diuersus, ambæ uero acu- ^{idē. c. 1. 10.}
leigeræ. ^f peculiare racemis, quod per latera caulium se- ^{e. h. 3. 17}
piunt: postremoq; caulis racemus omnium maximus per- ^{f. h. 3. 18.}
pendet, sicut in Rhamno, & rubo: unde fit, ut extre-
mo fructifera, latere large fructifera ista spectentur.

^g Verum ex Rhamno Terebrum fieri solet, quæ quidē ^{g. h. 5. 10}
uel conceptaculum præbere idoneum est.

^h Rapa radix quasi ex carne, & cortice constat. ^{h. h. 1. 10}

ⁱ scilicet uero post æstiuum solstitium mense Julio, & ^{i. h. 7. 1.}
celerius diebus calidis caulescit, semenq; ocius reddit.

^k Verum si terra cooperiatur, usq; ad æstatem dura- ^{k. h. 7. 2.}
re, & crescere potest, sicut in radice diximus. ^{l. h. 7. 3.}

^m Semen in siliquis producit, & fecundissimum est. ^{m. h. 7. 4.}
uerum alij
esse, alii non esse diuersitatem generis putant, sed mare
tantum, foeminaq; differre, nasciq; ambas ex eodem se-
mine, sed ut effeminentur raras deponere oportere, nã

- 21.2.1. ^a si densæ posita sunt omnes mascullescere atunt. quod idem futurum etiam si in terra uitiosa seueris, qua de causa semine satas plantatim transferentes deponunt.
- 22.1.1. ^a Semen quoq; deterius, meliusuē usu percipi potest; quod enim probum sit, tenue senties, quod uitiosum, crassum gaudet frigōribus. ^c Rapa ^c Radix, ^c sic eas dulcescere putant simulque incrementum in radicē non in folia uerti, austrinisque atq; serenis temporibus celeriter caulescunt. ^a Rapa syluestris radice longa, ^c modo raphani, breuiq; caule consistit. ^b Verū rapa ui temporis, quo seritur, diuersam speciem capit, si quis enim proutinus ab arca serit, ampla efficitur, quod ideo fit, quia plenius radicitur, dilataturque amplius.
- 23.1.1. ^a Raphanorum radices cum indurescunt, in lignum transcunt. ^d licet carnosæ sint. ^e Verum olitores percrassant earum folijs direptis per hyemem cum maxime nigent, terraq; aggregata, ut nec imbres possint admitti, sic. n. per æstatē mira crassitudine distenduntur.
- 24.1.1. ^f Resina hunc in modum fieri solet, in pino quidem ubi iam uulnerata arbore, theda detracta est, resinam hauriunt, sic enim in uulnus inuectum, humor copiosior confluit, in abiete uero, ^c picea cum lignis degustatis uulnus intulerint, haud enim quamq; secretiorem modo eodem agi mos est, nulnerant enim ^c terebinthos parte utraq; caudice scilicet, ^c ramo, sed copiosior,

flor, & melior, quæ in caudicem defluit. ^a uerum pi- ^{a. c. 6. 16.}
 cem, Tedam, & resinam nullam penitus nouellæ ar-
 bores habent. ^b Quamobrem præparare consueuerunt, ^{b. c. 6. 17}
 alia siccantes, atq; succantes, alia inscantes, quo so-
 lis, ac aeris uis coagere melius possit, ut resinam, &
 reliqua generis eiusdem, & Thus, & myrrham, &
 Laserpitium.

^c Robur ramos inconditos habet. ^d & cortice carno ^{a. h. 1. 1.}
 so constat. lignum graue est. ^e medulla nigra, & ra- ^{d. h. 2. 8.}
 dices altæ sunt, & carnosæ. ^f uerum in ramis nodi ue- ^{e. h. 1. 9.}
 luti cradie gignuntur. ^g folia non ex eisdem partibus ^{f. h. 1. 13.}
 pendent, sed plurimis quidem è germine, nonnullis ue- ^{g. h. 1. 16.}
 rò ex ramo, robori etiam ex caudice. ^h uerum aliqui ex ^{h. h. 2. 2.}
 semine tantum eam produci statuunt, alij ex radice
 quoque sed lentè, nonnulli etiam ipso caudice de-
 truncato. ⁱ non desunt, qui robur, & nucem auellanam ^{i. h. 3. 8.}
 florere existimant, & cum germinare incipit germi-
 nationem intermittit, ter enim turget, ternaq; germi-
 na edit. ^k loca uerò robur frigida amat, ut pinus, abies, ^{k. h. 4. 6.}
 buxus, castanea, & aliæ. ^l & cum germinat, si quis ^{l. h. 4. 18.}
 aliquid detraxerit longo spatio temporis moritur. ^m ue- ^{m. h. 5. 1.}
 rum casum robur tempestiue neq; putredinem sentit,
 & prædurum, spissumq; ad similitudinem cornu perdu-
 rat; totum enim cordis specimen, gerit, tempestiue
 uerò ceditur post autumnum. ⁿ & simul durum, & ^{n. h. 5. 3.}
 spissum robur est. ^o & in opere difficillimum est. ^p ta- ^{o. h. 5. 6.}
^{p. h. 5. 8.}

THEOPHR. DE PLANTIS.

nec pondus sustinere ualidissimum potest, & magis
naubus, quam domibus commodum est.

- a. h. 1. 15 ^a Rosa inter suffrutices est, & perpetuo cacumine
b. h. 1. 21. uiret, alijs amissis. ^b flores bicolores sunt, quod in his
alterum florem insidentem medium gerit. ^c Verum flos
c. h. 1. 22. ipse super fructum est: ut maior pars coronarum.
d. h. 2. 2. ^d nascitur omnibus modis, immo caulibus concisis ut
e. h. 6. 2. gramen etiam exit. ^e rami aculeati sunt, ut rubi, & cap
f. h. 6. 6. paris. ^f rosarum autem differentiae per multae, folio-
rum multitudine, paucitate, asperitate, leuitate, colo-
re, odore. Quippe cum plurimis quina folia sunt, qui-
busdam duodena, uicenaq; alijs longe plura: sunt. n.
quas centifolia uocant, quae circa Philippos plurimae
exerunt, easq; incolae ex Pangaeo transferentes serunt;
illic enim multae eiusmodi fiunt, sed folia interna par-
ua admodum sunt; ita enim oriuntur, ut alia intus, alia
extra emicent, non tamen iucundi odoris, odoratiores in-
ter amplas, quibus pars ima scabra. Ad summam (ut di-
ctum est) & odoris & coloris praestantia ratione lo-
corum contingit, nam & quae in eadem tellure proue-
niunt, diuersitatem bonae, exilisue olentiae, nullam
ostendunt. Odoratissimae, quae apud Cyrenam gignun-
tur, & proinde unguentum iucundissimum illic faciunt.
g. c. 6. 27 ^g (Ratio quia non nisi ratione siccitatis odoratae consi-
stunt.) Ex semine etiam nascitur, quod flori subditum
suo in malo contentum cneceum, uel acanaceum lanugi-

ne quadam obductum gerit, ut primis seminibus proximum sit. Cæterum quoniam tardè perficitur semine, ^{item c. 1. 4.} ita caule conciso (ut dictum est) serunt. ^a uerum serior ^{4. h. 6. 7.} pugione, & Hyacintho est, & nouissimè quidem erumpit: prima autem inter uernos desinit flores, parum enim temporis durat eius prouentus, uerum ad utroque quinquennium perdurat; non adusta, neq; recta, sed eius quoq; flores senescentis deteriores redduntur. Ad iucundam autem olentiam & rosarum, & uiolarum, & reliquorum florum solum Cælum singulis accommodatum plurimum confert, nā in Aegypto cætera quidem omnia sine odore, floresq; etiam aromata dicta sentiuntur, myrti uerò mirum in modum odore assurgunt, prouenire ante hæc nostra & rosas & uiolas, & reliquos flores tractus illius etiam binis mēsis plusque durare haud hoc breuiori tempore aiunt. Videtur & annus (ut diximus) ad bonam olentiam referre, cum scilicet talis, aut talis incesserit, non imbriū, squallorumq; tantum ratione, sed etiam cum tempus certum & aquæ, & flatus, & in totum Cæli commode mutationes accessere. Montibus autem (ut simpliciter transigam ratione) & rosæ, & uiolæ, & reliqui omnes flores, odore longè deteriores emergunt: atq; coronariorum, & in totum suffruticeis generis comentatio, hisce, similibusque absoluitur. ^b uerum si autumnus ^{b. c. 1. 15.} prolixior fuerit, rosa etiam erumpere potest. ^c rosas ^{c. c. 3. 24.}

non

- non solum præcidunt, uerum etiam adurunt, desinunt enim florere, syluescuntq; paſtus fecunditate, nisi ita tractetur. ^a Jalsugine etiam rosa agrotat. ^b & hoc mirandum, quod alia pars bene olet, alia minime. ^c causa autem cur rosæ flos tantum olet, talis est, quia eius ex coctio in flore fit. ^d quæ autem debilia sunt, celeriter euaneſcunt, ut uiolæ tam nigræ, quam candidæ, amaræ, maleq; olidæ in uetustate redduntur: nec sicuti rosæ suum odorem etiam siccæ conseruant, dum deficiant penitus: uirtutes tamen longè redolent, siccæ non, nisi proximè admotæ. Ratio, quod indurata quodammodo defectu proprii caloris halitum reddere nequeunt, nam ad usum quidem unguentarij eas quoq; aliquatenus siccare consueuerunt, ut odorem sinceriores relinquunt.
- ^e Urbana rosa odoratior est syluestre. ^f Verum Canthari odore rosarum necantur.
- ^g Radicis roris marini partem unam superius, alteram inferius purgare profecto mirabilius est, ut Thapsiæ, & caricæ, quam alij pirum appellant. ^h uerum roris marini genera duo sunt, alterum sterile, alterum fertile, & alterum tam fructu, quam folio uile, alterum tantum radice: fructus Canchris uocatur. Habet id fructiferum genus folium palustri apio simile, sed multo maius: Caulem ad magnitudinem cubiti, aut maiorem: radicem magnam, crassam, candidam, & uoluti thus redolentem, fructum candidum, scabrum, oblongum,

longum, nascitur potissimum solo squalido, atq; saxoso; radix medicamento ulcerum utilis, & mensibus pota in uino nigro austero: fructus ad urinæ stillicidia, & au res, & argemam, & ad oculorum morbum, lippitudinem nuncupatum, & lactis ubertatem mulieribus facit: sterile illud folio lactucæ amaræ cōstat, sed scabriori, cādidiori q̃, radice breui; nascitur id quoq; prædicto solo uberrime: radix partim superius, partim inferius purgat, quod enim germen uersus, cōsistit superius purgat, quod terrā uersus, inferius: prohibet ei ueslibus interposita uermicū os noxios, colligitur per mēse tritici.

^a Rubiæ plura sunt genera ^b & radices rubicundæ sunt. ^c uerum folio hederæ cōstat, rotundiori tamen cōsistit. nascitur humi, caulis modo graminis, loca amat umbrosa, Cit urinam, qua de causa ad lumborū, & coxæ dolores ea utuntur.

^d Rubus frutex est. ^e et perpetuo uiuet. ^f folia cum extremo, tum lateribus sinuata concidunt, & spinosa cuncta redduntur. ^g immo etiam caulis, & rami. ^h pecu liare racemis, quod per latera cauliū sepiunt, postremoq; caulis: racemus omniū maximus perpēdet, sicut in ramno, & rubo, nude fit, ut extremo fructifera, latere largē fructifera iste spectetur. ⁱ uerū nōnunquam rubus in fluuijs, locis eiusmodi spectatur. ^k et plura sunt genera, sed maximo inter se discrimine distant, quod quædā erecta, excelsaq; quædā propē ē terra, protinusq; deor

a. h. 6. 12.

b. h. 7. 9.

c. h. 9. 14.

d. h. 1. 5.

e. h. 1. 15.

f. h. 1. 16.

g. h. 6. 1.

h. h. 3. 18.

i. h. 4. 9.

idem. 13.

k. h. 3. 18.

THEOPHR. DE PLANTIS.

sum uergens, cumq; se terræ coniunxerit, radicans rur-
sus, quem humirubum quidam appellant. Canirubus
autem fructum subrutilum parit, malo punico similē,
atq; arborem punicæ, non obsimilem folio amerinæ.

a. c. 1. 21. ^a fructum uerum racematim rubus gerit, & non solum
sero, sed etiam particulatim maturescit.

b. h. 1. 9. ^b Rumex inter olera numeratur, & radice singula

c. h. 7. 1. ri coheret, ut maior ferè pars olerum. ^c scribitur quip-
pe cum hyberni principium post æstiuum solstitium sit,
mense Iulio, quo brassica, radícula, rapa, & aliæ.

d. h. 7. 2. ^d Sed omnium maxime unistirpem Rumicem esse puta-
ueris: lateralis enim crassas nullas penitus agit, sed tan-
tum prætenues, nititur altissima omnium radice maio-
re nanq; semipedibus termis. syluestris breuiorè agit:
multicaulis, atq; ramosus consistit, & tota forma cū
perfecta est, betæ proxima sanè cernitur. Diurnitatem
quoq; syluestrem, & in totum (ut ita loquar) omnia

i. h. 7. 3. olera uincit. ^e Radices carnosæ sunt. ^f & plura sunt

f. h. 7. 4. Rumicis genera. ^g Sed syluestris quanquam gustatu

g. h. 7. 6. gratior, quàm urbana, tamen succo acutior, quo præ-
cipue differat, omnia autem uel sicciora urbanis sen-
tiunt, & fortè ob id ipsum magna ex parte acriora, ue-
hementioraq; sunt. ^h uerum in totum Rumex cultura de-
terior redditur.

h. c. 3. 1.

i. h. 1. 5. ⁱ Ruta caudice uno consistit, & arboris quasi natu-

k. h. 1. 15. ram adipiscitur, ut radix. ^k & perpetuo uiuet, & am-
sis

sis reliquis, tamen cacumine perdurat.^a Verum ex pal-
 mite exit, & auulsione^b & plura sunt eius genera.
^c Sed cum omnia olera aquas, fimumq; diligant, Ruta
 sola fimi assernatrice est^d syluestris aspectu uicina ur-
 banæ est, præter quam quod folijs minoribus, cauli-
 busq; scabrioribus constat, & succo potissimum acro-
 ri, uehementiori^e conditur, ut Satureia, origanum,
 & brassica.^e Rutula (ut uocant) folia carnosâ habet,
 sed caro in latitudinem distenditur, non in rotundita-
 tem crassatur.^f Ruta aquis salis rigata melior euadit,
 sicut etiam brassica, beta, & cruce.^g Cinis fico, & ru-
 tæ utilis est facit enim siccitate sua, ut radices neq; uer-
 mem, neq; putredinem sentiant.^h Brasica, & ruta dimu-
 tilatæ, in ramos dispersæ, ampliores, meliores, sapidi-
 ores redduntur.ⁱ Viperæ cum aliquo noxio commisso,
 mox aliud, quod iuuat assumunt, ceu rutam, ubi allium
 commederunt.^k Odor autem ex humiditate, siccitateq;
 moderatur, ex quibus odores omnes scilicet oriuntur.
^l omnino quicquid in alio scri possit melius redditur, ceu
 Ruta in fico, sic enim optimam posse fieri creditur: cor-
 tici infixam serere, & terra occultare consueuere, eue-
 nit nanq; ut humor lacteus ille fici super alimoniam au-
 xiliari quoq; suo calore ualeat opportunè, sicut & ci-
 nis congestus radicibus, ut supra diximus.

^m Rbutrum cacumine tantum ramos sst argit.

m. b. 6 3.

E c 11

a. h. 1. 7.

idē 4. 2. 9.

b. h. 5. 10.

c. h. 1. 8.

idem 3. 1.

d. h. 3. 1.

e. 1. 2.

e. h. 3. 2.

idem. fere c.

2. 13.



Alix palustris omnino spectatur. ^b & humida est. ^c contortior, & caudice breui constat, sicca tantummodo leuis est.

^d Sata germinat, & celerrimē, pulcherrimēq; ex auulsione, & non nulli sterilem putant. ^e Caterum Salicem celeriter fructum, antequam in plenum crassetur, percoquaturq; dimittere asseuerant. Quamobrem Homerum haud improbē frugiperdā hanc appellasse in

f. h. 3. 4.

g. h. 3. 6.

h. h. 3. 7.

i. h. 4. 7.

k. h. 4. 11.

l. h. 4. 14.

m. h. 4. 19.

idem. c. 5. 4.

n. h. 5. 4.

o. h. 5. 8.

p. h. 3. 13.

q. h. 3. 13.

r. h. 3. 13.

s. h. 3. 13.

t. h. 3. 13.

u. h. 3. 13.

v. h. 3. 13.

w. h. 3. 13.

x. h. 3. 13.

y. h. 3. 13.

z. h. 3. 13.

aa. h. 3. 13.

ab. h. 3. 13.

ac. h. 3. 13.

ad. h. 3. 13.

ae. h. 3. 13.

af. h. 3. 13.

ag. h. 3. 13.

ah. h. 3. 13.

ai. h. 3. 13.

aj. h. 3. 13.

ak. h. 3. 13.

al. h. 3. 13.

am. h. 3. 13.

an. h. 3. 13.

ao. h. 3. 13.

ap. h. 3. 13.

aq. h. 3. 13.

ar. h. 3. 13.

as. h. 3. 13.

at. h. 3. 13.

au. h. 3. 13.

av. h. 3. 13.

aw. h. 3. 13.

ax. h. 3. 13.

ay. h. 3. 13.

az. h. 3. 13.

ba. h. 3. 13.

bb. h. 3. 13.

bc. h. 3. 13.

bd. h. 3. 13.

be. h. 3. 13.

bf. h. 3. 13.

bg. h. 3. 13.

bh. h. 3. 13.

bi. h. 3. 13.

bj. h. 3. 13.

bk. h. 3. 13.

bl. h. 3. 13.

bm. h. 3. 13.

bn. h. 3. 13.

bo. h. 3. 13.

bp. h. 3. 13.

bq. h. 3. 13.

br. h. 3. 13.

bs. h. 3. 13.

bt. h. 3. 13.

bu. h. 3. 13.

bv. h. 3. 13.

bw. h. 3. 13.

bx. h. 3. 13.

by. h. 3. 13.

bz. h. 3. 13.

ca. h. 3. 13.

cb. h. 3. 13.

cc. h. 3. 13.

cd. h. 3. 13.

ce. h. 3. 13.

cf. h. 3. 13.

cg. h. 3. 13.

ch. h. 3. 13.

ci. h. 3. 13.

cj. h. 3. 13.

ck. h. 3. 13.

cl. h. 3. 13.

cm. h. 3. 13.

cn. h. 3. 13.

co. h. 3. 13.

cp. h. 3. 13.

cq. h. 3. 13.

cr. h. 3. 13.

cs. h. 3. 13.

ct. h. 3. 13.

cu. h. 3. 13.

cv. h. 3. 13.

cw. h. 3. 13.

cx. h. 3. 13.

cy. h. 3. 13.

cz. h. 3. 13.

da. h. 3. 13.

db. h. 3. 13.

dc. h. 3. 13.

dd. h. 3. 13.

de. h. 3. 13.

df. h. 3. 13.

dg. h. 3. 13.

dh. h. 3. 13.

di. h. 3. 13.

dj. h. 3. 13.

dk. h. 3. 13.

dl. h. 3. 13.

dm. h. 3. 13.

dn. h. 3. 13.

do. h. 3. 13.

dp. h. 3. 13.

dq. h. 3. 13.

dr. h. 3. 13.

ds. h. 3. 13.

dt. h. 3. 13.

du. h. 3. 13.

dv. h. 3. 13.

dw. h. 3. 13.

dx. h. 3. 13.

dy. h. 3. 13.

dz. h. 3. 13.

ea. h. 3. 13.

eb. h. 3. 13.

ec. h. 3. 13.

ed. h. 3. 13.

ee. h. 3. 13.

ef. h. 3. 13.

eg. h. 3. 13.

eh. h. 3. 13.

ei. h. 3. 13.

ej. h. 3. 13.

ek. h. 3. 13.

el. h. 3. 13.

em. h. 3. 13.

en. h. 3. 13.

eo. h. 3. 13.

ep. h. 3. 13.

eq. h. 3. 13.

er. h. 3. 13.

es. h. 3. 13.

et. h. 3. 13.

eu. h. 3. 13.

ev. h. 3. 13.

ew. h. 3. 13.

ex. h. 3. 13.

ey. h. 3. 13.

ez. h. 3. 13.

fa. h. 3. 13.

fb. h. 3. 13.

fc. h. 3. 13.

fd. h. 3. 13.

fe. h. 3. 13.

ff. h. 3. 13.

fg. h. 3. 13.

fh. h. 3. 13.

fi. h. 3. 13.

fj. h. 3. 13.

fk. h. 3. 13.

fl. h. 3. 13.

fm. h. 3. 13.

fn. h. 3. 13.

fo. h. 3. 13.

fp. h. 3. 13.

fq. h. 3. 13.

fr. h. 3. 13.

fs. h. 3. 13.

ft. h. 3. 13.

fu. h. 3. 13.

fv. h. 3. 13.

fw. h. 3. 13.

fx. h. 3. 13.

fy. h. 3. 13.

fz. h. 3. 13.

ga. h. 3. 13.

gb. h. 3. 13.

gc. h. 3. 13.

gd. h. 3. 13.

ge. h. 3. 13.

gf. h. 3. 13.

gg. h. 3. 13.

gh. h. 3. 13.

gi. h. 3. 13.

gj. h. 3. 13.

gk. h. 3. 13.

gl. h. 3. 13.

gm. h. 3. 13.

gn. h. 3. 13.

go. h. 3. 13.

gp. h. 3. 13.

gq. h. 3. 13.

gr. h. 3. 13.

gs. h. 3. 13.

gt. h. 3. 13.

gu. h. 3. 13.

gv. h. 3. 13.

gw. h. 3. 13.

gx. h. 3. 13.

gy. h. 3. 13.

gz. h. 3. 13.

ha. h. 3. 13.

hb. h. 3. 13.

hc. h. 3. 13.

hd. h. 3. 13.

he. h. 3. 13.

hf. h. 3. 13.

hg. h. 3. 13.

hh. h. 3. 13.

hi. h. 3. 13.

hj. h. 3. 13.

hk. h. 3. 13.

hl. h. 3. 13.

hm. h. 3. 13.

hn. h. 3. 13.

ho. h. 3. 13.

hp. h. 3. 13.

hq. h. 3. 13.

hr. h. 3. 13.

hs. h. 3. 13.

ht. h. 3. 13.

hu. h. 3. 13.

hv. h. 3. 13.

hw. h. 3. 13.

hx. h. 3. 13.

hy. h. 3. 13.

hz. h. 3. 13.

ia. h. 3. 13.

ib. h. 3. 13.

ic. h. 3. 13.

id. h. 3. 13.

ie. h. 3. 13.

if. h. 3. 13.

ig. h. 3. 13.

ih. h. 3. 13.

ii. h. 3. 13.

ij. h. 3. 13.

ik. h. 3. 13.

il. h. 3. 13.

im. h. 3. 13.

in. h. 3. 13.

io. h. 3. 13.

ip. h. 3. 13.

iq. h. 3. 13.

ir. h. 3. 13.

is. h. 3. 13.

it. h. 3. 13.

iu. h. 3. 13.

iv. h. 3. 13.

iw. h. 3. 13.

ix. h. 3. 13.

iy. h. 3. 13.

iz. h. 3. 13.

ja. h. 3. 13.

jb. h. 3. 13.

jc. h. 3. 13.

jd. h. 3. 13.

je. h. 3. 13.

jf. h. 3. 13.

jg. h. 3. 13.

jh. h. 3. 13.

ji. h. 3. 13.

jj. h. 3. 13.

jk. h. 3. 13.

jl. h. 3. 13.

jm. h. 3. 13.

jn. h. 3. 13.

jo. h. 3. 13.

jp. h. 3. 13.

jq. h. 3. 13.

jr. h. 3. 13.

js. h. 3. 13.

jt. h. 3. 13.

ju. h. 3. 13.

jv. h. 3. 13.

jw. h. 3. 13.

jx. h. 3. 13.

jy. h. 3. 13.

jz. h. 3. 13.

ka. h. 3. 13.

kb. h. 3. 13.

kc. h. 3. 13.

do: uirgas pulchriores, & ad texendum commodiores
 nigra profert: candida spissiores. Est tam nigra, quā
 candida genus quoddam paruum, & incremento in ex
 celsum orbatum sicut uel in cæteris arboribus idem in
 telligi potest, ut in cedro, & palma. Hoc Arcades
 non salicem, sed Hellicam uocant, existimantque re
 tulimus) fructum facundum eam parere.^a Verum spō c. 1. 33
 tanea nascitur, & ignoratur quomodo, latitare enim
 naturas seminum omniino arbitrandum est.^b & imper- b. 2. 4.
 fecta quidem germinat.

^c Saluicæ plura sunt genera.^d Sed Sphacelus & sal- c. h. 6. 12
d. h. 6. 2.
 uia inter se distant, quasi alterum urbanum, alterum ge
 nus syluestre dixeris. Sphacelo folium leuius, contra
 ctius minusque squallens: saluicæ scabritus.

^e Salsicortex roboris species est, quæ caudice cras- e. h. 3. 9.
 so, & fungoso, & cauato constat. Si crassus sit, ma
 gna ex parte cernitur; quapropter ædificijs minus hæc
 utilis habetur. Item breui putrescit, quod ex natura
 eius arboris accidit; Qua de causa concava, & inanis
 redditur. Sunt qui & corde hanc solam carere uolunt,
 & fulmine solam iacti, quāuis non altitudine excellat:
 Ac eorum quidam nec ad sacrificia lignis eorum utun-
 tur. hæc pro materiæ uniuersæ speciei modo discrimi-
 na intelliguntur. gallas singula ferunt genera.^f Salsi- f. h. 3. 101
 corticis materies ad axes, similiaque tantum commo-
 da est.

Sanfucum

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 1. 15. ^a *Sansucum suffrutex perpetuo uiwet.* ^b *et coronaria*
b. h. 6. 1. *herba est, surculosa, minutisq; condita folijs, ut Serpyllum, sisymbrium, helenium, abrotanum, quæ fructus proinde redduntur.* ^c *Verum sansucum utroq; modo emigrat. uidelicet et semine, et auulstone, præstat seminis copia, et iucundi odoris semen est, et qui dem mollioris odoris, necnon et planta eius transferri potest: flos æstius est.* ^d *Verum ad unguentum idoneum Sansucum est.* ^e *et odor maxime durat.*
- e. h. 1. 9. ^e *Sambucum nonnulli medulla carere asseuerant.* ^f *sed*
f. h. 1. 13. *nodos paucos naturæ ordine habet: cortex leuis est, et*
idem c. 5. 4. *concauo, et laxo corpore surgit.* ^g *maturè uerò sambucus germinat.* ^h *et iuxta aquam potissimum, locisq; umbrosis emicat: Cæterum et in minas eiusmodi solo nasci non recusat: est fruticosa uirgîs, quæ anniculæ donec folia decidant, in longitudinem crescunt, tum in crassitudinem se distendunt; uirgis excelsio non nimis magna, sed sena maxime cubita; Caudici crassitudo modo galeæ, cortex leuis, tenuis, spissus, materies fungosa, et siccata, leuis, medulla præmolli constans, ut uirgæ totæ concauentur. Quamobrem ex his baculos faciunt præleues; siccata ualida est, inoffensa aquis etiam disquamata si sit; disquamatur sua sponte, cum exaruerit. Radices per summa cespitum non multas, nec grandes agit. folium, quod particulatim exeat, molle, atq; oblongum, sicut lauro latifolia, uerum maius,*
latius,

latius, rotundiusq; de medio subeiusq; extremo in acutum compressius, ambitu serratum, totum autem circa unum pediculum, crassum, nervosumq; tanquam ramulus constat: & foliorum alia hinc, alia inde geniculatim, coniugatimq; adhæret, ac inter sese spatio distat, unumq; exit in cacumen: subrussa admodum folia fungosaq; sunt, defluit id totum simul, & hinc unum foliū totum esse putaveris. Rami quoq; nouelli quædam ad geniculorum speciem habent; flos candidus è minutis permultis candidis constans; specie faui super fissuras pediculi. redolet lirim, grauitè enim: fructum uerum non secus singulo pediculo crasso annexum racematum profert: hic maturescens nigrescit, immaturus Omphaceus; magnitudine eruo paulo maior, humore: aspectu uinaceus, & interna uisu Sesameacea continet. ^a Verum quæ in aquis uita breuiores, quam quæ in terra sunt, ut Sambucus, populus, & salix. ^b Quæ omnes non solum auulsione, uerum etiam summis ramulis pullulare facile queunt.

^c Sari dulcedine, coptaq; alimonia cibo idonea est, in aqua prouenit, circa paludes, planeq; ubi amnis recesserit: habet radicem præduram, flexuosamq; ex qua, quæ saria uocant, exeunt: His longitudo duum cubitorum: Crassitudo pollicaris, triangulum id quoq; papiri modo, & comam similem gerit: qui manducant, eius quoq; manducamentum expuunt, radice fabri fer-

rarij

THEPHR. DE PLANTIS.

rarij utuntur, carbonem enim optimum facit propter ligni duritiā.

a. c. 6. ^a Sapo^res sunt septem, sicut & odorū, & colorū, hoc tamen ita crit, si salsum non alium quam amarum posueris, quemadmodum & si fuscum colorem nō alium quā nigrum. At si secernes, octauum hunc esse nece^ssē sit. Quippe dulcis, pinguis, amarus, austerris, acris, acutus, acerbusq; enumerantur, sal^susq; octauus subiungitur. Sunt qui uinosum quoq; adiciendum putarunt. Sed abunde uide y i, Librum Theophr. de causis, qui ferē totus de saporibus.

b. h. 1. 19 ^b Satureiæ succus acris est, ut Origani, nasturtij, & Sinipis. ^c & plura sunt eius genera ^d semen focundum, atq; etiam magis Origani manifesto sentitur. & in Arcadia minimē prouenire possunt. nam quo flatus ē mari nequeant peruenire, illic nasci, durareq; posse omnino uegant. sicut etiam Thymum Athenis ^e Verum satureia ex semine uetere celerius exit, ut apium, beta, nasturtium, coriannum, & origanum. ^f syluestris urbanae aspectu uicina est, nisi, quōd folijs minoribus, caulibusq; scabrioribus constat, & succo potissimum acriori, uehementiorique conditur: ut etiam origanum, brassica, & Ruta. ^g Verum cultura deterior redditur. ^h & difficile germinat propter caliditatem.

i. h. 7. 3. ⁱ Scandix annicaulis constat, ut malua, Cucumis sylvestris

Sylvestris, & solaris.

^a Scamonia radice, & succo medentur. ^b (addit frum. ^c succum tantum dicit usui esse.)

^d Scythica radix dulcis est, & quidem nonnulli dulcem eam appellant: nascitur apud Meotim: utilis anhelitus, & ad tussim siccam, atq; in totum toracis laborantibus medicamento commoda redditur. adhuc mederi ulceribus potest in melle, sitim quoque extinguit, si teneatur in ore, qua de causa tum ea, tum equestri uocata, Scytas undecim, & duodecim dies sitim tolerare affirmant.

^e Scissima radices paucas habet, & per summa terrarum. ^f Verum nullas penitus differentias habet, sed ferè æquiparatur abiecti. Simplex genere est, erecta, levis, & nodis crassitudine, altitudineq; æqualis ferme abiecti. Quin & cætera non absimilis est, lignum coloratum robustum, neruatumq; cortex levis, folium crassum, bifidum oblongius, quàm piro, extremo aculeatum; radices nec multæ, nec alto descendentes: fructus levis, glandeus in calice echinata, placida tamen, & leui, non hispida, ut castaneæ, similis tamen illi dulcedine, atq; succo. nascitur etiam montibus candida materie, quæ ad multa perutilis, etenim ad carpenta, lectos, subsellia, mensas, nautigiaq; ^g (et ad palustrium, uectabulorumque uilem fabricam) Campesstris nigra, & ad hæc minus utilis, fructum tamen similem ferunt.

F f

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 3. 11. ^a runt. ^a sed ad summam arbores ferè omnes, quæ tam montibus quam planis eadem proueniunt, monte coloratæ ualde, candidæquæ assurgunt, ut scissima, ulmus, & reliquæ, plano autem rariores corpore, pallidiores, deterioresq; præter quam pirus, & fraxinus, ut Olympi incolæ uolunt. ^b scinditur uerò scissima
- b. h. 3. 1. ^b autumno, ut tilia, acer, & caprinus. ^c Latinus ager scissimam mirabilem habet, tanta enim longitudine cæditur, ut pro carina Etruscis nauibus possit sufficere.
- c. h. 5. 9. ^d Verum fagus, siue scissima in aqua permanere posse incorrupta uidetur, madefactaq; melior reddi.
- d. h. 5. 5. ^e Scylla & si terrestris est, tamen mari nonnunquã
- e. h. 1. 7. ^f uiuit. ^f radix tunicis multiplicibus, corticosaq; porrigitur. ueluti bulbus & cæpa. ^g folia pediculo carent. ^h et
- f. h. 1. 10. ⁱ lata sunt. ⁱ uerum ficus si iuxta scyllam feratur, ocius
- g. h. 1. 16. ^j crescit, minusquæ à uermibus infestatur. Summatim
- h. h. 7. 12. ^k omne scyllæ appositum facilius germinat, celeriusq; au
- i. h. 2. 7. ^l gesit. ^k nascitur uerò radice, & diuturnior est, sicut
- idem c. 5. 7. ^m omnia capitata. ^l quæ omnia radice uiuacia maiorem
- k. h. 7. 2. ⁿ in modum sentiuntur, sed præcipuè scyllæ, ut pote quæ
- l. h. 7. 12. ^o suspensa uiuere possit, & quidem plurimum temporis.
- m. h. 7. 4. ^p Verum ab radice aliud, atq; aliud obducit, & plura
- n. h. 7. 11. ^q indies fiunt. ⁿ Et non tantum bulborum radices uescēdæ, atq; eiusmodi, uerum etiam astulæ regiæ, atq; scyllæ, non tamen omni, sed Epimenidæ uocatæ, quæ ab usu nuncupationem sortita est. hæc angustiori folio, le
- uitori;

terioriq; quàm reliquæ constat. ^a germinatio uerò prior ^a h. 7. 12.
 scyllæ, posterior Narcissi, & folium is large mittit,
 & radix ipsa parua nequaquam est, quamquam non
 magna figura, non absimilis bulbo, uerum non squama
 ta. ^b Verum alij scylla subdita lutum super imponunt ^b c. 3. 62
 & testam adijciunt. scylla enim plantam uiridem ser- ^c c. 5. 4.
 uat lutum Scyllam, testa lutum tuctur, ^c suspensa
 autem germen emittit. ^d & ad summam scylla, bulbis ^d c. 6. 18.
 dentiq; omia capitata contra partem superiorem, tenuè,
 imbecillemq; radices amplas, carnosasq; gerunt. prorsus
 in quibus acedo inest, uel aliqua eiusmodi uis, ra-
 dicibus potius inest, ut cæpæ, allio, scyllæ: quod ra-
 tione optima euenit, cum natura eo potius tendat, ui-
 res. n. naturã sectari necesse est, quod in uenentis maxima
 ferè parte uidemus: Quippe radices uenenosiores, potè-
 tioresq; sunt. Causam duo illa, quæ superius diximus,
 habet, idest, quòd neq; præhumida, neq; præarida sint.

^e Scolopendria iuxta dracunculum maxime reper- ^e h. 7. 11.
 tur. Vide Dracunculum.

^f Securina securi similis in aphactis nascitur. ^f h. 8. 10

^g Selago amara est, atque uniuerfa genera intus- ^g c. 2. 7.
 borum.

^h Semen atq; Tiphæ mutari in triticum solent, si pi- ^h h. 2. 3.
 sta serantur: idq; non protinus, sed anno tertio, quod
 similiter ferè fit, atque cum semina ratione locorū per-
 mutantur: nam ea quoq; singulis in locis temporis stæ-

- a. h. 3. 1. tio ferè pari, atq; Tipha mutantur.^a maturè uerò se-
- b. c. 4. 6. runtur, sicut omnia tritico similia.^b Verum Zea id-
est semen ualida est, & difficile immutatur, ut triticum
unica hac ratione soluentur. Quontam enim ualidissi-
ma sint, radiceq; numerosa cohæcant, idcirco resiste-
re firmitus possunt, cæteraq; infirma sint, penitus pe-
reunt. Item tempus, quo ista seruntur, magis pluuium
est, plusq; tempus in terra tenentur; Cætera ad Ver,
& cælo iam indulgente sparguntur, & germinare con-
festim incipiunt: Quamobrem neutrum ex corruptio-
ne illorum, si quando corrumpuntur, consistere potest:
enimvero posse transire in lolium arbitrari absurdum
omnino est, semper enim ad proximum, & quod con-
genere quodammodo sit, mutatio prouenit. Vtrumq;
uerò negatum his esse, imbecillitati tribui debet, cum
omnino intercant: sed potius illa transire in lolium pos-
sunt, quæ speciem tritico, ordeoq; similem gerunt: Ex
his tamen alia ob imbecillitatem tolerare nihil penitus
queunt, ut tipha: alia in proximum potius transeunt,
ceu semen in auenam, triticum uerò in tipham, aut se-
men nunquam mutatur, quia plurimum illud, ac uali-
dissimum alimentum, cuius causa mutatio sequitur, non
effeminet, nec ad robustius ducat, & omnino genere
pristino expoliet.^c inoffensum uerò permanet, quia tu-
nica multiplici tegitur.^d uerum si parte aliqua detrahatur
principio generationem minus impedit, sed si exem-













pta sepius sit, & ueluti penitus semen dissipetur, atque affici opportunius relinquatur, tum in qualitate mutatur, nec eandem multitudinem palcæ retinet

^a Semen semper prouenit generationis causa, atq; ad 4. c. 1. 1.
 id officium natum penitus est, quod uel cæteris quoq;
 omnibus haud dubie intelligi licet, sed quod in plerisq;
 agricolæ semine uti non consueuerint, quia scilicet spon-
 te celerius prodeunt, adulescuntq;, uel quia non facile
 in quibusdam tam arboribus, quàm herbis semen acci-
 pi possit. Idcirco nonnulli semine creari omnia posse
 negarunt: quanq; id in fictis (ut inter historias dictum
 est) latissime pateat, sed sit certè illorum germinatio
 aliter, nisi quid ex his, quæ sponte proueniunt alimen-
 ti confluuiio, aut putredine, uel potius immutatione na-
 turali creatum extiterit. Constat igitur generationem,
 quæ semine agatur, plantarum omnium esse communè.
 Sin autem pleraq; non desinit, quæ modo utroq; uide-
 licet et semine, & sponte ualeant procreari, absurdum
 id haudquaquam putari oportet, uerum quæ sicca, sim-
 plicia, minusq; plantigera extant, hæc (ut ita loquar)
 nullum ferendi genus admittūt, neq; auulsiōis, neq; ra-
 mi uerò & surculi, quia sint siccissima: semper enim
 quod germinaturum est, aliquem humorem habere inge-
 nitum, eundemq; seruare posse oportet, quod quidem
 à natura siccis negatum penitus est. hæc enim ubi dem-
 pta ex arbore sint, quam primum diffiantur, euaporan-
 turq;

- turq; simul omnem calorem sibi inniatum. hæc ob eiusmo-
di causas nequeunt germinare cætera nimirum queunt:
ut pote quæ media quadam temperie caloris, humorisq;
consistent, ualcantq; humorem, caloremq; sibi insitum
diutius conseruare. ^a uerum semina imbres quoq; æsti-
uos, qui paulatim, crebroq; accedant, magis requirunt,
quia infirma sunt, per summamq; telluris adharere.
b. c. 2. 17. ^b quo minora uerò semina sunt, eo fertiliora sunt, & ma-
xime fructificant. ^c uerum si conseruari debent, maxi-
mè abesse ab humidis oportet.
d. h. 1. 16. ^d Semperuiuum folia carnosâ habet, ^e & hoc à natu-
ræ ei datum est, ut semper humidum, uirideq; durare
ualeat folio carnosâ, leui, atq; oblongo id constat: pla-
nis parietinis nascitur, necnon & in tegulas, cum ter-
ræ confluuium quoddam arenaceum factum est.
f. h. 7. 7. ^f Senecio inter olera numeratur, & intubacca con-
stat. ^g diutius uerò floret ^h quapropter si animaduerte-
re uolueris, assiduam penè per totum annum germina-
tionem, floris productionem uidebis. Semper enim al-
terum altert succedens tempora omnia occupat. ⁱ Ve-
rum hac de causa diutius floret, quòd mediocritatem
quandam alimenti obtineat.
k. h. 4. 4. ^k Serpentes, & lacertæ, & similia, quod sine potu
uiuere possunt, nulli dubium est. ^l Verum serpentes
ictu Scorpionum intereunt, quo nihil homines pa-
tiuntur.

^a Serpillum fructu omnino carere asseuerant, sicut ^{4.} h. 6. 7.
 Sisymbrium, & menta, saepe enim haec exiccata, tri-
 taq; seruisse se inquit, sed nunquam germen erupisse,
 & periculum huius fecisse affirmant, attamen illud ue-
 rius est; neq; desunt, qui uel haec experti fuerunt, & na-
 tura ipsa syluestrium plane attestari uidetur: serpilli
 etenim syluestre etiam genus est quod deferentes ex mo-
 tibus serunt, ut apud sycionem fieri solet, atq; etiam
 Athenis ex monte Hymeto: apud alios uero, ut in
 Thracia montes, et plana omnia serpyllo scatent. ^{b.} auul ^{b. c.} 1. 4:
 sione uero germinat, sicut abrotanum, & sisymbrium:
 haec enim radices e germinibus suis quam primu dimit-
 tunt, non secus ac edera. ^{c.} & semper quaerit aliquid, cui
 incubat. ^{d.} nisi uero purgetur, obarescit, sicut sisymbriu, ^{e.} c. 2. 25:
 & caetera, ^{e.} flores eorum, quae tota sunt odorata, nul- ^{d.} c. 3. 24.
 li (ut ita loquar) odorati creantur, ceu serpylli, sisym- ^{e.} c. 6. 15.
 brij, & helenij. atqui ratio exigit, ut quod in caeteris
 quamquam inodoratis odoratissimum est: idem etiam in
 odoratis sit odoratissimum. ^{f.} Verum (ut summatim aga- ^{f.} c. 6. 12.
 mus) odor & foliorum, & ramorum, & in totum ar-
 borum, atque plantarum in eisdem generibus est, in
 quibus aliquid acredinis, aut pinquedinis inest. ut exem-
 pli gratia in serpyllo, sisymbrio, & alijs. ^{g.} ^{g.} c. 6. 23.
^{h.} acredo ue- ^{h.} 24.
 ro, atq; eorum sinceritas tedito admodum est. ^{h.} propter ^{h.} c. 6. 29.
 siccitatem. ^{i.} ocimum autem, quod loco soli expositum sit, ^{i.} c. 3. 8.
 transit in serpyllum, quia uehementer siccatur.

THEPHR. DE PLANTIS.

- a. c. 6. 12. ^a Sertula campana plenius olet siccata, ut iris. ^b 
- b. c. 6. 23 plus temporis odorata durat.
- c. h. 1. 18 ^c Sesamum semen modo quodam peculiari ꝑ roducit.
- d. h. 8. 1. ^d  æstiuus seritur,  genoratio simplex,  una est, quippe semine tantum exit, ut panicum, milium. ^e quæ spacio quadraginta dierum ꝑ erficiunt fructum, non de sunt tamen, qui uel pauciores dies prodiderint, uerum f. h. 8. 5. fertilissimum est, ueluti milium. ^f datur uerò  sesa- g. h. 8. 6. mæ genus quoddam candidum. ^g  cum imbres post sationem omnibus prosint, tamen fabæ, sesamæ, cumi h. h. 8. 10. no,  triono maxime nocent. ^h omnium autem, quæ æstiuus seminibus ager recipit, sesama terræ molestissima esse, plurimumq; posse extenuare putatur, ut pote quæ multipliciori, crassioriꝑ; calamo,  numerosiore consistet radice, quàm milium. ⁱ culmus ferulaceus i. h. 8. 3. est ^k durant autem sesamæ maxime, quia pinguia sunt k. c. 4. 2. ^l  hac de causa optime reponuntur. ^m Verum non- l. c. 4. 16. nunquam sponte suæ naturæ traduntur, sesama, milium, m. c. 4. 17 panicum, auena, lolium, cicer omnino quæ acerbi sa- n. c. 6. 20 poris sunt. ⁿ sed ad summam sesama,  Erysimum à nullo animali uiridia tangi uidentur propter amaritudinē,  grauitatem saporis, sed siccata acceptiora euadunt, fructusq; eorum suauēs efficiuntur.
- c. h. 3. 12 ^o Satanea mespili species est uide Messpilium.
- p. h. 7. 4. ^p Satanica cape species est. Vide Capam.
- q. h. 4. 11. ^q Sida in lacu Orchomenio nascitur,  specie pa- paucri

paueri similis est: tale enim caput gerit, nisi quod amplius, ad portionem magnitudine mali tota amplitudo, nec nudum, sed candidis membranis intectum: hisquē forinsecus folia herbescentia proxima rosis adhuc in calice contentis, quaterna se applicant, apertum grana rubra ostendit, figura non modo papaueris, sed orbiculata exigua, nec multo milio maiora. Saporem dilutum quendam, ut triticum, reddit: crassatur aestate, pediculo paruo annectitur: flos calici rosæ similis, sed maior, & fere duplex magnitudine. Hunc itaq; & folium super undas emicare affirmant; mox cum defloruerit, fructusq; compilatus sit, magis in aquam declinari, demum terram attingere, fructumq; fundere. Citabo uerò idonea ex nascentibus lacu, sida & ipsa, & folia ouibus, germen subus, fructus hominibus.

^a Silago ab radice tantum foliata est, sicut nigella, ^{a. h. 7. 9.}
anchusa, fremium, & alia.

^b Siligo mature scirur, ut semen, & tipha, & si quid ^{b. h. 8. 1.}
aliud tritico simile consistat. ^c uerum multiplici folli- ^{c. h. 8. 4.}
culo includitur. ^d & culmis mollioribus, atq; infirmio ^{d. h. 8. 9.}
ribus constat.

^e Siliqua, quam ficum Aegyptiam appellant, & ^{e. h. 1. 18.}
Cercis, & colættia circa Liparam semina nuda in sili-
quis annua gerit. ^f & ex grandibus ramis fructificat. ^{f.}

^g Siliqua nomine appellata speciali, si ligna longa ^{g. h. 8. 3.}
affixeris, ascendet, & frugifera fiet; alioqui uttiosa,

G g atq;

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 8. 10. atq; eruginosa reddetur. ^a celeriter uerò perit. ^b & ar
b. c. 2. 25. bores scandit, & offensat, perstringendo, & obum-
brando pabulum aufert, cætera prohibendo, sicut etiã
lupinum, & uolucrum.
- c. h. 1. 19. ^c Sinapis succus acris est. ^d & post æstiuum solsti-
d. h. 7. 1. tium feritur. ^e semen in siliqua profert sinapi, ut radix,
e. h. 7. 3. & rapum. ^f & ad perdurandum firmitus est.
- f. h. 7. 6. ^g Sicilia fertilis frumenti est. Vide Triticum.
- g. h. 8. 6. ^h Smylax nudum affert fructum, & sero maturat.
- h. c. 1. 21. ⁱ Sisymbrium surculosum, minutisq; conditum folijs
i. h. 6. 1. constat. frutexq; protinde redditur. ^k rami, folia, &
k. h. 6. 6. in totum uniuersum odoratum sentitur, sicut serpillum,
& helenium. ^l quæ simplici specie constant, & ligno
l. h. 6. 6. sa sunt. ^m fructu omni carere affirmant, odor acris, de
m. h. 6. 7. generat uerò facile, nisi transferatur. ⁿ & in mentam
n. h. 2. 5. transit. ^o germinat auulsione. ^p & radices à germi-
o. h. 2. 1. bus suis quam primum dimittit. ^q Verum si transit in
p. c. 1. 4. mentam, odorem tantummodo mente recipit proprio
q. c. 2. 22. amisso, quia cultura caruerit, speciem uerò non reci-
o. h. 2. 1. pit, sed quasi nepitæ redditur simile. Omnia nanq; in si-
p. c. 1. 4. mile sibi quicquam mutantur, non in remotum penitus
q. c. 2. 22. transiunt. cultus autem, & translatio naturam pro-
o. h. 2. 1. priam retinet, atq; seruat. Argumentum quod &
p. c. 1. 4. agreste sisymbrium talem reddit odorem. Etenim illud
q. c. 2. 22. quoq; naturæ aduersum est, mentam radice alta fir-
o. h. 2. 1. mat, sisymbrium per summa Cessitum coherere, nec

tam numerosam radicem sortiri. quamobrem in his quidem mutationem potius imaginariam quandam fieri dixerim, & urbanum quasi in agreste transire. nec absurdè sic agi, quandoquidem loca etiam ipsa immutantur.^a purgatio in coronarijs pariter, atq; in oleribus c. 3. 14. commoda est. quippe Sisymbrium obarescit, nisi purgetur, & serpillum, & cætera.^b Verum serpilli flores c. 6. 15. res, & sisymbrij minimè sunt odorati, quoniam quæ tota odorata sunt, eorum flores minimè odorati creantur.^c olent uerò hæc quoniam in his siccitas, & acritas, c. 6. 22. uel acerbitas innotescit.

^d Sisyrinchium quodammodo redigi ad bulborum genus desiderat, quòd radice orbiculetur, nam colore quidem penitus discrepat. Hoc uerò Sisyrinchio peculiare datum, ut una radix primo augeatur hyeme, tum ineunte uere, quod in imo excreuerit, contrahatur, supernumq; crescat, quod manditur.^e radix dulcis est, quia c. 6. 16. neq; sicca nimium, neq; bumida est. sapor enim neq; in siccitate, neq; in humiditate nimia considerare potest.

^f Smereæ plura sunt genera, ut Origani, Satureiæ, f. c. 6. 1. & aliarum.

^g Smilax ex syluestribus perpetuo uiuet.^h & folia g. h. 1. 15. cum extremo, tum lateribus sinuata concidunt.ⁱ uerum i. h. 3. 18. Smilax id est hedera cilicia amplexi caulis ipsa quoq; assurgit, fructus aculeatus, & uelut præhorridus; folium hederæ, paruum sine angulo iuxta pediculi retina-

culum humectum : peculiare , quod medium illum cal-
lum , qui instar spinæ animantium secatur , prætenuem
habet, & intervalla staminea, non ex eo porrecta , ut
cætera, sed circa eum in orbem circum acta, ab annexu
pediculi ducit , ad caulem uerò foliorum internodia con-
sumantem: uillum ab eisdem pediculis, atq; folia tenuis,
seq; conuoluens dependet. flos candidus, suauiter olēs,
uerno proueniens tempore fructus proximus herbæ so-
lano, atq; melothro, & maximè uuæ Lambrusca uoci-
tata. Racemi pensiles ut hederæ sunt ; uerum ad lam-
bruscam potius accedunt : nam de eodem puncto pedi-
culi acinorum exeunt, colore fructus rutilus est, nucleos
in uniuersum quidem binos continet , quanquam gran-
dior ternos , & paruulus uinum nucleus durus admo-
dum est, & colore fornifecus niger, peculiare racemis,
quod per latera caulium sepiunt, postremoq; caulis, ra-
cemus omnium maximus perpendet sicut in Rhamno,
& rubo : unde fit , ut extremo fructifera , latere lar-
gè fructifera ista spectetur . Verum ad summam sem-
per querit cui incubat, sicut hedera, cucumis , & alia.

^a Smilax arbor est, quam Archades sic uocant Illi-
ci similem , folio tamen non aculeato, Sed molliori pro-
fundiori, differentiisq; pluribus distinguendum, nec ma-
teriae , ut illa, solida , spissaq; , sed soluta , mollique

6. h. 7. 3. in opere.

7. 9. ^b Solaris herba sic uocitata diutius floret. & ma-
xime

xime in solstitio. ^a & annicaulis constat, ut scandix, ^a h. 7. 8.
 & malua. ^b Verum solaris perpetuo uiret, ut polium, ^b h. 7. 10.
 atq; capillus Veneris.

^c Soncus spinosa est. ^d & utrinq; foliata est. ^c h. 6. 4.
^d h. 7. 9.

^e Solum quod mediam obtinet confusionem contra- ^e c. 2. 6.
 riorum idest soluti, & spissi, sicci, & humidit, leuis, &
 ponderosi, atq; etiam superiora modice inferioribus re-
 spondentia, in his ipsis sortitur: hoc omnium optimum
 omnibus ferme arboribus, atq; frugibus est.

^f Sorbum quidam sterilefcere uolunt, si ad loca fer f. h. 2. 33
 uentia uenit: hæc enim sua natura frigida querit. ^g & g. c. 6. 24.
 odorator est. ^h uerum syluestris maturior urbana est. ^b h. 3. 3.
ⁱ radix per summa cespitum, sed ualida, crassa, moriq; i. h. 3. 8.
 contumax, multiplex tamen modice, hæc alta radice
 descendere, superficieq; gaudere notatur. ^k uerum sor k h. 3. 12.
 borum duo genera dicunt, foeminam fructiferam, &
 masculam sterilem. Cæterum fructibus differunt, quod
 alia orbiculatum, alia ouatum ferant, distant & suc-
 cis, nam omni quasi ex parte odoratores, dulcioresq;
 orbiculati sentiuntur: ouati sæpe numero acidi, minusq;
 odorati: folium ambabus totum prolixo, neruaceoq; pe-
 diculo constans. singula uerò in uersum condita, mo-
 do alæ lateribus exeunt, tanquam ex omnibus unum
 exulcet, ad neruum usq; laciniatum, uerum inter se ar-
 pliufculo singula distant, decidunt non paulatim, sed
 simul tota illa alata facies. Sunt in uetustioribus, bre-
 uioribusq;

THEOPHR. DE PLANTIS.

utoribusq; pauciora. Omnibus in postremo pediculi folium impar prominet, ut etiam cūctā numero impari ab soluant. figura laurum tenuifolium imitantur; uerum ambitu serrata, breuioraq; sunt, nec in extremum acutum mucronata, sed in rotundius orbiculata, flos racematis singulari peciolo ē multis minutis, & candidis constans. fructus quoq; cum largē fructificatur, racemi modo aceruatus producit. quippe multo eidem cohaerent peciolo, ita ut faui quodammodo spectem gerat. Eroditur à uermibus super arborem, crudus adhibet, magisq; mespila, piraq; quamuis hic maximē omnium sit acerbus, ipsa quoq; arbor uermibus obnoxia est. atq; ita senescens exarescit. Et uermis eius peculiaris. rufus, pilosus. Noua admodum fructificat; etenim trima continuo parit. Autumno cum folium amiserit, protinus amentaceum gerit pectus, pinguem, ac turgidum, quasi iam parturiat: germina itaq; hyeme perdurant, aculeis tam sorbus, quā mespilus caret. cortice leui, pinguiusculo: colore ad flauum albicante, noua uestiuntur. annosa autem scabro, nigroq; praestat haec arbor magnitudine, rectitudineq;: coma concinna ornatur, quippe magna fermē ex parte nucis pineae figuram suo uertice capit, nisi aliquid impediat; Materies solida, spissa, colorata, ualida radices haud multas, nec altē descendentes, ualidas tamen, & crassas, & in corruptibiles agit, nascitur radice, auulsio-

ne, semine, solum gelidum, atque contumacior, tamen
 inontibus etiam nascitur. ^a resistere uero maxime po- ^{d. c. 2. 10.}
 test propter acerbicatem, & arbore decerptum matu-
 rescere potest, & si non eadem maturitate, quam ar-
 bore, tamen ita aliquid dulcedinis capit, ciboque ido-
 neum redditur. ^b Verum dulcius quidem redditur, sed ^{b. c. 3. 11.}
 minus odoratum, uires enim sicci, bonique odoris de-
 ficiunt.

Sphacelus, uide Saluiam.

^c Spina candida spinosa est, sed non aculeatis folijs ^{c. h. 6. 4.}
 constat. ^d In regione autem Aria dicta spina est, ex ^{d. h. 4. 5.}
 qua lachryma gignitur, illyriae similis tam uisu, quam ol-
 fatu. Haec ubi sol illuxerit, defluit. Quin & alia mul-
 ta praeter haec nostratia, tum agris, tum amnibus pro-
 ueniunt. Alijs locis spina candida nascitur, ramis ter-
 nis, ex qua regulas, atque baculos faciunt: succosa, bu-
 moris lactei, fungosaque est. herculaceam hanc appel-
 lant. Est etiam aliud, stirpis humilis, magnitudine
 quidem, folio uero tam magnitudine quam forma lau-
 ro simili, id qui comederit, protinus moritur. Quo cir-
 ca ubi equi adessent, nunquam eos e manibus laxabant.
 Coedrosiae prouinctae nasci quiddam folio laurino refe-
 runt, cuius quantulumcumque iumenta comedissent, mox
 interibant: Similiter affecta, distentaque, atque illi, qui
 morbo comitali uexantur; aliam autem esse spinam, fo-
 lio nullo, radice singulari: aculeum potissimum quoque

in nodo gerentem, quo fracto, aut attrito succum lacteum multum effluere, qui cæteris omnibus animalibus cecitatem infert. Quibusdam item locis herbam quandam exire, sub qua serpentes minutos admodum connatos manere: quorum ictu moriendum protinus esset, cum herbam quisquam aggressus fuerit. Quin et à palmis incoctis strangulari qui comederit, idq; postea perfectum.

- a. h. 6. 4. ^a Spina marilis folium iuxta aculeum gerit.
- b. h. 4. 11. ^b Spina, quæ ceanothos appellatur germinat, quem admodum gladiolus, uerum huius radix non arundinosa, neq; geniculata est.
- c. h. 5. 1. ^c Spina Indica nescio quid myrrhæ simile gignit.
- d. h. 9. 1. ^d Spina Aegyptia gummam fert, uerum non ex cortice, sed ex uase. ^e Verum insipida gumma est, et in olida.
- f. h. 9. 1. ^f Spina hyrci lachrymam producit.
- g. h. 4. 8. ^g Spina dipsas uocata sola in Arabia nascitur, et hæc rara propter feruores, et aquæ penuriam quippe non nisi quarto, quintouè anno pluit, et tunc impetuosè, et breui tempore.
- h. h. 4. 3. ^h Spina ex eo nomen accepit, quòd tota arbor aculeis horret, excepto caudice, nam et super germina, foliaq; aculeos gerit, magnitudine excellit, materiei quippe duodenorum cubitorum rectis idonea cædiur. eius duo genera sunt, quædam enim candida, quædam nigra:

nigra: & altera imbecillis, facileq; putrescens: nigra autem robustior, atq; incorrupta, ob id in nauium fabrica ad costis, uentrisq; compagines ea utuntur: erecta non ualde assurgit; fructus in siliqua modo leguminum, quo incolae cortia perficiunt, uice gallae. flos & pulcher aspectu, ut coronas ex eo facerent, & medicamentis perutilis; qua de causa colligi à medicis solet. fit & gumma ex ea: manat tum arbore percussa, tum sponte sine ulla fixura; cum autem caesa fuerit, anno tertio protinus resurgit. copia huius arboris largè habetur, & sylua ingens circa agrum thebanum est.

^a Spina regia aculeis constat, & radix in caput excrescit, ceu nepa, Tiphium, & lirim.

^b Spodias ueluti syluestris prunus habetur.

^c Spongia, quae & Philisia uocantur, in mari reperiuntur.

^d Stoebea idem est, quod pbleus, nam Pbleum stoebam nonnulli appellant.

^e Stiba frutex est, & folia carnosae habet.

^f Stelis pululare in terra nequit, & idem est quod uiscum (nam Stelis Euboensium uocabulum est.) uide Viscum.

^g Stirax ad unguenta utilis est.

^h Suber corticem carnosum habet, ut robur, & populus, & etiam uiride leue est. ⁱ perpetuo uero uiuet, ex Syluestribus, sicut picea agrestis, & pinastrum,

- a. h. 3. 6. *et pinastrium, et alia, uerum et distinet omnium, ger*
 b. h. 3. 16. *minat, quaedam uero propria locis certis redduntur,*
ut super arbor Pyrrheni familiaris, caudicosa, pa-
rumq; ramigera, admodum tamen proceras, uicinisq; de
signis lignis robusta, cortice unico crasso, distrumpi
solito, quem admodum piceae, uerum fragmenta gran-
dioribus, folio fraxini, crasso, oblongiori, non perper-
uo, sed deciduo, fructum glandosum assidue ferit, qui
folia similem, detrahunt, corticem, uniuersumq; diuic-
deciduum censent, alioquin arborem deteriorem effici uo-
 c. h. 4. 18. *lunt, rursum uero intra triennium repletur, et licet*
omnes aliae detractio cortice moriantur, suben melior
 d. h. 5. 4. *euadit. uerum rigidum est, et ad simulacra cuius ma-*
teries incommoda est, et ad similes, uelut arbor
 e. h. 1. 2. *ut surculus est, quod ex his indiuiduum, simplexq;*
oritur, quale praecipue germen annotinum, appareat,
sed haec potius arborum generi conueniunt.

Nulla q. p. illud non mod

ad h. 3. 6. et pinastrium, et alia, uerum et distinet omnium, ger
 b. h. 3. 16. minat, quaedam uero propria locis certis redduntur,
 ut super arbor Pyrrheni familiaris, caudicosa, pa-
 rumq; ramigera, admodum tamen proceras, uicinisq; de
 signis lignis robusta, cortice unico crasso, distrumpi
 solito, quem admodum piceae, uerum fragmenta gran-
 dioribus, folio fraxini, crasso, oblongiori, non perper-
 uo, sed deciduo, fructum glandosum assidue ferit, qui
 folia similem, detrahunt, corticem, uniuersumq; diuic-
 deciduum censent, alioquin arborem deteriorem effici uo-
 c. h. 4. 18. lunt, rursum uero intra triennium repletur, et licet
 omnes aliae detractio cortice moriantur, suben melior
 d. h. 5. 4. euadit. uerum rigidum est, et ad simulacra cuius ma-
 teries incommoda est, et ad similes, uelut arbor
 e. h. 1. 2. ut surculus est, quod ex his indiuiduum, simplexq;
 oritur, quale praecipue germen annotinum, appareat,
 sed haec potius arborum generi conueniunt.

quod uendentes fraudare dicuntur, tanquam cedrum uenundent, totum enim cor esse cortice detracto: corticem similem cedro habere, tum scabricie, tum colore, radices breues, graciles, per summaq; cespitum, rara hæc circa Idam. At in Macedonia, Archadiaq; uel fructum abunde proferre, rotundum, faba paulo maiorem, colore rufsum, tactu mollem aiunt: Quod si iumenta folia comederint, emoriuntur: Si rumi nantia nihil patiuntur: fructus & ab aliquibus hominibus manditur, suauisq; est, atq; innoxius. ^a uerum uehementer umbrosis taxus gaudet, sicut padus, & trau-
 4. h.4.1. palus. ^b & natura perpetua est, durat enim maximo-
 6. h.5.5. pere.

6. h.9.19. ^c Thelipponum, quod alij Scorpionem appellant, quia radicem scorpioni similem habet, admotum scorpionem occidere tradunt, & cum reuiuiscere posse, & Elleboro candido linatur. Enecat idem, & boues, & oues, & iumenta, & ad summam omnes quadrupedes. Eodem die si genitalibus folium, uel radícula imponatur, proficit potum contra Scorpionum ictus. Habet folium tuberis terræ, radicem (ut dictum est) similem Scorpioni; nascitur graminis modo, & geniculis constat: loca amat umbrosa, quod si uera sint, quæ de scorpione narrantur, iam & reliqua eiusmodi haudquam incredibilia dici debeant: nec fabulose, quæ attribuntur plantarū uiribus brute componi uideantur.

Tetralis

^a *Tetralis* à quibusdam uocata aestate floret, ut ^{a. h. 6. 38}
cardus & *pinca*.

^b *Traupalus*. inter syluestria radicibus multis con- ^{b. h. 3. 7.}
 stat. & umbrosis locis uehementer gaudet, ueluti ta- ^{c. h. 4. 1.}
 xus.

^d *Thesci* radix gustu amara est, tusa aluum purgat. ^{d. h. 7. 11}

^e *Testiculus*. Humani uerò corporis ultra illa, quæ ^{e. h. 9. 19.}
 sanitatem, morbos, mortemq; spectent, alia quoq;
 herbas asserre suis uiribus posse affirmant, ut puta ge-
 nerandi seminis facultatem, atq; sterilitatem, & quas
 dam ex eodem facere utrunq; ualere, sicut qui *testicu-*
lus appellatus est: cum enim gemini sint alter magnus,
 alter autem paruus; magnum efficacem ad coitum da-
 tum è lacte caprino tradunt, minorem uerò obesse, ac
 inhibere: habet folium *Lascri*, uerum leuius, atque
 minus, Caulem simillimum spinæ, quam *pirum* uocât,
 mirum ergo (ut dictum est) ab una, eademque natu-
 ra diuersitatem tantum uirium proficisci: nam uim eius
 modi esse duplicem absurdum putari minime debet. tum
 enim alij quidam, tum *Aristophilus* pharmacopola
 plantaicus uires quasdam compertas se habere dice-
 bat, partim ut quis magis coire ualeat, partim ut ni-
 hil penitus ualeat, id quoq; prorogare plus, minusue
 temporis posse, seu bimensē, aut trimensē, qua qui-
 dem herba uel ad temperandos, castigandosq; adole-
 scentes aliquando uti aiebant.

Tilia

EST THE OPORI DE PLANTIS.

- a. h. d. 3. ^a *Indid cortice tenui constat, ut Laurus, & flexibi*
b. h. 1. 15. *lis est. b uiret perpetuo. c non nisi in manibus nasci*
c. h. 3. 4. ^d *tura uorum paulo ante equinoctium germinat, & fru*
d. h. 3. 6. *tum ingustabilem cunctis animalibus gignit, sicut etia*
e. c. 6. 18. *buxus. (c addit) frondem dulcem, & gustabilem. f ha*
f. h. 3. 7. *becuonem quod amendum uocat, sicut abies, casta*
g. h. 3. 13. *nea, & picea, ut nux auellana, & cortice leuiss, & co*
lores, & asitudinesq, biae & araso similis est, qua prae
pterea ex eo conficiunt, sicut etiam e corticibus & a
h. h. 4. 6. *rasu uerum Septentrionem uersus nihil affari dignu*
idem c. 2. 4. *narratum, praeter communes suas arbores, quae ex loca*
frigida amant, & apud nos quoq, reperiuntur, ac piul
nus, robur, abies, bina, castanea, Tilia, & ralis
i. h. 4. 9. *quae similes. ac Tilia aquis gaudet, & usq, adde, uer*
radice, & euadit tantum aliquid in aqua, & reliquum
l. h. 4. 18. *tantum corpus extra patefit, & cortex Tilia dicitur abies*
idem c. 3. 23. *non aliter & cerasa, & alii, ex quo fumes fiunt, in com*
l. h. 5. 1. *deur uero aliquando post messem, aliquando post uin*
m. h. 5. 4. *damiam, & ardetur. Est autem Tilia in ex, carum*
idem fere h. *5. 6. nosas praecipue mollis, nec non & calidissima eadem est,*
idem c. 1. *scinditur, indicium, quod aciem ferri maxime hebetat,*
ultimo. *n. h. 5. 7. zindum in cuiusq, sui caloris per laxat. K erum ope*
c. h. 5. 8. *ribus facili, pro sua mollitie, & foris nauium longa*
rum, et arcarum, mensuramq, fabrica expetenda est.
p. h. 3. 10 *Pueru quaedam mas, quaedam femina, distant inter*
se, tum materie, tum totius corporis forma, & quod

altera fructifera, altera sterilis: nam materies maridua
 ra, fletia, nodosior, spinosiorq; foemine candidior,
 et cortex maris crassior, detractusq; inflexibilis pra-
 pter duritiam est; foemine candidior, flexibiliorq; ex
 quo eunas facilius. Item foeminae odoratiores et mas-
 sterilis, nullaq; flore est; foemina et florem, et fru-
 ctum gignit. flos talisculo insectis praeter folij pedicu-
 lum, et amicumq; futurum, pediculo altero annexus, ut
 ralis dum in taliscolo est, deorsum autem leviter flans,
 floret cum urbanis, fructus oblongus, orbiculatus, ma-
 gitudine fabae, similitudine hederacei, quinque angulis,
 utriusque nervi eminentibus, inque acutum cum sese con-
 trahentibus patribus, quod scilicet manifestum est,
 minus insectus autem confusior constat cum ille manifestus
 his scabitur, parvula quaedam, ac praetenuia semina,
 quanta atriplex emittit, solum et cortex quilibet, sua-
 uiaq; solum forma hederaceum, nisi quaedam angulum
 acutius rotundatur, et quancumque uerum pediculi
 curvatus, tamen de medio in acutius coraculum praeten-
 dit, seq; prolixius protrahit, verisum in orbem leviter
 atque secretum. Medullam exiguam materies conti-
 net, nec multo reliquo molliore corpore, nam et re-
 quum ligni molle est. uerum uero folia a stinis folijs
 ita, sicut olea et ulmus, sed tantus in Tilia patet haec
 enim ampliora, candidioraq; folia gerit
 Tribulum in semine tanto factis segetibus, si subno-
 uentur

d. c. 2. 16.

b. 3. 1.

b. 3. 2.

uenerunt

THEPHR. DE PLANTIS.

a. h. 4. 11² uentur emergere aiunt .³ nec omnibus locis Tribulus
 erumpit ; sed palustribus fluminum tantum : altitudine
 cum profundissima quinquorum cubitorum, aut paulo pro
 fundiore, ut in Strymone fluuio , &mersus in aquam,
 pronus ad inum uergit, folio amplo ad effigiem ulmei,
 pediculo admodum longo caule parte summa quidem
 crassiori , unde folia , fructusq; dependent ; inferna au
 tem graciliori , continuè usq; ad radicem capillamenta
 quædam indidem exorta gerente , quæ maxima ex par
 te aduersa inter se congruunt , nonnulla etiam discre
 pant , subtus ab radice ampla exeunt , superiora assidue
 ad minus , minusq; procedunt , ut postrema omni
 no exigua sint , & differentia magna ab radice ad cau
 lem exuliet , pleraq; lateralita germina insurgant, quip
 pe terna, quaternaq; ; quorum maximum assidue , quod
 ab radice proprius absit, tum quod post id sequitur, et
 reliqua deinceps pro ratione : Germen ipsum , quod la
 tere promitur , uelut caulis alter est, primo quidè gra
 cilior , sed folio, fructuq; similis , fructus niger durus
 què uehementèr : radicem quantam , qualemq; habeat,
 quærendum . Talis natura Tribuli est, Nascitur se
 mine decidente , germenq; in uere suum emittit: radi
 cem alij annuam, alij diuturniorem affirmant , & cau
 lem ex ea oriri .^b Verum iuxta folium aculeatum, alte
 ro quoq; folio conditur, constat uel semine aculeigerū,
 a. h. 7. 8. habet enim in semine aculeum^c Tribulus inter spinosas
 herbas

herbas reponitur. ^a Et hoc peculiare est. Vtrum etus ^{a. b. 6. 32}
 duo sunt genera: Vnus enim folio ciceris exit, alter
 spinosus foliatus constat ambo terrent, atq; multifidi
 sunt, serius germinat, qui spinosis foliis est, & apud
 septa uillarum is solet erumpere: semen præcoquis, se-
 samæ uicinum, serotini rotundum, nigricans. septum
 in Siliqua: atq; ea quidem, quæ folio quasi orbantur,
 spinamque gerunt, hisce ferè constare animadu-
 erimus.

^b Tripolium, quod Hesiodo, & Musæo auctoribus ^{b. h. 9. 112}
 bus ad omnem rem seriam, magniq; faciendam peruti-
 le prædicatur; quamobrem id noctu effodiunt taberna-
 culo structo, & ad famam, existimationemq; bonam
 non minus, quinimo magis ualere putatum est: Nec
 non & Anthirrizum appellatum utilem ad gloriam
 tradidere, hic lappæ similis est, radice minima, & fe-
 rè nulla subnititur: fructum tanquam nares uituli præ-
 rit, hoc perunclos gratiam, uitæq; gloriam consequi
 creditur.

^c Terebinthus. in monte Olympo prouenit, & per ^{c. h. 1. 15.}
 petuo uiuet. ^d & montibus propriè nascitur. ^{d. h. 3. 4.} semen ^{e. h. 3. 6.}
 reddit circa tritici messem, aut paulo serius. ^{f. h. 4. 19.} Scissio-
 ne nihil offenditur, sicut omnia, ex quibus resina colligi
 potest, ut abies, & terebinthus: harum enim uul-
 neratio, ulceratioq; in profundo, quippe ex infecundis
 fecundæ, & ex pauciferis multiferæ redduntur. ^{g. h. 3. 15} Te

rebinthorum alia mascula, alia foemina, mascula sterilis est, ob id sexui maris adoptatur. Foeminarum alia fructum protinus ruffum promit magnitudine lentis, qui concoqui nequit. alia uiridem editum, ruffum postmodum tingit, & cum uite maturescentem nigrū nouissime facit, magnitudine fabæ resinosum, & sulfurosum. Circa Idam, & Macedoniam breuis, fruticosa, contortaq; nascitur, & apud Damascum Syriae magna, copiosa, decoraq;: montem enim quendam terrebinthis refertum, ut nihil aliud habeat, referunt. Materies ei lenta, radices ualidae in profundo, atq; in totum incorrupta, hæc arbos habetur, flos oleæ, uerum colore ruffo, folia circa unum pediculum, pleraq; specie laurinarum coniugatim quemadmodum Sorbo; quodq; parte postrema acuminet, impar exit, uerum minus angulata, quam sorbo, ambituq; laurino similiora, & pingua cum uniuerso fructu: fert & ad noctis similitudinem quædam concaua, ut ulmus; quibus bestiolæ tanquam culices innascuntur. Fit in his resinosum quid, lentumquæ, sed resina tamen non hinc legitur, sed à ligno fructus resinæ copiam non mittit, sed manibus tantum adhæret: & si non lauatur, postquam collectus est, inter se cohaerescit: cum uerò lauatur, cædidus, probeq; maturus niger subsidit. ² uerum nigra admodum, stissaq; Therebinthus est, & quidem Syriae uel Ebena nigriorem ipsam esse affirmant, et capitulos

los quoq; pugnorum ex ea fieri, & pocula tericlea tor-
nari, quæ à fictilibus secernt non possint, uerum cor tã-
tum accipi, & perungi materiem oportere uolunt. Sic
enim, & meliorem, & nigriorem effici posse. ^a est au- ^{d. h. 1. 8.}
tem Terebinthus non nisi fructu, resinaq; utilis. ^b ue- ^{b. c. 2. 23.}
rum hoc mirabilius aliquãdo terebinthum in olea uisum
esse. ^c ferunt uerò & terebinthum haberi India, ut ^{c. h. 4. 5.}
alij similem terebintho; cui folia, & rami, & reli-
qua omnia terebintho similia. Fructus autem diuersus:
similis enim amygdalis; Nam & in Bactris Terebin-
thum hanc esse, ferreq; nuces amygdalarum magnitudi-
ne, quoniam non magnas, sed uisu similes, & suauita-
te amygdalis præstantiores; Et ideo loci illius homi-
nes his potius uti.

^d Trionum æstiuus scribitur, ut milium, panicum, & ^{d. h. 8. 1.}
Sesamum. ^e Caulis ferulaceus potius est, ut sesamæ, ^{idē c. 4. 16.}
quæ folij constāt leguminum, & circa ipsum semen flo- ^{e. h. 8. 3.}
sculum habent. ^f Imbrem post saturationem uentre, omni- ^{f. h. 8. 5.}
bus prodest, exceptis, quæ officii potius apta sint, ut
faba inter æstiuæ, sesamæ, & cumino, & triono. ^g Vc ^{g. h. 8. 7.}
rum Trionum sesamæ simile constat, & pinguiuscu-
lum est.

^h Triticum radicem numerosam habet. ⁱ & semen in ^{h. h. 1. 9.}
folliculo ex annuis fert, ueluti milium: habet enim mem- ^{i. h. 1. 18.}
branam quandam, quam caro fructus obducit. ^k uerum ^{k. h. 2. 3.}
quidam ex ordeo triticum, & ex tritico ordeum gignit,

I i ii eodemq;

- eodemq; fundo id fieri aiunt; sed hæc pro fabulosis qui
 a. h. 2. 5. busdam accipies. ^a uerum in lolium transit, sed triticū
 Idē c. 2. 21. syluestre, & ordcum, culta, & mitigata per tempo-
 c. 4. 1. 6. ris tantundem mutantur, & hæc fieri mutatione loci,
 b. h. 3. 1. culturaq; uidentur. ^b mature uerò scribitur, sicut ordcum.
 Idē 8. 6. et (& sicco solo committitur) & die plurimum septimo
 c. 4. 8. exeunt, sed magis ordcum festinat. ^d at ex utroq; effun-
 c. h. 8. 6. dunt, quippe, quæ parte ima, crassaq; radicem tenui su-
 d. h. 8. 2. perna, herbam propellant. Fit tamen unum, atq; con-
 Idē c. 4. 8. tinuum ex ambobus, radice, & caule, exeunt uerò
 uno folio, & permultis innituntur radicibus, quæ de
 causa numeroso ramo, numerosoq; caule omnia se attol-
 lunt, folliculo uerò absoluta, quarto, aut quinto die
 i. h. 3. 3. florere incipiunt. ^a postquam uero defloruere crassan-
 tur, perficiunturq; cum plurimum infra dies quadra-
 ginta. at in Eegypto septimo mense triticum metitur.
 f. h. 8. 4. Vide Ordcum. ^f uerum inter frumentacea triticum an-
 gustiori folio constat, & eius plura genera notantur,
 cognomina ex locis sortita, ut Africum, Ponticum,
 Thracium, Assyrium Aegyptium, Siculum, quæ et
 colore, & magnitudine, & specie, & proprietate in-
 ter se differunt. Quædam uel aliunde cognomina sor-
 tiantur pro suis uiribus, tum alijs, tum uel maxime,
 quæ ad cibum pertineant, ut Cachryas, Stlegnis, ale-
 xandrinus: quorum omnium differentias, in supradir-
 ctis colligere licet. Nec uerò ab re fuerit, si illa quoq;

pro differentijs captes, & aliud præcox, aliud serum:
 & aliud actu amplum, multumq; reddens, aliud ietur-
 num quoddam, parumq; referens: & aliud siccam grā
 diorem effundens, aliud paruam; & aliud diu in folli-
 culo manens: aliud aptum breui ab solui, ut Africum,
 & aliud culmo tenui constans, aliud crasso, quod etiā
 ipsum africo datum est. Crasso tamen & Cachrydias
 dictū consistit. Itē aliud tunicis prauis, aliud multis ue-
 stitur, ut Tracium, et aliud unicalamum, aliud multicā-
 lamū, et magis, minusq;. Adde etiā Siquid aliud bis,
 aut prædictis ratione uiriū proximū sit: Eiusmodi nāq;
 differentiæ naturaliores profectō appareant, quibus
 & trimestrium annumerari genus par est; & bime-
 strium, & si quid intra pauciores dies ualeat consu-
 mari: & in Euboea genus quoddam intra quadragin-
 ta dies crassari, perficiq; posse affirmant: idemq; fir-
 mum esse, ac ponderosum, nec modo trimestris leue.
 Quamobrem famulis id præberi inquiunt; etenim nec
 multum in hoc furfuris esse uolunt. Igitur genus id celer-
 rimum quidem ad consumationem, sed inuentu rarissi-
 mum est. Et bimestria uerō quædam habentur, quæ ex
 Sicilia, & in Achaïam aduecta sunt: sed hæc pau-
 cum reddunt, parumq; fecunda habentur, quanquam
 cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia
 quædam genera in Euboea, & præcipuè apud Cart-
 stum. Trimestria uerō permulta, & ubiq; habentur:

Leuia

THEOPHR. DE PLANTIS.

*Leuita hæc, & parum facunda, & unicalama sunt. atq; in totum infirma. Leuissimum igitur triticum quo ad simplici ratione agere licet, ponticum est: ponderosius ex his, quæ in Græciam aduehi solent, siculum datur. Sed eo ponderosius quod Boæotia fert. Indicum asserunt, quod Athletæ, qui Boæotia ternos semis sextarios uix possint consumere, cum Athenis fuerint, facile quina consumunt: leue satis, & quod in Laconio agro conficitur. Horum igitur causa in terris, cœloq; intelligi debet. Nam & Asiæ ultra Bactra quodam in loco adeo grande frumentum fieri tradunt, ut nucleis oliuæ suæ æquiparent magnitudine grana singula; in Pissotis autem dictis adeo firmum nasci affirmant, ut si quis plus comederit, disrumpatur necesse sit, & Macedonum ita plerosq; interijisse aiunt. Absurdum sanè, & leuitati trimestrium absonum, quod in Pontico eue-
rit: Vernum enim durum admodum est; Hybernium au-
tem molle: leuitate enim molle plurimum differt.² Discernere autem & semina solent, quid scilicet cuiq; com-
petat agro, hybernis etenim locis triticum potius datur quàm ordeum, atq; in totum frumentum potius, quàm legumen. Ad plenum inculta, & longo tempore post proficissa, tritico deputantur: Id enim melius quàm ordeum illa ferunt. Tolerat & frequentiam imbrium triticum magis, quàm ordeum, & fertilius segete minus stercoreata perficitur. pari modo & tritici ratio,
quod*

quod cui conueniat habetur; exempli gratia, quod frugali & pingui, quod ieiuno, & gracili. & de reliquis pari ratione animaduertere solent. ^{a. h. 2. 17.} Vide quæ dicat in ordeo. uerum cum à principio exiguo multi prouenerint caules, fructum quoq; abunde præfundi ratio est, sicut & in ordet, atq; tritici genere, cum ex uno plures culmi prodierint, sic enim plures spicas emergi necesse est. ^{b. c. 3. 26.} at solo pluuiò, atq; frigido conueniunt ad tritici pariter, & ordei, atq; cæterorum frumentorum fructificationem, soluta enim hæc sunt. ^{c. c. 3. 27.} erugo quædam putredo est, nec putridum esse quicquam potest sine alio calore, ^{idem 4. 15.} Triticum plenilunijs potissimo eruginem capit, ratio in calore est, quo etiam noctu luna putrefacere potest. ^{d. c. 4. 2.} durat uerò triticum magis ordeo, & leguminibus, quia calidius sit, & tunicis pluribus tegatur; Ordeum enim nudum propemodum est. ^{e. c. 4. 14.} at triticum, atq; ordeum etiam post florem, si adhuc humida, tenellaquæ afflatu uehementur uexentur, facile pereunt. E ducitur enim quod in his tenuissimum est, & conflata inter se euanescent, cum euauerint pluuiæ sequuta ordeo nocet, tritico prodest: & hoc propter debilitatem ordet, nã triticum robustius est, cum multis tegatur tunicis, ordeum penè nudum est. ^{f. c. 4. 16.} singula pro suo humore animal creant, ceu triticum, atq; ordeum. ^{g. c. 4. 15.} Euenit uerò ut triticum bestiolas ita gignat, quia dulcius quam ordeum est; qua de causa palca quoque

THEPHR. DE PLANTIS.

4. c. 4. 17. què huius suauior est. ^a puluerulentum triticum celerius putrescit, & quod in domicilijs opere tectorio leui gatis conditum est celerius, quoniam id caloris plus sentiat, puluis enim calidus est, ut pote siccus, & illi mentum calcis calorem susceptum utiq; seruat, nam et cum uniuersum, altumq; aceruatum est, putret: Sic enim plus caloris exoritur. ^b sunt autè quædam, quæ spõte simul proueniunt, ceu auena, & lolium tritico, atq;
6. c. 6. 8. ordeo. ^c quæ quasi insipida sunt à principio, & eorum perfectio ab ea ipsa qualitate accedit, antequàm plures fiant mutationes. ^d trimestre triticum solo tenui melius sit: Alimentum enim subministrari modicum eo potest, hoc est leue leui. Africum & draconias appellatum, & strangias & selenusium latum exiguum agrum. hæc enim uberius succos hauriunt. Argumẽto calamus est, quem crassum gerunt. Ad summam quodcunq; huiusmodi sit solo frugali aptè committitur. At si aliquod genus tunicis multis cõtegatur, ceu thracium, hoc solo hyberno conuenientius dabitur: frigus enim huic nihil officere potest; rarum, solutumq; ceu canchrydias uocitatum, agro pluio serendum profectò est, quippe cum alimenti copiam id quoq; desiderat: quamobrem, & culmo crasso exurgit.
11. h. 1. 8. ^e Típha, & palustrium, aut lacustrium nonnulla insepia pariter atq; æqualia conficiuntur, ut iuncus.
- f. h. 1. 9. ^f radicem numerosum habet, ut triticum & ordeum.

^a enodis uerò est, ut iuncus, & gladiolus. ^b uerum si ti-
 pba, semenq; pista serantur, in triticum mutari solent, ^{4. h. 1. 13.}
 idq; non protinus, sed anno tertio. ^{6. h. 2. 4.} in lacu uero Or-
 chomenio etiam tipha nascitur, & hoc peculiare maxi-
 me, quia partim folio caret, partim quia non ut reli-
 qua radice numerosa adberet, & an utroq; loco nasca-
 tur, idest terra, & aqua, ambigitur, tamen pars te-
 nera tiphae ab radicibus proxima est, ut quam pueri
 paruuli potissimo mandunt, & phlei, & butomi. ^{idem fere 8.} in-
 ter frumentacea etiam numeratur, & mature scriitur. ^{8.}
^c & ex utroq; extremo germinat, ut triticum, et ordeu, ^{c. h. 4. 11.}
 & ad summam frumentacea omnia. ^{d. h. 8. 1.} Tipha postquam
 defloruerit crassatur, perficiturq; cum plurimum in-
 tra dies quadraginta, ut parimodo de ordeo, & triti-
 co diximus. ^{e. h. 8. 2.} ^{f. h. 8. 3.} multiplici folliculo uerò includitur, ut sili-
 go, & huiusmodi. ^{g. h. 8. 4.} Sunt uerò duo illa semen, & tipha
 perquam similia tritico. ^{h. h. 8. 9.} Sed triticum, quod ex tipha
 & semine fit, paratu quodam, atq; arte consistit, sicut
 etiam ea, quae praemacerata fructus afferunt dulcio-
 res, uerum non solum Tipha in triticum transit, sed
 etiam triticum in tipham. ^{i. c. 4. 6.} ^{idem c. 5. 7.}

^k Tiphium radice in caput excrefcit, & nepa etiam
 appellatur. ^{k. c. 1. 10.}

^l Trisaginis folia adrupta, & uulnera in oleo tri-
 ta ualent, & ad depascentia ulcera; fructus bilem ex-
 trahit, & oculis quoq; beneficus est; folium ad albu-
 gines ^{l. h. 9. 10.}

gines tritum in oleo prodest. Habet hæc herba folia quercus, & statura uix palmum excedit, & odorata, atq; suauis est; Sed partes quidem omnes herbae eiusdem minimè ad idem utiles fore haud quicquam absurdum fortasse appareat. Radices uerò eiusdem partem unam superius, alteram inferius purgare mirabilis est, ut *Thapsia*, & *roris marini*.

a. h. 9. 10. ^a Tuberis terræ radix ad exalationes inflammationum ualeat, & ad menstrua, & ad ulcera ex melle, succus ad caput purgandum illitus, & ad ebrietatem, si sparsum in uino potui des: radix etiam ad partuum celeritatem appensa benefica est, et ad amores cum eam suffoderint, uino deinde subigunt, inque pastillos digerunt, sicuti fecis uini, qua maculae absterguntur.

b. h. 1. 2. ^b Tuber cortice, neruo, & uena caret, ut *fungus*.
c. h. 1 9. ^c radice penitus caret.

d. h. 1. 15 ^d *Thuia* ex syluestribus perpetuo uiuet. ^e & tardissime germinat. ^f Nasceitur montium cacuminibus, & locis algentibus, & excelsa quidem est. ^g *Thuium*, quod *Thuia* ab alijs appellatur, nascitur apud *Ammonis* fanum, atq; in *Cyrensi* agro, forma *cupresso* similis, cum ramis, tum folijs, caudice, fructuq;: uel potius ceu *cupressus syluestris*, copiosam, uel ubi urbs hoc tempore est, comperiri affirmant; atq; etiam memorant conignationes quasdam uetustissimas *thuiæ*. perdurat enim materies hæc incorrupta omnino. Radice huius arboris

ris nihil crispus, eaq; præciosa opera conficiunt.

^a Turdaria floret, ut aphaca, & cicorea, & plū^a. h. 7. 10
tago.

^b Thus in Arabia, Syria, India nascitur, ut mir- b. h. 4. 6.
rha, Cassia, Laser, Cinnamomum, & alia huiusmo- c. h. 9. 2.
di, ^c uerum thus atq; mirrham sub cane, feruentiss- d. h. 9. 3.
misq; diebus incidi reserunt. ^d & tam sponte, quam in- e. h. 9. 4.
cisura prodire posse, ^e arborem non magnam, sed qui-
nis ferè cubitis attolli, permultosq; ramos gerere ferūt,
folium piri, nisi quod multominus, colore penè herbi-
dum modo rutæ, corticem leuem omni ex parte lauri
modo, uide Mirrham. ^f Thus etiam contra cicutam f. h. 9. 22.
auxiliatur, ut piper.

^g Thymi succus acrimoniã quandã sortitur, ut Satu g. h. 1. 19.
reia. ^h Et quamuis semen nullum conspectum habeat, h. h. 3. 2.
tamen ex his germen emittit. ⁱ uerum parte pluuiæ ca- i. h. 4. 4.
rente plurimum nascitur, et alia peculiaris naturæ com-
plura, atq; etiam Lepus, & Dama, & Struthus ist-
hic gignitur, & alia ex genere bestiarum. ^k insinu au- k. h. 4. 8. 7.
tem Heroo cognominato, ad quem descendunt Aegi-
ptij, Laurus est, & olca, & Thymum, uerum non
utridia, sed lapidis specie parte à mari eminente, simi-
lia tamen uiridibus tam folijs, quàm germinibus. Co-
los quoq; floris in thymo, tanquam non perfectè florue-
rit, liquido deprehenditur. (Dicit etiam nonnulla scitu
digna, uide locum.) ^l Thymi nullum semen ostendi po- l. h. 6. 22.
idem c. 1. 5.

K k ii test 4. 8.

test sed floribus quodam permiscetur modo : flores enim
 serunt , itaq; oritur thymum . Qui tamen Athenis
 deportare desiderant , quærunt atq; inueniunt . Peculiare
 tam præ ijs ipsis , quam reliquis omnibus uel ex locis
 sortiri thymum autumant . Nam quo flatus è mari
 nequeat peruenire , illic nasci , durareq; posse omnino
 negant . Est & candidum , & nigrum , & sero id ad
 modum floret , nam circa æstiuum solstitium incipit .
 a. b. 3 1. uis medica omnis uel radice , uel ramo , uel fructu re-
 spondent ijs , quæ in gustatu quandam uehementiam
 monstrant . Quo in genere Capparis quoq; enumera-
 tur , & Laser , & rumex , & saturcia , & cuncta , &
 Thymum .

V



^a *ERI* quercus glandem dulcem producit a. b. 3. 16

^b *Vernilago* spinosa est, ut fusus agrestis b. h. 6. 3. 1

buxus asininus, carduus, pinea, & alia.

^c *& tamen si non aculeato folio constat, tamen* c. h. 6. 4.

Acani speciem gerit, senescensq; flos, in lanuginem, papum uocatam conuertitur, modo *Laurini*, *myrtini*, & ceterorum generis eiusdem. Pergit hæc ad æstatem usq; aliud parturiens, aliud florescens; semen illud humoris aliquantulum continet, aculeoq; armatur, folium cum æscit remittitur, nec quicquam amplius pungit.

^d *Vernilaginum* una candida, altera nigra, uires radi d. h. 9. 13

cum inter se distant; & ipsæ radices specie differunt: candida enim crassa, & grauitèr olens, utilis traditur ad alui profluuium, cum confecta orbiculatim modo radicis decocta est, iunco transfixa in seriem. ualet & ad interancorum animalia lata, cum passa uua comesa acetabuli mensura è uino bibitur austero, occidit & canes & sues, canes in farina ordeacea subacta cum aqua, & oleo, sues cum brassica; Et si hominem ægre scentem experiri uolueris, an uiuere possit lauandum ea radice triduo iubent: hoc enim si tolerauerit, morturum nequaquam existimant. Nascitur æquè omnibus locis, folio cardui, uerum ampliori, & terræ proximo, capite magno acano simili. Vnde quidem ac-

THEOPHR. DE PLANTIS.

num cam uocarunt . Nigra folio constat modo cardui præterquam quod minori , leuioriꝑ . Tota autem herba umbraculi speciem representat , radice crassa , & nigra extrinsecus , subflaua intrinsecus nititur : loca gelida , humidaꝑ amat , lepram , & uutiliginè trita in aceto , & ramentis illita , necnon & canes occidere potest .
 4. h.9.14. ^a uernilago nigra quadraginta annis utilis est .
 1. h.9.12 ^b Vesicariarum duo sunt genera , alterum somniferum radice rubra , sanguinis modo , sed candida cum siccescit fructu rubriore . grano iligneo , folio lactariæ simili , aut malo dulci , sed piloso : huius corticem radicis tudentes admodum , & in uino meraculo madefaci-
 11.9. cientes dant , atq; ita dormire faciunt . nascitur rupibus , & faucibus , atq; sepulchris . Alterum genus in sanire facit , id alij bryorem uocant , alij perissum , constat radice candida , & longa ad cubitum , atq; caua . Dabitur eius radicis dragmæ pondus , ut quis ludat ,
 1dem: h.9. 21. seq; pulcherrimum putet , placuerit . At si magis insaniat uis dragmis duabus opus est , sin autem insania solui malueris , tres dabis , et quatuor si interimendū sit . Habet folium crucæ proximum , maius tamen , caulem longitudine ferè quatuor cubitorum , caput gethyi , sed maius , atq; pilosius , nec fructui Platani absimile constat .
 1. h.9.14. ^c Nasquitur etiam apud Arcades utrunq; Vesicariæ genus , quod fructum puniceum fert , & quod nigrum oritur .

Vinea

Vinca peruinca folia minora habet Euonymo nascent- ^{a. h. 3. 18.}
te in Lesbo in monte Orcynio, cui nomen Ordyno.

^b *Vincum, quod Aegyptij uocant, fructum sub* ^{b. h. 1. 1.}
terram parit, ut Arachidua.

^c *Vencna in montibus altissimis nascuntur.* ^{d. & car c. c. 6. 20.}
nosfa sunt omnia, & quo sicctora, eò ualentiora sunt. ^{d. c. 6. 17.}

^e *uerum radices uenenoflores, potentioresq; sunt.* ^{c. c. 6. 18.}

^f *Ventosis locis, & frigidis, & rara consitione* ^{ar f. c. 1. 3.}
borea minores, sed spissiores, siccioresq; ueniunt. Af-
flatus enim & frigora, & omnino aer ipse occurrens
constipat materiem, atque coagit: Vnde contractio-
res quoq; redduntur, neque molem grandem possunt ca-
pescere; Idem etiam sequitur cum consito amplo dispo-
sita interuallo est. Sic enim spissiores, & in profun-
dum auctiores consistunt: contra uero, cum breui in-
teruallo consitum sit. At locis serenis, & à uen-
tis silentibus consitioneq; breui interuallo disposita,
arbores magnæ quidem exurgunt, sed raræ corpore,
atq; humidæ.

^g *Vere tempus omnium uiuacissimum, fecundissi-* ^{g. c. 1. 14.}
munq; ut pote quod humidum, calidumq; natura sit.

Aestas contraria quasi Veri accidit: sicca enim &
feruentissima, præcipue cum Sydus exoritur. Item au-
tumnus non solum siccius, sed etiam frigidus sequitur,
aere iam immutato temporis hyberni accessu. Est autè
et frigiditas, et siccitas germinationi omnino contraria.

Vere

THEPHR. DE PLANTIS.

- a. c. 1. 27. ^a Vere illa calida tam sensu quam ratione percipi possunt, quæ pinguis, acris, odorataq; sunt. Hec. n. caliditatem proculdubio sortita uidentur.
- b. c. 6. 26. ^b Vetusstæ plantæ odoratiore sunt, quã nouellæ.
- c. h. 1. 15. ^c Viola perpetuo uiuet, ut rosa, abrotanum, Serpillum, & alia. ^d & ex auulsione nascitur. ^e & ad usum coronarium utilis. ^f & tantummodo flos. ^g qui semine exit. ^h uerum nulla parte bene olent uiola, & rosa, nisi flore. ⁱ Cæterum uiolæ flores suauiores distantes, quã proximi sentiuntur. Ratio quod ad locum remotiorem odor purus, syncerusq; deferatur.
- k. h. 6. ult. timo. ^k Viola alba florum prima se ostendit, emicat ubi cælum clementius statim, etiam nondum hyeme exacta, ubi uerò immitius postea tempora hæc generationum notantur. Viola alba uitæ anni maximè tres, senescensq; diminuitur, candidioresq; assidue flores fert.
- l. h. 7. 9. ^l uerum in caule tantum foliata est alba uiola. ^m & inter bulbosa eam notare licet. uerum locis sitientibus, atq; tenuibus odorata consistit, ubi cælum uehementer feruidum est, minimè, quia extra modum siccatur.
- m. h. 7. 13. ^m Viola nigra in flore alterum florem insidentem medium gerit, ut rosa, & lilium. ⁿ uerum flos tantum usui est, discerni uerò à floribus nulla parte possunt uiolæ nigra, hæc nanq; differentiam nullam habere uidentur, quãquam alba nimirum habeant, colorem enim earum uariari liquido patet, atq; etiam magis liliorum.

Si

Si uiola nigra distat ab alba tum aliorum quorundam, tum plantæ, quod latifolia, humilifolia, carnifolia extat, & radice multa cohaeret. ^a *uerum uiola nigra per annum durat, si cultus adhibeatur.* ^b *& assidue florere uidetur, sicut etiam oenantha, & aliae quæ autem debilia sunt, celeriter euanescent, ut uiolæ tam nigrae, quam candidæ, amaræ, maleq; olidae in uetustate redduntur: nec sicuti rosæ suum odorem etiam sicca conseruant, dum deficient penitus, uirides tamen à longè redolent, sicca non nisi proxime admotæ, uide rosam.* ^d *Viola nigra, & crocum non multum alimentum desiderat, & satis ex se habent, sunt enim capitata.* ^d

Viola flammea uocata uere floret, Syluestris dumtaxat, & plurimum durat. ^c *h. 6. 7.*

Vipera ubi intra se oua peperit, mox animalia gignit, uerum eas cerui edunt, quibus cætera moriuntur: tametsi multo maiora, robustioraq; sint. ^h *at cum allium comederunt, rutam assumunt, & ita sibi ipsis medentur.* ^{f. h. 7. 14. g. c. 4. 10. h. c. 6. 4.}

Viti flora durat, ueluti uiola nigra, & ea quoque addicta floribus est, naturaq; herbacea constat. ^{i. h. 6. 7.}

Viscum in alijs arboribus prouenit, & in ilice etiam. ^m *mirandum autem, atq; absurdum maxime omnium appareat, quod quædam ex seminum, plantarumq; numero pululare in terra nequeunt, ut Viscum, Stelis, atq; hypbear. Stelis Euboensium uocabulum*

est; *Hyphear Arcadum*: *Viscum* commune; hæc naturam eandem omnia sortiri quidam affirmant, sed ea de causa differre uideri, quia in diuersis plantis proueniunt. *Hyphear* enim, & *Stelis* in abiete, pinoq; nascuntur: *Viscum* in quercu, *Terebintho*, atq; alijs pluribus. Alij differre ista inter se uolunt, argumentūq; non ineptè illud adducunt, Siquidem uere narrant, quod non solum in congeneribus quodq; illorū erumpat. exempli gratia, in abiete, pinoq; uerum etiam in eadem arbore plura diuersis partibus exeant, ut hinc *Stelis*, uel *uiscum*, inde *hyphear*. Item non modo formas, sed etiam fructus dissimiles hæc ferre confirmant. Atqui id quidem obseruari ubiq; par est, etiam in agris, qui inter se plurimum discrepant. *Viscum* enim aliud folio esse perpetuo, aliud deciduo, haud quamquam absurdum est: siquidem aliud utrentibus semper arboribus, aliud frondem amittentibus insidet. sit enim ut his careat alimento, ut illis habeat quantum abunde sit. Causa enim perpetuæ, deciduæ uè frondis hæc est: sed hoc utro tandem modo se habeat, nil refert ad id, quod in præsentia quaerimus. nasci autem humi nulla penitus ratione ualere absurdum certè appareat, præsertim cum tam multum, ac ualidum fructū pariat. proximum tamē quoddā insitionibus, atq; inoculationibus, euentre appareat. Alimentum paratus, & quasi confectū, percoctūq; propemodū capitur, quod etiam *uiscum* uide-

tur exigere, ad quod eiusmodi alimentum desideret, imbecille natura est, hoc autem neq; de uisco, neq; de slide, neq; de hypheare dicendum uidetur. Hæc enim ualida, & nutrire idonea esse putantur, nam & boves, & iumenta hoc pabulo post messem aluntur, atq; pinguescunt, adhuc fructus uisct, quam bonis sit uiribus, sua planta latissime indicat, quod si non infirma, sed tam ualida sint, cur non per se pululant, atq; proueniunt. Quippe quæ uiribus ualent terram ut sua disungere, seq; abscondere possunt, quod Lupinum etiam facit. Solutio autem huius quæstionis talis est, quod his datum à natura tantum est, ut non nisi alijs ualeant prouenire, sicut & animalia quædam, non nisi in animalibus possunt creari, ceu quæ in conchis nascuntur, neq; in cæteris actis præstare animalibus pabulum. uerum origo latet eorum, Plantarum autem eiusmodi generatio patet. Initium uero à pastu autem exoriri uelut accidens ad generationem animaduertimus, quod in alijs euenit. pica enim, & aliæ quædam aues, glandes reponentes, obruunt terra. Quippe uisco detracto, confectoq; in alius, quod frigidissimum est, semen cum excremento purum dimittitur, & facta mutatione aliqua in arbore stercoreis causa, pullulat, atq; erumpit. Vires autem bonas concepit ratio est, cum pabuli copia, tum uel maxime ratione fortassis naturæ propriæ. Validiora tamen illa esse, quæ in abiete, uel pino nascantur.

de c. 2. 24.
idem. 5. 4.

- rur, consentaneum est. plus enim alimenti, & idem
 a. c. 5. 22. pinguius eiusmodi arbores subministrant. ^a uerum uis-
 sum quoq; , & omnino, quæ aliquam plantam pro sede
 capiunt, interimere possunt, ut hedera, & huiusmodi.
 b. h. 9. 20 ^b Vinum apud Heracliam Arcadiæ, ut ferunt, fit,
 quod potum uiros insanos agit, mulieres steriles reddit.
 Achaia apud Cabyntam maximè uitis quoddam ge-
 nus habetur. Culus uinum abortum facit, & ubi ca-
 nes uuam comederint, eas quoq; periclitari necesse est.
 In gustu nec uua sensum alium, quàm cæteræ uuæ fa-
 cit. nec uinum à cæteris uinis distare percipitur. In
 Troezeni agro uinum sterile qui biberint facit: apud
 Thasum uinum somnificum arte quadam conficitur, &
 aliud, quod potum uigilantissimos facit, sed eiusmodi
 uires ad corpus spectare, inq; generibus corporeis per-
 cipi manifestum est. ^c uerum uinum ex uetustate scne-
 scens, ueluti secundum naturam fuerit alteratum, ama-
 rum efficietur, quod propterea euenit, quoniam acre
 circumfuso exactum sit id, quod tenuè, ac idoneum po-
 tui fuerit: hoc enim exolescente, relinquitur, quod ter-
 renum est, atq; amarum. Sed si tanquam per uolentiã,
 & præter naturam mutatum sit, coalescit: id enim sa-
 poris contrarium esse natura uoluit: corruptio autem
 & alteratio accidere cæteris uitij solet. quod enim cor-
 rumpitur, perhumescit, & sæpenumero coalescit, ac
 uetustescit exsiccat, parte hic etiam terrena tantum
 extant.

extante . Ommino singulæ corruptiones aut rei alienæ
 admistione , aut propriæ defectu , temporis causa eue
 niunt . Pereunt uerò permistiones , alias externis ali
 quibus immistis , alias parte alia uitiata , aut modum
 excedente interna , sed fortè uerius dixerim , parte ali
 qua commota , corruptaq; , totum perire . Sic enim fru
 ctus corrumpitur , & lac , & uinum , & reliqua ge
 neris eiusdem , nec uerò minus certa in his est . ^a Succu a: 1.6.28.
 uerò expressi odores facile trahunt oleum , & uinum :
 quæ quidem res minus dari rationi posse uidetur . Cur
 enim aqua , quæ tenuissima est , omniq; odore , sapore
 uidua , & omni , sincera , & nitida , nullum potest reci
 pere odorem . Quæ autem sapida , olida , crassaq; sunt ,
 recipere possunt . Vinum tamen etiam si res odorata
 non sit iniecta , sed iuxta posita , odorem potest attrabe
 re , quod calorem in se aliquem habet . Vis enim caloris
 est , quæ attrahit . Quod cum aqua nullatenus habet
 (est enim natura frigida) nihil attrahere potest . Item
 quod suscepturum , seruaturumq; sit odorem , non tam
 tenue , simplexq; esse , quam aqua dehet . Odor enim re
 ceptus in eo delabitur , atq; effunditur , quasi fundus
 nullus sit , qui obsistere possit : sed callosius , ac densius
 esse oportet . Tale enim ad susciptendum , seruandumq;
 odorem aptissimum est , dum ad utrumque se modice
 habeat : quod quidem utrunq; uino , & oleo contin
 git . Et unguentarij uerò odores in oleo reponunt , cum
 enim

- enim alias ad usum accommodatur, tum seruare odorem maxime omnium potest: quia incommutabile permanet, aqua protinus exalat, & quasi eluit, atq; discernit. Tenuitas uero (ut diximus) inutilis est, neq; enim aer retinere odorem potest, sed transmittere tantum idoneus. ^a uerum succos nonnullos dimouendo ex propria natura, putrefaciendoq; leuiter. potari habiles faciunt, ut qui uinum ex ordeo, tritice conficiunt. Aut quod Zethum Aegyptus appellat, quorum omnium principia, uiresq; naturæ conueniunt: quæ uero utendi causa fiunt, hæc solertiæ potius, ingenioq; hominum tribuendum. Sed quæ ars, & ingentum faciat, ipsa per se existimare dignius est. ^b uerum uinū tūc maxime constans perficitur, atq; odorem capeffit, cum pars eius aquosa difflata, exaëlaq; est. Hæc igitur omnia odoratiora in uetustate efficiuntur. ^c uinum dulce, & molle caret odore, quod tenuius inter cætera est, hoc odoratius, & celerius hoc, quàm pingue, crassumq; consistit, atq; perficitur. Item unā cum odore euenit, ut fece sidente, uel segregatio humoris, partisque terrenæ, exhalatioq; sortis aquosæ efficiatur, ita ut ex his omnibus suauis illa exoriatur olentia, id est, ætenuatione, segregatione exhalatione. Nam & in ipso dolio pars uinit, quæ est iuxta fecem, minus redolet. Hæc eadem causa est, & quamobrem genus uini, quod morale uocatum est, celerius purgetur, consilietur.

quæ. Est etenim tenuius, & obiter quasi uitio mistu-
ræ immixtum. Confirmatur id etiam, quod ex tenuiori-
bus & succo probatis, spiratisq; commode odoratiора
proueniunt, ex uetustioribus, quàm nouellis. Item
quod, quæ largè olent, ac ualide, mollitiem in gusta-
tu, nullam præsentant: ut pote cum simul manere ne-
queant, odor suauis, & plenius ille, ac ualidius, quod
etiam in unguentis, incensis, coronamentis, cæterisque
odoratis euentre uidetur. Hæc etenim omnia amara
sunt, maleq; sapida, sicut amygdalæ. Et montana ue-
rò uinorum genera, odorem pleraq; obtinent, quæ du-
ra, minusq; sapore commendata existunt. his igitur om-
nibus constat aliud esse, quod faciat odoris suauitatem:
si tamen causa odoris, saporisq; modus adsit, quod ex
ambobus exultet, suauissimum est.

^a Vitis cortex ex humore, & neruo constat, folia
uerò ex humore, & carne, ^b circa agrum Elephanti-
num neq; uitibus, neq; ficis folia decidere aiunt. ^c ue-
rum uitis medullam carnosam habet, ut ficus, punica,
sambucus, & huiusmodi, radices tenues omnes, & pro
lis procreandæ sursum uersus uim obtinent. ^d At si cō-
festim ramos succidas, purgesq; excelsæ, si relinques, bre-
ues uites assurgunt. ^e folia ampla sunt, ut fici, & plata-
ni, & aliquatenus fissa, pediculus longus est. ^f Semi-
na congesta putamine aliquo, aut tunica continentur,
ut punicæ, mali piri, & fici. ^g succus uinosus. ^h flores

d. h. 1. 4.

idem h. 1. 16.

b. h. 1. 6.

c. h. 1. 9.

d. h. 1. 14.

idem c. 2. 19

c. 3. 2.

e. h. 1. 16.

f. h. 1. 18.

g. h. 1. 19

h. h. 1. 21.

lanugi

THEPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 1. 2. 2. lanuginei.^a & circa fructum ipsum producuntur. uerum genus quoddam & uitis, & punicea, fructum perficere nequit, sed florem usq; generatio tantum prouenit.^a Ex nouellis uero fructum gignit, ut ficus.^b interrim hæc sata degenerant.^c uerum uitis, quam Capneium uocant, mirabilis cernitur, nam ex nigro racemo candidum, & ex candido nigrum hæc præstat. Item aliquando absq; folijs fructum produxit.^d uiui radices autem apud parentes minime effici possunt, & statio quoque palo sit, & ut absolute loquar, olea, fico, & uiti solum campestre maxime statuunt.^e & aquam maxime uitis diligit, puluis quoq; ut nonnulla crescant, uiuantq; facere uidetur, ut uua. Quamobrem inferius sæpè excitant, nonnulli & ficos suffodiunt, ubi puluere opus sit. Megarenses etiam Peponibus, Cucumeribus, atq; cucurbitis, cum uenti anniuersarij perflant, puluerem sarculo excitant; atq; ita dulciores, mollioresq; reddunt absq; rigatione. Hoc igitur concessum in dubie habetur, sed uitam puluere conspargere, aut utlo pacto tangere, cum uua nigrescere incipit, haud quam oportere existimant; sed si unquam ita agendum sit, cum nigra omnino redditur agendum censent. Alij neq; tunc oportere aiunt, nisi quoad runcandum sit.^f germinatio ad ortum arcturi post uernum fieri solet.^g Vitis nascitur ea parte Ida, quam uocant Phalacras: est frusticosa, uirgis paruulis, & ramulis

lis cubitalibus penè exporrigitur : quibus acini latera-
les nigri adhaerent , magnitudine fabæ , dulces , qui li-
gnum uinacei modo intus continent , folium rotundum ,
indivium , paruumq; . Cæteris quoq; montibus pro-
pria quædam natura dederat , aliis arbores , alijs frutt-
ces , alijs reliquæ materiæ aliquid , sed proprietatem sin-
gulis locis inesse sæpius dictum est .^a Nascitur uero ut
tis & mari , & terra : nam & terræ proxima , & pe-
lagica est , & maiora fert folia , Sarmentâ , fructum
quæ .^b Verum si credimus (quod quidam de uitis re-
ferunt) quod radicibus particulatim detractis caudex ,
naturæq; tota similis , ac simili fera quantumuis tempo-
ris permanere queat ; hæc prorsus longeva omnium præ-
cipuè constat . Colendum autem hunc in modum , cum
uitis iam delabi uidetur , palmites admittendum , fru-
ctumq; anno capiendum . De inde altera ex parte uitis
suffodiendo radices omnes purgandum , post festucis
implendum , terramq; accumulandum : isto itaq; anno
male admodum ferre aiunt , postero melius , tertio , &
quarto stabiliri , ferreq; multas bonas uuas , ut non alio-
modo se habeat , quàm cum uigebat . Cum iterum lan-
guescere incipit , partem alteram suffodiendum , colen-
dumq; simili ablaqueationis ratione , atq; ita semper du-
rare posse affirmant ; id autem anno maxime decimo
fieri . Quæ de causa nec præcidere unquam eos debere
qui ita faciunt , sed per multas ætates caudices eosdem

- durare, ut ne meminisse quidem sit, qui seuerint. Hoc igitur expertis accipientes credere fortasse debemus.
- a. h. 4. 16. ^a uitis uerò hirculatur, quod eius præter syderationem
idem fere. c. ^b potissimum est, aut cum germina afflauerint abscissa,
11. 21. aut cum imperitia cultura fuerint laesa, aut tertio cum
b. h. 4. 17. supinum fuerint excisa. ^b quæ autem tabuere modo non
penitus perierint, citissime possunt regerminare, ita
c. h. 4. 18 ut uitis statim fructificet, sicut in Thessalia fit. ^c cor-
1dē c. 3. 23. tex uiti detrahatur, ut ceraso. ^d & caudicis fistionem to-
sed addit lerat. ^e Materies lenta, ut salicis, & propterea ex
sponte. d. h. 4. 19 his scuta facere solent. ^f Verum inter uites quidem quæ
e. h. 5. 4. minus fructificant, gemmis crebrioribus constant. So-
f. h. 5. 5. gi c. 1. 1. lidioresq; sunt. ^g summis uerò ramulis pullulare facile
b. c. 1. 3. potest. ^h sed cum auulsione radice, & ramulo proue-
niat, ligno etiam, prægrandiq; ramo exurgere non po-
tēst, quoniam partes mediæ sicca, lignosq; sunt. ⁱ ue-
rum uitem multis ante diebus persecant, ut lachryma
f. c. 1. 6. effluat, neq; putrescat, neq; uermiculetur. ^k aucta fa-
cilis est, & semine deterior prouenit, ut puncta, &
l. c. 1. 12. amygdala. ^l uerum nonnullis locis uitis, & ficus folia
non amittunt, quia nunquam his nutrimentum quantum
m. c. 1. 13 sufficiat, de est. ^m rami etiam, tam parui quàm gran-
des principia quædam uitalia habent, quæ reposita
temporis indulgentia germina pariunt, etiam si nulla in-
nitantur radice, quod præcipue in plantis patescit,
quas detractas uitibus, alijsq; componunt in delis,

Inculta

^a Inculta uitis priusquam culta germinare incipit. ^b sed omnia ferè, quibus fructus humidus, aut nudus, aut tenui intectus putamine, celeriter suos fructus perficiunt, ut uitis, ficus, & præcipuè morus. ^c sed absurdum profectò putaueris, quod inter ea, quæ generis societatem habent, animaduertimus; hoc est alia matura, alia serotina consistere, ut fici quædam, & uites & pomi & piri, & alia. ^d Vites uerò insanæ uocatæ sui generis sunt, quæ non solum germinant, sed concoquunt, & florent, & racemantur. ^e hoc uerò peculiare fisco & uitibus enuenire quidem narrant, ut cum egregiè germinant, tunc maximè fructificare dicuntur, & licet in uuis acinos minutos prospiciamus, tanquam eos natura perficere minus potuerit, tamen non minus dulcedinis his paruulis, quàm magnis illis concessit. ^f uerù imbres hyberni tempestiui uitibus etiam sunt, quibus uerò fructus diuturniores, plusq; alimenti, coctionisq; desiderantes, his seriores etiam imbres tempestiui accedunt, ut uitti, punicæ, & oleæ. ^g & pratenje solum uitis desiderat, & arenosum. ^h largam uerò copiam alimenti uitis desiderat: quia calida, laxa, humida, & fecundissima est: forsitan & ob hæc eadem fecundissima. ⁱ differentia uerò tam agri, quàm arborum per-

d. c. 1. 17.
b. c. 1. 20.

c. c. 1. 22.

d. c. 1. 11
etiam loquitur de uite
insana.
e. c. 1. 25.

f. c. 2. 3.

g. c. 3. 7.
h. c. 2. 15.

i. c. 2. 6.

Alijs enim plana, alijs montana loca magis conueniunt, & in his ipsis aliud aliis compete. Verum sim

plex illud asserere facile est, ut et præcipere solent.
 Solidas spissasq; locis sitientibus serere oportere, solu-
 tas uerò et humidas, mollioribus, atq; humectioribus:
 sic enim utrisq; alimenta modicè suggerentur: cum al-
 tera multum, altera parum desiderent. (Quomodo
 cognoscenda uites densæ, et solutæ. Vide c. i i. x y i.
 4. ferè per totum) ^a at uitis, et ficus simul benè fructifi-
 cant, quia humida sint cocturâ certè ampliorem desido-
 rant. ^b uerum licet molestissima sit ficus uitibus, tamen
 aliquando obarescunt, ubi fici maritæ sublatae fuissent.
 6. c. 2. 10. ^c uerum uitis cum humida sit, frigiditatem uehementer
 desiderat, sic enim longè melius coquitur. ^d inter eas ue-
 rò, quæ solutum fructum progenerant, sola uitis et fi-
 cus incrementum amplissimè capiunt. Uitis porrecta
 materie in quamcunq; partem deuenire facile potest,
 modo solū obtineat probum, ac fertile. Ficus autem se
 in altum attollit, et ramoso admodum corpore amplissi-
 6. c. 2. 10. mum occupat locum: uerum quædam nisi diminuantur,
 fructum percoquere nequeunt, ut uitis, quam cantha-
 ram uocitant. Qua de causa summa uuarum detrabere
 17. c. 2. 25. solent, alioquin putrescunt, et pereunt. ^f uerum ex odo-
 re uitis noxam capit, ut ex odore Lauri, atq; brassicæ,
 quod protinus in germinatione liquecit: cum enim ger-
 men propinquum lauro, uel brassicæ est, retrorsus par-
 te sua postrema flectitur, et quasi odoris uehementiâ
 fugit. Uitis nanq; olfatrix est, sicut et uinum odorem

rerum appositarum trahere aptissimum est, & magis,
 atq; celerius, quod amphoris continetur : quoniam id
 neq; multum, neq; crasse obiectum sit. Sed multa esse,
 quæ possint offendere, facile percipi potest, ut dictum
 est. ^a Verum uitis, & ficus cum humidæ sint, non mul- 4. c. 3. 6.
 tiù durare possunt. ^b Vitis laconica rigua maxime quæ 6. c. 3. 7.
 rit. ^c at cum prima fundit germina, nec quicquam moue 6. c. 3. 9.
 re uelis, cum uero tenuerit, conualueritq; amputabis su-
 periora, & quæ optima, & aptissima sunt, tantum
 relinques, amputari uero semper quotannis requirit,
 scilicet ex summa facultate augescendi, nihil enim pa-
 riter atq; uitis augescere potest. ^d Radices uero an- 4. c. 3. 11.
 nuas, & in uniuersum per summa cespitum adhaerentes
 refecari par est, ut inferiores plures, ac robustiores ef-
 ficiantur. ^e Fimum uero uitibus quadriennio post, uel 6. c. 3. 13.
 etiam longiori exacto tempore disponunt; Namq; sti-
 citius stercorentur nequeunt tolerare. ^f at Scrobes pro 6. c. 3. 18.
 moribus afflatuum præparant, & semina cum observa-
 tione ponunt eadem, ne aduersa flatibus germinet;
 frangi etenim ita necesse est, neue delapsa præter na-
 turam augerentur, uitis enim cum ex his deterior pro-
 culdubio redditur; pari modo & reliqua ratione agri
 discerni omnia debent. Vinea hunc in modum singulis
 locis disponi, & his de causis conuenit. Refecari au-
 tem plantas breui relicto palmite præstat ubiq; , ut ra-
 dices, uires incrementaq; capiant. Tum etiam magna

THEOPHR. DE PLANTIS:

- ex parte solum tetunum est, & quod alere nequeat, locis montosis & frigidis recisionem etiam uernam cauendam existimant. frigus etenim exiccat. Tempus tamen putandi ferè idem omnibus statuumt, sub ipsam scilicet germinationem, ut planta plena humoris protinus exiccetur, ut germen optime prodeat, quippe putationem istā non fructus, sed germinis gratia faciunt. Autumnalem uerò fructui præparant: qua de causa post Vergiliarum occasum cōtinuo illam adoriri oportet. Tunc enim uites sibi maxime constant, & recisæ minime lachrymant, nec quicquam rumpuntur: quod quidem utrunq; danum retonsa post solstitium, & fauonij flatum nimirum sentiunt, & plantæ ipsæ laborant, & germina extremis exeunt gemmis iuxta cæsuram, quoniam alimentum partim effluxit, partim in summitate remanserit, uerum uitis si undiq; leuis, exposita q; sit, melior, fecundiorq; euadet. ^a sunt uerò aliæ uites præcoques, aliæ serotinae, ut etiam ficus, malus & pirus, aiunt & hoc de uitibus, quot quot agrorum genera, tum & uitium sunt, & hoc in uniuersum asserti potest. ^b germinationem uerò accelerant uites collecto illo foedo, germinatoreq; humore; locus tamen germinandi certus ijs est, Gemma etenim dehiscente germen emergit. augetur uerò, pertinde ac cœli. qualitas, & temporis spatium. ^c fructuum mutationes si qui uel ex candidis transcant in nigros, uel ex dulcibus in acutos,

aut e contrario, quemadmodum fico, uiti, atq; punice
 euenire proditum est. locis quibusdam nulla in admira-
 tione sunt, neq; ullo modo absurde uidentur, quoniam
 natura aliàs hoc modo, aliàs illo, & partibus quoq;
 non pariter ferat, ut in uite fumida uocitata patescit.
 Hæc enim uuas alias candidas, aliàs, nigras afferre
 uidetur & aliàs omnes candidas, nigrasue promiscuè
 generat. Quam obrem nec augures hoc iudicare tan-
 quam ostentum consueuerunt. ^a Vitem autem sine folijs ^{a. c. 3. 4.}
 fructum aliquando tulisse si ex toto dixeris, incredibile
 est, sed si exiguo quodam producto germine, eoq; mox
 imbecillitate sua delapso, uuas sine folijs extitisse in-
 quis, res uerisimilior redditur, tanquam ad fructum
 edendum amplior, uehementiorq; impetus factus sit, at
 uitis cum floret, si sero inceperit, fructum sine folijs
 seruat, & ficus quoq; delapsis folijs poma diutius reti-
 net. ^b Verum uiti palmitis medulla exempta uua sine ^{b. c. 3. 7.}
 uinacis gignitur. ^c Depastio uerò animalium danno-
 sa admodum est, quippe exestis primis germinibus ni-
 hil amplius germinatur, sed protinus ipse germinandi ef-
 fluxus cessat, atq; extinguatur, quasi uitis exticcata et
 manca quodammodo fuerit. ^d at uitis locis prægelidis ^{d. c. 6. 12.}
 sapore non caret, oliua autem caret. sed ratio in eo sanè
 est, uidelicet, quod uires ad carnem conficiendam in-
 tenduntur. uuae autem sapor ipsa carne consistit. ^e uerū ^{e. c. 6. 18.}
 odorum saporumq; uarietate discordantia procedunt,

THEPHR. DE PLANTIS.

- a. c. 6. 19. *ceu uitis, pampinus, & uua.*^a *omnino multis id cuenit, ut cum uiridia sunt, mandi nimirum possint, saporisq; aliquam reddant suauitatem, propter commistionem aquosi humoris, cum autem siccescunt humoris temperie sublata, ingustabilia relinquuntur, ut germinauitum, & stipitum, & aculeatorum quorundam, & leguminum aliquorum, ut Cicere, fabæ. ad summa eorum, quæ dulcedinis aliquid reddunt.*
- b. h. 9. 14. ^b *Vitis syluestris anno durat, si in umbra, & sine iclu reſeruetur, alioquin putrescit, & inanis, fungoſa; reditur.*^c *radix huius uitis calefactoria, acrisq; eſt, quamobrem ad pſilothri uſum idonea, & uitia cutis in facie mundat. fructu eius defoliare arbores ſolent, succiditur omni tempore, ſed præcipue autumnò.*
- d. h. 1. 13. ^d *Ulmò crææ gignuntur.*^e *& illud ſanè peculiare, quod ulmo, olcæ. Tiliæ, populo cuenire uidetur,*
- e. h. 1. 16. *uertunt enim partes ſupinas, mox poſt ſolſtitium æſtium, eoq; argumento ruſtici ſolſtitium conſectum intel-*
- idem c. 2. 26. *ligunt.*^f *aquam uerò Ulmus deſiderat, & lucos, ueluti platanus, ſalix, & populus, Hæc enim omnia, & ſimilia ſata germinant, & celerrimè, pulcherrimequè ex auulſione, quæ etiam ſi quis prægrandem, eamq; cū arbore ſe exæquantem tranſtulit, perdurare optimè poteſt. Quæ uerò ſemen, fructumq; ferant, tam ex ra dice, quàm ex ijs ipſis prodiſe nimirum poſſunt. Nam eas, quæ ſteriles eſſe arbitrantur, generare quidem affirmât,*

affirmant, ut ulmum, salicem, argumentumq; capiunt non solum quod pleraq; procul radicibus suis erumpant, uerum etiam in contemplatu eorum, quæ interdum euenisse notantur, ut in Phineo Arcadiæ, cum aqua, quæ in plano obstrusis faucibus extumuit, demum erupisset, ubi propè à loco inundato Salicis steterant. hic anno secundo solo resicato Salices iterum surrexisse affirmant: ubi autem Ulmi, iterum ulmos, & ubi pinastra, & abietes, ibidem pinastra, & abietes: quasi istæ quoq; illas æmulerentur. Caterum uel illud indicium afferunt, quod ulmus semina producat. ^b Nam semina latitare arbitrandum est, cum enim flatibus delatum semen in loca proxima fuerit, nasci arborem aiunt. Auctu uerò facilis Ulmus est, ut platanus, populus, & Salix. ^d Quibusdam uerò datum à natura est, ut plurà producant, Ulmus enim uuas affert, & folliculos quosdam. Ulmus monte colorata ualde assurgit. ^f Et duo sunt eius genera, alterum monti ulmus, alterum ulmus uocitatum: interest quod ulmus fructicosior est, monti ulmus auctior: folium indiuiduum, leuiter circum serratum, oblongius quam piro. Scabrum non leue, præstat hæc arbor, et amplitudine, & altitudine, non crebra circa Idam, sed rara prouenit, amat rigua, materies flaua, robusta, neruata, deformis: quippe tota cor est. ^Viu

THEOPHR. DE PLANTIS.

- a. h. 5.8. tur ea uel ad lautiores fores (^a Ut ad cardines et ad
 tornatum nauibus rotundis, & ad præla, & torcula-
 ria) & uiridis casu facilis, sicea difficilis est. Steri-
 lis deniq; putatur, gummam in peciolis gignit, et ani-
 malia quædam culicea, & amenta peculiaria gerit.
 Autumno multa minuta, nigra, cæteris uerò tempo-
 b. h. 4.7. ribus quid ferat, minus animaduersum est. ^b Verum
 loca alia platanum habent, alta ulmo, & salice sca-
 c. h. 5.1. tent. ^c Aliquando uerò post messem, aliquando post
 d. h. 5.4. uindemiam, & arcturum caditur. ^d Et lentore nō ca-
 e. c. 4.4. ret, & humidior natura est, ut platanus. ^e Imper-
 f. c. 5.23 fecta uerò ulmus germinare potest, ut salix. ^f Plagam
 uerò ulmum non solum tolerat, sed etiam lignis detra-
 ctis caudici indomita manet, est enim humida, et pro-
 be germinat.
 g. h. 1.8. ^g Vnedont cortex cadit, ut portulacæ, & arbuto.
 h. h. 1.13 ^h Verum Portulacæ, atq; unedo folia inferiora dimie-
 i. 1.5. tunt, cacuminibus perpetuo uiuent, ramisq; assidue
 præpostero gignunt.
 i. h. 9.9. ⁱ Volucrum prius quā sol irradiet accipere iubet.
 k. h. 9.19 ^k Gignere nequaquam posse putatur, cum qui semine
 uoluerit collectum modo sextarii triginta assidue die-
 bus portionibus æquis biberit ex uino albo, sic. n. pent-
 l. c. 2.25 tus sterile scire hominem aiunt. ^l Quæ uerò corpore
 leui, atq; gracili constant, facile arbores scandunt,
 ut

ut uolucrum, lupinum, siliqua.

^a *V*rtica cibo idonea est, coquitur enim ut malua ^{a.} ^{b.} 7. 7.
beta, & rumex.

^b *V*ultures ab unguentis, & cantharidiosis necantur, necnon & apes uehementer eos oppugnare uidentur, qui uncti sunt.

^c *V*ua plurimas alterationes recipere apta est, et ^{c.} ^{c.} 6. 7.
omnino quæ saporem uinosum sortita sunt. primum. n.
dilutus quasi sapor sentitur, proxime acerbus, tunc acutus, inde ultimo dulcis. ^d *V*erum cum succo expresso ^{d.} ^{c.} 6. 15
de sede sua educimus. ^e *C*reatur uero uua à medulla ^{c.} ^{c.} 3. 19
(uide ultem & hunc locum totum) ^f *E*t in ea acinos ^{f.} ^{c.} 1. 29
minutos prospicere licet, quamquam non minus dulcedinis, his paruulis quam magnis illis natura concessit, ut in uite diximus. ^g *V*erum uua decerpta dulciores efficiuntur, scilicet quod pars humoris diluta sole ^{g.} ^{c.} 2. 10
absumpta est. ^h *S*ine uinacis uero conspicitur uua medulla detracta palmitis, qua uinaccum gignitur, ut in uite dicebamus.

Z

ⁱ *Z*ea uide semen.

^{i.} ^{c.} 4. 6.

F I N I S.

incompréhensible, et qui ne peut être
compréhensible que par la foi. C'est
pourquoi, dans la suite de son discours,
il nous expose les raisons qui nous
obligent à croire. Il nous fait voir
que la vérité de la religion est
fondée sur des bases solides, et
qu'elle est la seule qui puisse nous
conduire au bonheur éternel. Il nous
fait voir que la religion est la seule
qui nous donne une idée juste de
Dieu, et qui nous fait connaître
ses attributs. Il nous fait voir que
la religion est la seule qui nous
donne une idée juste de nous-mêmes,
et qui nous fait connaître nos
devoirs. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la vie future, et
qui nous fait connaître les récompenses
et les punitions. Il nous fait voir
que la religion est la seule qui nous
donne une idée juste de la Providence,
et qui nous fait connaître ses
desseins. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la sainteté, et qui
nous fait connaître les moyens de
l'atteindre. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la charité, et qui
nous fait connaître les moyens de
l'exercer. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la justice, et qui
nous fait connaître les moyens de
l'observer. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la sagesse, et qui
nous fait connaître les moyens de
l'acquiescer. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la bonté, et qui
nous fait connaître les moyens de
l'apprécier. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la gloire, et qui
nous fait connaître les moyens de
l'obtenir. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la vie, et qui
nous fait connaître les moyens de
la prolonger. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la mort, et qui
nous fait connaître les moyens de
l'accepter. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la résurrection, et
qui nous fait connaître les moyens de
l'espérer. Il nous fait voir que la
religion est la seule qui nous donne
une idée juste de la vie éternelle, et
qui nous fait connaître les moyens de
l'obtenir.

I

EIVSDEM CAESARIS ODONI
MEDICINAE PRACTICAM ORDINA

riam Bononiæ profitentis. Disputationes duæ vtilissi-
mæ, Altera an Rheubarbarum magis in substantia
quàm ex infuso exhibitum soluat & aperiat.

Altera an in quolibet humore euacuâdo
sit expectanda concoctio nunc
primum editæ.



QUONIAM ea, quæ alijs de Rheu-
barbaro tum ex bonorum authorum senten-
tia, tum multorum seculorum usu, et compro-
batione publicè docuimus, uidemus iam quorundam gra-
uium uirorum scriptis improbari, ne falsam aut pericu-
losam uideamur tradidisse doctrinam, necessarium fo-
re duximus, si breuiter hic refellere tentemus, quæcunq;
aduersus nostram, ac comunem de Rheubarbaro opi-
nionem isti in medium adducere conati sunt, atq; id, non
ut cuiquam contradicere sit animus, nec (testor deos) al-
tercandi gratia, sed & ut in re tanti momenti ueritatis lu-
men clariùs appareat, et nos non omnino absurda, et à ra-
tione aliena in medium attulisse uideamur.

Diximus nos atq; etiam nunc dicimus, & sentimus,
donec ratio nos & dicere, et sentire aliter cogat, quòd
Rheub. illud, quo bodie pro medicamento purgant
passim medici utuntur, si in substantia & propria mole

A

exhibeatur, minus purget quàm si ex infuso propinetur. Dicimus item quod infusum Rheub. magis præsteet aperiendo quam substantia & mole sua. Quas duas positiones licet hactenus ob omnibus, qui post Mesue artem medicam exercuerunt, fuerint pro ueris & tutis receptæ, & longo usu comprobata nonnulli tamen falsas esse auctoritatibus, & rationibus probabilibus ostendere adituntur, quas omnes mox à nobis ex ordine et fideliter relatas prouiribus impugnare et reijcere conabimur, atq; illas in arte medica penitus absurdas imò periculosas esse demonstrabimus.

Primo igitur instant probando, quod Rhubarbarum in substantia & mole purgantius sit, hoc argumento. Id purgans medicamentum, quod duplici facultate soluit, longè purgantius, & magis solutiuum est eo quod unica tantum ui & facultate, sed Rheubarbarum duplici facultate purgat, nimirum electiue soluendo, & compressue, ut uocant. Dilutum autem solum electiue soluendo, igitur magis in substantia. Assumptum primum manifestum est, duo enim agentia potentiora sunt quàm unum. Patet etiam secundum, quoniam omnes concedunt facultatem compressiuam in medicinis, qua pollere Rheubarbarum mirabolanos, & similia, nemo est, qui dubitet.

Secundo argumentatur etiam ratione ualidiori dicentes. Illud medicamentum quod ualde solutiuum est, in mi-

noris dosi, & quantitate datur agris, quàm id, quod est minoris uirtutis in soluendo. At cum damus Rheubarbarum in substantia, in minori dosi exhibemus, quàm cum damus in diluto, igitur plus ducit in substantia, quam in diluto.

Prima propositio probatur exemplo manifesto Scamoniij, Elaterij, & eiusmodi ualidiorum medicamentorum, quæ quò sunt magis soluentia, eò in minori portione exhibentur. Secunda etiam propositio est manifesta, quia usu omnium medicorum quotidiano probari potest; Nam duplam proportionem seruant in exhibendo decoctum seu infusum. Verbi causa, si danda unica dragma esset Rheu. in substantia, duas in diluto exhibent.

Tertio arguunt apparenti ratione dicentes. Id medicamentum, quod longiorem moram trahit in stomacho, plus etiam educit, quàm id, quod minorem, sed Rheubarbarum longiorè moram in substantia, quàm in diluto ergo.

Prima propositio apparet ex eo, quòd agens in agendo cum hæret, maiorem impressionem facit in passum, quàm id, quod transiit, nec figitur.

Secunda Propositio item est manifesta; quia dilutum perfluum, ac lubricum, ac minus hærens est propter aquæ admistionem.

Quarto probant eo argumento, nimirum Medicamentum soluit magis, quod potest difficiliorem materiã

Q V A E S T. D V A E.

evacuare, quàm quod potest faciliorem, at Rheubarbarum in substantia soluit difficiliore materias, quàm dilutū, ergo. Prima propositio sic declaratur, quia cū omnis actio fiat cum reactione, illud est agens ualidius, quod superat passum magis reagens, & resistens, quàm quod minus. Secunda etiam patet ex hoc, quòd damus in substantia Rheubarbarum cum crassiore, & magis resistente materiam uolumus educere, igitur magis in substantia, quàm diluto.

Quinto etiam instant ea nimirum ratione, quia fortioribus naturis Rheubarbarum in substantia datur, infusum uerò naturis debilioribus, igitur Rheubarbarū in substantia magis solutiuum. Prima propositio probatur ab Auic. quarta primi cap. nono, & est rationi consentaneū. Secunda est ex usu quotidiano manifesta, ergo.

Sexto arguunt hoc pacto, quaelibet uis in medicamentis sedem habet in substantia, & symetria, à qua resultat actio illa & uis, qua præditum est medicamentū, quæ si alteretur, corrumpitur et uis eius, Rheub.¹ ergo uis integra, & incorrupta maior erit, dum integrum adhuc est, quàm cum separatum per infusionem, igitur nō tanta uis in infuso, ut in substantia est.

Septimo probant id etiam autoritatibus, & primo autoritate Principis, qui habet prima quarti Textu secundo cap. quarto, quòd clystere redditur debilius, si recipiat

ciplat infusum turbit, quàm si in substantia, ergo mens-
Auic. est quòd plus in substantia agant medicamenta,
 quàm ex diluto.

Octauo auctoritate Mesue in suo de simplicibus me-
 dicamentis cap. de Rheubarbaro, ubi habet, quòd ignei-
 tas perficit id, quod in terretate Rheubarbari facit ip-
 sum amarum. *Arg.* hac ratione. Solutiuu uis in Rheu-
 barbaro maxime est ratione suæ amaritudinis; *A*marus
 enim sapor uim absterforiam habet, qua maxime fulet-
 tur ipsa solutio. *A*t illa est in terretate, ergo in substan-
 tiæ mole, ergo plus soluit Rheubarbarum in substantia,
 quàm ex infuso.

Pluribus autem alijs utuntur rationibus, sed hæ sunt po-
 tiores, alias breuitati studentes omittimus.

Iam uerò ad alterius positionis rationes deuenia-
 mus, Probare similiter nituntur, quòd Rheubarbarum
 in substantia non tantum purgans sit, quàm eius infu-
 sum; *V*erum etiam, (quod absurdius uidetur) magis ape-
 riat obstructions. *Arg*umentantur igitur sic.

Primo Rheubarbarum abstergit in substantia, er-
 go aperitiuum est in substantia; *P*atet assumptum; quo-
 niam abstergere, & aperire sunt eiusdem generis, ut
Probat Auic. quinto Colliget cap. nono, & Hal. se-
cundo Practi. cap. duodecimo. Nec medicinae abster-
sive differunt ab aperitiuis, nisi quòd aperitiua penetrat
sua

sua ni acuta & igitur internas magis partes; Absor-
sua uero non penetrant, sed haerent locis, quae debent ab-
stergere, idcirco haerentia illa iuuat, ac per hoc operie
magis.

Secundo Absynthii aperit opilationes Hepatis,
quia ut dicebat Auer. eodem loco. Stipticitas iuncta
cum rebus aperitiuis retinet eas iuxta meatus, donec fun-
ctae fuerint suo aperiendi munere, sed Rheubarbarum
cum stipticitate est, ergo iuuabitur magis uis eius aperi-
tiua, praesertim eo intus sumpto.

Tertio Auic. quarta primi cap. uigesimo quarto, in
calce inquit. Si in aperitiuis medicinis stipticitas, & su-
btilitas confungetur, erit melius, quoniam stipticitas remo-
uebit à membro subtilitatis grauamen. Rheubarbarum
ergo quod coniunctam habet stipticitatem cum ignea &
subtili, melius erit ex sententia Principis.

Quarto stipticitas iuncta cum re aperiente facit, ut
magis penetret, ut patet de Oleo Rosato, quod magis in-
greditur poros corporis, quam oleum simplex, ut notat
Gal. tertio de simplicibus, & Auic. quarta primi cap.
decimo octauo. Idem etiam in Cortiandro notatur. Rheu-
barbarum igitur cum huiusmodi sit, in substantia ma-
gis ingreditur poros, ac per hoc magis aperiet.

Quinto. Vbi maior obstructio, ibi maiori apertio-
ne opus est, sed in obstructione crassae bilis damus in
substantia,

substantia, in tenuioris uerò in infuso, ut passim omnes Practici utuntur. Igitur in substantia magis aperit: Quod etiam patet, quia in cronicis morbis damus Rheubarbarum in substantia, non in infusione; Cronici autem morbi maiori indigent apertione, quia ex materia frigida infarciēte.

Sexto, Plus moratur in corpore Rheubarbarum in substantia, quàm infusum, ergo malus octum habebit, quo possit sua ut tollendi obstructiones fungi, ergo magis aperiet; nam à longitudine moræ in agentibus maior fit impressio in passis.

Septimo Euforbium & spica exhibentur in substantia, non in infusione ergo.

Octauo. Membris principalibus melius in substantia, quàm infusione ex sententia Principis, cum igitur rarò accidat, quin aliquod membrum principale non leda-
tur, cum indigemus Rheubarbaro, ergo rectius in substantia tollitur obstructio in his. Et hæc sunt, quæ probare uidentur omnino Rheubarbarum magis in substantia exhibitum aperire, quàm in diluto. Iam uerò uidē-
da sunt rationes oppositæ his, & considerandæ diligenter utraq; ut possimus ueritatē in re tātī momēti elicere.

Qui igitur probare nituntur totum horum oppositum, sic arguunt.

Primo. Aduersus primam positionem, nimirum eam
quæ

quæ nititur demonstrare Rheubarbarum in substantia magis solutiuum esse, quàm ex diluto. Rheubarbari pars solutiua illa est, quæ in parte magis exteriori ignea, & aerea, quàm in crassa & terrestri, ut dicit Mesue lib. de simpl. cap. de Rheubarbaro, & cæteri omnes, qui de illo meminerunt, sed illa in diluto elicitur, quod patet ex eodem Mesue, et ex Galeno in capite de brassica, Etiam ex sapore; Nam ubi facta expressio est, Rheubarbarum, quod remanet, insipidum est, et nullius uirtutis, et ut dicebat etiã Gal. in tertio de Alimētis tota uis in aquã trãsfertur. Dilutũ autem eius amarum, & acutum sentitur, ut patet gustantibus. Igitur non ratione substantiæ terreæ, sed igneæ Rheubarbarum soluit, ergo substantia magis impedire uidetur, quàm solutionem adiuuare: Infusio uerò oppositum facere.

Secundo Rheubarbarum in substantia datur ad constringendam aluum, ut patet in Dysenteria, omnes enim concedunt, & Auic. decima sexta tertij cap. quarto dicit, ex retinentibus fluxũ est omne illud, cuius substantia & corpulentia est dura, & nocet et, quod liquidum est ex sorbitionibus. Infusum uerò ad soluendum, ut declarat Mesue in cap. proprio, ergo plus soluit infusum, quàm substantia.

Tertio Medicamentum solutiuum magis lubrico tuatur, quàm sũptico, hinc Hipp. corpora cum quis purgare &

gare &c. Et alibi multo cibo & potu humectanda, quia lubricum per se soluit, tantò magis cum aliquo habere uim solutiuũ, sed infusum est eiusmodi res & elu substantiæ sicca, habet enim aqua, quæ humidissima, & fluxilis est simpliciter non alijs cõparata, ut dicebat Gal. primo. de Elem. et tertio de tẽperamentis igitur infusum, &c.

Quarto. Medicina, quæ citò exit in suam operationem; maioris est uirtutis, quàm quæ tardè; Nam Quod libet agens quo fortius est, citius in agendo assimilatur sibi passum, sed Rheubarbarum infusum citius soluit, quàm in substantia quia citius à natura actuatur, & in uapidã substantiam transit, qua fertur ad tractionem humorum, ergo maioris est uirtutis, ac per hoc magis soluit, Insubstantia enim non ita citò, cum non sit ratione suæ siccitatis uaporabile, nec tam cito possit in actum à calore reduci naturali, igitur infusum magis soluit.

Quinto. Medicamentum, quod aptius est penetrare ad omnes corporis partes, aptius est ab eisdẽ trahere, et soluere cũ qualibet actio fiat per approximationẽ agentis ad passum mediata, uel immediate ut Arist. primo de gener. tex. com. sexagesimo octauo, & nono Metaph. tex. com. decimo, Sed dilutum ratione suæ tenuitatis & acuitatis, atq; etiam amaritiei (quæ omnes qualitates in ipso apparent) aptius est quàm in substantia, ergo salutiũ magis est. Multis alijs argumentis posset

B hæc

hæc positio probari, sed hæc sufficient, Jam ad secundā positionem, qua conantur ostendere, quòd Rheu. in substantia magis aperiat, quàm ex decocto, accedendum.

Primo arguitur in decocto acuitas, tenuitas, amari tudo sentitur in gustu. Gustus autem, ut dicebat Gal. sexto, & nono de Simp. & sexto de comp. Med. secundum loca, est uerus iudex in cognoscendis medicamentis; In substantia uerò crassities, & siccitas, ergo decoctum plus aperit.

Secundo. In pectoris dispositionibus, & alijs, in quibus indigemus dilatatione, nunquam in substantia, sed potius ex infuso, in intestinorum uerò affectibus, ut in dysenteria, in qua indigeamus adstrictione, semper damus in substantia, quod nemo est, qui neget, ergo infusum aperit magis.

Tertio. Lubricitas in Rheub. in infuso cū aquæ tenuitate facit ad maiorem penetrationem, ut dicebat Gale. quarto de Usu par. cap. quinto. Cum dicit de aqua, quòd licet ipsa non nutriet, tamen facit penetrare nutrimentum, hinc Aris. dicebat, quòd Vinum aquosum magis inebriat, quàm meracius, eo quòd sit propter aquæ admistionem factum magis tenue, et penetrabile & uaporabile ad caput, quæ tenuitas magis facit ad apertionem, igitur decoctum seu infusum præstat in aperiendo.

Quarto. Item infusum abluit sua humiditate fluxilem, abstergit

abstergit sua amaritie, quæ iuuat expulsionem, etiã sua humiditate & lubricitate, quæ dotes in substantia desiderantur, ergo aptius ad tollendas infarctiones, et ad reddendas uias purgatas, latas, & apertas infusum est, quã ipsius substantia.

Quinto. Mesue apertissimis uerbis ostendit in cap. de Rheubarbaro, cum comparat infusionem ipsi substantiæ, quod eius infusio competit quando solum quæritur absterflo, & solutio, & opilationum apertio, quæ sunt uerba Mesue, igitur &c.

His positis pro huius quæsti declaratione nonnulla adnotanda sunt prius, quæ probabunt primas Positiones penitus falsas esse, & omnino credendum Rheubarbarum minus soluere, et aperire in substantia exhibitum quàm in infuso & decocto, Postea uerò ad refellenda prima argumenta, quæ falsa esse credimus, accedemus.

Primo enim consideranda est natura Rheu. Secundo quid infusio præstet siue decoctio in medicinis. Tercio quo nam pacto uis astringens in medicinis solutiuis adiuuet solutionem, & apertionem, uel impediat.

Primo ergo si naturam Rheubarbari rectè inuestigare uolumus, Rheu. inquam illius, de quo hic ambigitur, nempe uulgaris, quo ferè omnes Medici hodie utuntur, ea profectò non petenda est à Gal. uel Diosco. uel huiusmodi Græcis Veteribus; Quandoquidem ipsi Rheu.^m

Q V A E S T. D V A E.

hoc nostrū cognouisse nō uidentur, ut rectē dicit *Auer.*
 quinto Collig. dum numerat Rheu.^m inter Medicamen-
 ta ignota antiquis, quicquid dicant *Manardius*, *Ruuel-*
lius, & nonnulli qui credunt Rheu.^m idem cum Rheupō-
 tico Græcorum; Nam ut aliās multis rationibus osten-
 dimus, dum publicē tractaremus de Theriaca, longo in-
 teruallo differre Rheu.^m à Rheup.^{co} ut etiā lōga discu-
 ssione clarissimē ostendit *Petrus Andreas Mattheo-*
lus in suis doctissimis *Commentarijs* in *Dioscoridem*.
 Petenda igitur est Rheu.ⁱ uis, & natura à *Ioanne Me-*
sfue, qui longē exactius et diligentius quā quiuis alius in
 suo lib. de simplicibus. De Rheu.^o mentionem facit, cu-
 ius uerba huc fideliter transferenda duxi, ut ex eo, quod
 sentiendum sit de Rheubarbari natura, et uiribus, unus
 quisq; proprio iudicio acquiescat, uerba *Mesue* hæc
 sunt.

- “ Rheubarbarum calidæ & siccæ complexionis est in
 “ secundo gradu, & dicitur quod est in primo, sed illud est
 “ uerius, conuenerunt autem in permissione eius aqueitas,
 “ & terreitas, dantes ei stipticitatem, & substantiam, et
 “ acreitas, dans ei raritatē substantiæ, & est in eo ignei-
 “ tas perficiens quod per actionem eius in terreitatem ip-
 “ sius, ipsum fecit esse amarum; uerum terreitas est secun-
 “ dum profundum eius, & igneitas est in superficie ipsius;
 “ quapropter infusio separat inter substantias ipsius, et cō-
 plectio,

“ plecto operationis solutionis in oppilationem per ipsum
 “ est per dominium calidi in superficie eius, & consecutio
 “ contractionis per ipsum est à substantia sua terrea stiptica.
 “ Et eius quidem, quod purum est, infusio competit,
 “ quando solum queritur absterflo, & solutio, & opilatio
 “ num apertio. Et ipsius contriti exhibitio quando quart-
 “ tur, ut post illam in uisceribus uestigia contractionis re-
 “ remaneāt. Verum ex eo quod assum est uehementius fit
 “ illud, & adhuc uehementius ex adusto, & quod ex eo est
 “ purius. sustinet quod oportet, et de contritione meretur.
 “ haclenus Ioannes Mesue.

Ita clara mihi uidetur descripta natura Rheubar-
 ri à Mesue, ut mirum sit quomodo quispiam (si eius di-
 ctis standum est) in opinionem uenerit, quò Rheu.^m in
 infusione minus quàm in substantia soluat, & aperiat.
 Est igitur Rheu.^m ut diuersarū partium, ita diuersarū
 facultatum, nimirum astringentis, & aperientis, & pur-
 gantis, & hæc de primo annotando,

De Secundo ergo quod infusio præstet in Rheubar-
 baro probè habere possumus ex uerbis Gal. in tertio de
 alimentis libro, per hæc uerba. Corpus. n. solidum quod
 “ in aqua elixatur qualitates, quæ intio sibi inerant, in ea
 “ deponit, sic ut qualitatis expers euadat clarius autem hu-
 “ ius rei ueritatem intelliges, si quando quod elixas in aliā
 “ aquam transfusum, secundo, & tertio recoquas, inue-

“ niles quippe id quod decoquitur propriam amisisse quali-
 “ tatem siue salsam, siue acrem, siue etiam acerbam, aquā
 “ autem eam in se recepisse.

Ex quibus uerbis luce clarius ostenditur, quod infu-
 sio seu decoctio separat a medicamento qualitates, & re-
 cipit eas in se ipsam, id quod etiam de Rheu.ⁿ infusio-
 ne omnino credendū esse nemo est, qui ire possit inficias.
 Hanc ob causam dicebat Aristotiles quarta Metheo.
 uigesimo octauo carnem elixam sicciorē esse carne assa-
 ta, propterea quod aqua in decoctione penetrans poros
 carnis propriam ipsius humiditatem eliciat, ac in se ipsam
 transferat, ac per hoc carnem sicciorē (quantum spectat
 ad propriam humiditatem) reddat licet eam aduēntia hu-
 miditate molliorem, & humidiorē faciat. Modus au-
 tem decoctionis haberi potest ex Gal. septimo de comp.
 med. secundū loca cap. secundo ubi de artheriacis An-
 dromachi agit cum tubet post simplicium decoctionem eo-
 rum substantiam ut inutilem projici, & seruari eam in
 qua substantie praesuerant aquam, quod autem in deco-
 ctione seruetur omnino uis aliqua praesertim solutiua de-
 clarat Gal. manifestissime tertio de simp. med. facul. cap.

“ quinto per haec uerba. Quod uero brassica duas ha-
 “ beat contrarias facultates neq; id quidem facile concedi-
 “ mus nam si succum eius expressum, aut solum, aut cum
 “ melle auferimus expurgare ipsum cernimus, attamen
 quoniam

“ quoniam quod reliquum est edere nequeamus adstricto-
 “ rium esse diffidimus, sed si totam cōcoquas primamq; eius
 “ aquam in quam succum deposuit effundas iterumq; eam
 “ alteri aquæ puræ iniicias, rursusq; concoctam eximas,
 “ succum quidem purgare offendes, Brassicam autem ip-
 “ sam uentrem astringere, multoq; magis si non bis tantum,
 “ sed & ter & quater aquam effuderis, nam quanto exqui-
 “ sitius in aquam succum suum de posuerit tanto & illi qui
 “ dem maiore purgandi uim addet, et reliquæ eius substan-
 “ tiam quæ ueluti oleris ipsius caro est astringentem effi-
 “ ciet. Ex quibus uerbis Gal. non solum patet modus de-
 “ coctionis, sed etiam ostenditur, quod in decoctione pars
 “ simplicium solutiuæ in aquam transfunditur remanente in
 “ partium substantia astrictione, sed quis quæso idem in
 “ Rheu. cōtingere negabit? Non ne eadem ratio utriusq;
 “ est? Caterum hoc ipsum manifestius expræssit Gal. eo-
 “ dem loco paulo inferius de Aloe dicens, quod non lota
 “ Aloe purgat, lota autem ut pote quæ in lotionē purgan-
 “ tem uim deposuit non purgat, & hæc de secundo.

De Tertio nimirum quid astrictoria uis si cum solut-
 “ ue coniungatur faciat, an se uti contraria inuicem expel-
 “ lant, an iuuent potius. Audiamus Galenum hanc quæ-
 “ stionē optime declarantem, secundo de alimentis cap. ui-
 “ gesimo primo, ubi loquens de malis hæc habet uerba.
 “ Perspicuum porro ex his quæ sæpe diximus est, quod
 astringentia

“ astringentia quidem quantum in ipsis est alui deiectiones ”
 “ semper coibent, & quarto de comp. med. per genera cap. ”
 “ quinto ultra mediū clarius per hæc uerba. Omnia igitur ”
 “ astringentia contrahunt ac densant meatus ad hæc uir- ”
 “ ciunt ac continent partium eis adherentium substantiam, ”
 “ atq; minus magisq; hoc pro astringentis quantitate effi- ”
 “ ciunt. Cæterum stringendo & densando summa corpo- ”
 “ ris quod astringitur uirtus illorum excluditur & in al- ”
 “ tum ire prohibetur, ob quam rationem pulchre non nulli ”
 “ medicorū huiusmodi pharmacis alia subtilium partium, et ”
 “ acri potestate prædita indere cogitarunt, à quibus uelu- ”
 “ ti ductæ astringentium uires in profundum corpus perue- ”
 “ niant. Ex quibus uerbis habetur quòd astringentia om- ”
 “ nia, cum his quæ tenuia sunt, mixta (qualia esse in Rheu- ”
 “ barbaro manifestissime deprehendimus) non modo ape- ”
 “ riunt & astringunt, uerū etiam penitus, & in profun- ”
 “ dum magis astringunt, ut potè quæ à tenuibus in tro du- ”
 “ cantur, nō quòd tenuia ab astringentibus in penitiores du- ”
 “ cantur. pates, nam & Gal, tercio de simp. med. faculta- ”
 “ tib. cap. tertio hoc ipsum per hæc uerba asseuerat. ”
 “ Aliq; in hisce utiq; substantiæ mixtura clarè perspic- ”
 “ tur, at in alijs etiam si non appareat tamen eam rationē ”
 “ colligere oportet, ac non putare aliud in Aloe adstri- ”
 “ ctionem moliri, aliud in malo, unum .n. in omnium effice- ”
 “ re pro sua natura non astringentem modò, sed & alia- ”
 rum

rum qualitatatum unamquauq; rationi consentaneum est.
 hæc Gal. Cuius uerbis, quis est, qui non aquietescere de-
 beat? & quam ratione possumus in Rheu.^o astricti-
 uam uim imaginari, quæ non semper astrictionem mo-
 liatur, quomodo ergo non solutionem impediat & aper-
 tionem. Cæterum quoniam leguntur apud Galenum in
 sexto de comp. medic. secund. loca cap. primo, ubi de cro-
 ci, et myrrhæ mixtione agit, quædam uerba quæ uidentur
 quoquomodo innuere astringentem uim adiuuare apertio-
 nem, audiamus uerba Gal. quæ hæc sunt. Penetrat
 “ enim magis in altum corporum myrrha quam crocus, ut
 “ potè substantiam tenuitum partium habens, atq; ex hoc
 “ duplicem utilitatem exhibet, simul introducens quidem se
 “ cum uires admixtorum, & persanans usq; in altum inflā
 “ mata, & tamen adiuuant se mutuo Crocus quidem uelu-
 “ ti impellens Myrrham, Myrrha uerò ueluti dux præce-
 “ dens peditem sequentem Crocum, si ita licet dicere dedu-
 “ cens. Quemadmodum enim ob astringendi uim minus
 “ habet substantiam tenuitum partium quam Myrrha, sic
 “ Myrrhæ substantia tenuiori partium prædita, citius
 “ quidem uim suam in altum transmittit, citius item ad cu-
 “ tim recurrit simul secū efferens ea, quæ in profundo sunt
 “ attenuata. Hanc igitur recursus eius uelocitatem impe-
 “ diunt astringentium mixturæ, non enim hoc solum facit
 “ Crocus, hactenus Gal. Ex quibus uerbis habemus

C quod

quòd astrictio Croci impedit, ne aperitiua uis Myrrhæ regrediatur ad cutim condensando cutis poros. Ipsa quidem croci uis astringens iuuatur ab aperiente Myrrhæ ui, in eo quod præit Myrrha aperiens uias, quas Crocus sequitur, qui eo auxilio penitiores partes adit, ad quas si ne ui myrrhæ propter suam astrictionem nõ penetrasset: Crocus etiam iuuat quidem impellendo Myrrham, prohibet tamen ipsa uis Croci, cum ingressa est, & partes pro sua facultate astringit, & condensat, ne Myrrhæ uis regrediatur ad cutim aperiendo. Quare licet in principio id quod astringit utdeatur aliquo modo impellendo astrictionem facere ad apertionem, in fine tamen manifestissime impedit regressum & apertionem. Ex his item habemus quòd non omnis astrictio conferat ad apertionem adiuuandam, sed tantum quæ leuis est, ut Croci quidem adhuc illa sua leui astrictione prohibet recursum in se ne, & astringit. Quid ergo dicendum de Rheu.^o quod tantam habet astrictionem in substantia, non ne magis & recursum, & recursum impedit? non ne in infuso illa leuis astrictio, de qua hic loquitur Gal. etiam reperitur? Hoc igitur modo si quæ sint authoritates apud Gale. & alios interpretandæ sunt, ea etiam ratione dixit Gale. quòd decoctio Iridis plus aperiat, quàm decoctio absinthij, quod non esset, nisi in absinthio plures partes astringentes essent, quàm in Iride, sic intelligendus Auic. et alij.

Sed

Sed quoniam isti adducunt locum Gal. tertio de simpl. Med. facul. cap. septimo in quo uidetur Gal. opinionē illorum fouere, sed uidemus locum illum potius contra ipsos esse, uerba Gal. hæc sunt.

“ *Astrictio enim natura est ut meatus occludere præ*
 “ *occupans uicinam substantiam ad se contrahens, consti-*
 “ *pansq; , ijs quæ humectare ualent, impedimento existat,*
 “ *atq; adeò infirma est, ut in rosaceo, quæ ipsa uincatur*
 “ *potius quàm uincat tenues calidasq; rosacei particulas*
 “ *præuertere quidē nequit, sed ubi illæ altius penetrauerūt*
 “ *in ipsam tam tum superficiem agere incipit prouiribus cō-*
 “ *trahendo, constipando, & condensando, ex quo necessa-*
 “ *rio sequitur, ut quæ ingredi meatus anteuertunt exigua*
 “ *corpuseula, intro propellantur, ac meatibus præclusis*
 “ *foras regredi inhi beant, hæc Gal.*

Ex quibus uerbis habemus quod ad humectandū, et ad penetrandū confert quidem astrictio, si leuis admodum sit, qualis in Rosaceo esse uidetur, quando quidem si uinceret astrictio non tantum impediret regressum qualitatis calidæ præcuntis, uerum etiam ingressum ipsum cogens, ac condensans poros, aditum ad penitiores partes esse nequaquam permetteret. sed quæso si ex leui astrictione dicit Gal. impediri regressum, quoniam pacto fieri potest, ut ea, quæ in Rheubarbari substantia tam insignis reperitur astrictio, non etiam impediat uiam humo-

rum ne ad uentriculum trahantur? & qua nam ratione imaginantur isti, quod Rheubarbari uis astringentia, quæ in substantia est, possit sua compræssione tam facile constringere maximas cavitates intestinorum, angustos uerò cæteros meatus, qui longè minori negotio comprimant possent, non etiam magis coarctet & occludat. Profectò uerisimile non uidetur istorum placitum, Quòd etiā astringentia hæc, quæ in medicamentis solutius aliquando reperitur, non modò non faciat ad solutionem & ad apertionem, imò potius impediat, est opinio etiam excellentissimorum medicorum, ut Gentilis de Fulgineo qui super quinto Aulicæ. in declaratione Electuarij de xyloloe; ubi de dosibus agit medicinarum, hanc dat regulam. Quòd quando cum solutius stiptica ad miscemus, tunc solutiva ipsa exhibenda in maiori dosi sint quàm si simpliciter exhiberemus, si uerò ea admiscantur, quæ solutionem adiuuant, tunc in minori dosi exhibenda sunt, uerba eius hæc sunt.

- “ Aliam autem regulam dederunt in dosium medicinarum compositarum exhibitione, & est, quòd cum aliquo solutiuo ponuntur res, quæ eius uirtutem minuunt, debet dari dosi maior, sed quando ponuntur res, quæ eius uirtutem augent, debet dari dosi minor; exemplum primum, quando cum scamonea adduntur stiptica, ut Myrabolani, licet iuuent soluendo coleram. Exemplum secundum, quando

“ quando cum Scamonea addetur Euphorbium, & hæc
 “ est regula bona, hæc Gentilis. Ex quibus uerbis luce
 clarius habetur nos posse facile inferre, quòd si Stipticitas in Myrabolanis, qui dicuntur non minus Rheubarbaro solucere comprimendo, impedit solutionem; uerisimile etiam sit ut in Rheubarbaro Stipticitas impediat solutionem.

Eandem sententiam uidetur habere Aggregator in tractatu secundo cap. centesimo tertio, post medium,
 “ qui loquens de Myrabolanis inquit, & quando uolumus
 “ Myrabolanos præparare ad dandum in potu, terantur,
 “ & infundantur in aqua calida, & colentur & proiciantur
 “ super colaturam zaccara, & terentibim, ad reprimendum
 “ Stipticitatem eorum.

Et paulo infra loquens de eisdem inquit.

“ Et qui uoluerit addere in bonitate præparationis eorū,
 “ coquat ipsos cum prunis, & Sebesten, & Iulubis, &
 “ tribuat, quia in istis medicinis est uiscositas, quæ reprimat
 Stipticitatem Myrabolanorum, hactenus Aggregator. Sed quid clarius potest dici contra ipsos, non ne & ipsi Myrabolani maxime cum Rheubarbaro conueniunt in duplici uirtute, nempe solutiua, & compræssiua? quomodo ergo uis compræssiua in Myrabolanis impedit solutionem, in Rheubarbaro uerò nequaquā? Sed & clarius idē sentire uidetur Conciliator diff. cxxxiii.

ubi:

ubi de Rheub^o ipso tradit exemplum per hæc uerba.

“ Eodem modo medicinarum uel uigorantur, aut destruiun-
 “ tur, aut minores redduntur actiones, cum unâ cōiungun-
 “ tur. Exemplum primi est associatio Turbitib^u cum
 “ Zinzibere, ut tactum est prius, aut Epitimi cum Pipe-
 “ re, aut Rheub.ⁿ cum Bolo armeno, in Rheub.^{io} enim in
 “ est uirtus contractionis fortis, sed cum hoc uirtus aperiti-
 “ uia minuens illius operationem, unde si miscetur cum
 “ Bolo armeno, aut Acacia contrahit uehementer, Quæ
 “ quidem grauissimi uiri uerba ostendunt Rheub.ⁿ astric-
 “ tionem non leuem, ut in croco & rosacco, & absinthio
 “ erat, sed ualidam, & fortem, ut uim eius, qua aperire
 “ potest, impediat, cuius rei indicium esse potest, dum ijs,
 “ qui fluxu uexantur, exhibetur.

Cæterum quod dicunt de medicinarum uirtutibus, quod
 non se impediunt in actionibus, intelligendum est non qui-
 dem de omnibus uirtutibus, nam quis neget uirtutes ma-
 nifestas, qualis est compressiua in Rheub.^{io} non se in-
 uicem cum contrarijs uirtutibus se impedire? Intelligitur
 ergo id tantum de occultis, licet et illæ aliquo modo se impe-
 dire uideantur; exempli causa, cum duæ medicinæ admi-
 fcentur, quarum altera citius, altera tardius suam faciēt
 operationē anteuertendo, uel retardādo alterius actionē.

Cæterum in medicamentis si quæ sint, quæ se inui-
 cem per qualitates contrarias manifestas ponant, & pe-
 rimant,

rimant, perpetuò altera alteram impedit; quis ergo in casu nostro neget compræssiua uis in Rheub.¹⁰ Myrabolanis & eiusmodi? aperitiua & solutiua facultati non perpetuò aduersari? Quòd autem compræssiua uis quædam sit manifesta, tum probari potest ex sexcentis locis Gal. tum ex eo quòd in Myrabolanis, quorum genera uniuersa comprimunt, cum tamen occulta ui hi quidam pituita, illi bilem, uel Melancoliam purgēt, in hoc enim differre uidentur uires occultæ à manifestis, quòd manifestæ quidem si putà calidos iuuent, exempli gratia frigidos omnino lædent, ut clarissime declarat Gal. in octauo de compo. medica. secundum locos cap. nono, per hæc uerba.

“ Coclearum trium carnem probe terito, & affussi ui-
 “ ni nigri cyathis tribus calfacito, ac bibendum dato: uiden-
 “ tur autem hæc iuxta totam substantiam efficacia esse nō
 “ secundum unam, aut aliam qualitatem, quale est & lupt-
 “ num hepær, cuius abunde experimentum habemus; Et
 “ paulo infra ait, & ob id talia pharmaca omnibus intem-
 “ peraturis conuenire uidentur, ut quæ ex substantiæ pro-
 “ prietate cōmoditatem de se exhibent, et neq; calidas, neq;
 “ frigidas intemperaturas ledant. In Rheubarbaro igitur cum compræssiua uis non sit ex his, quæ à tota sunt substantia sunt, perpetuò aperitiua & solutiua aduersabitur.

Accedit

Accedit ad hoc, quòd cum uirtutes naturales suas exercent operationes per qualitates primas tanquam per propria instrumenta, nam uirtus Attractrix per calidum & siccū agere uidetur. Retentrix uerò uis frigiditatem, & siccitatem pro instrumento habet. Concoctrix uerò facultas per calidum & humidum in suam exit operationem, Expultrix uerò uis, qua in solutione maxime indigemus, frigidum & humidum pro instrumento habet, atq; hæc perpetua sunt in naturalibus istis uirtutibus, & operationibus, ut uno ore omnes tum Philosophi, tum Medici consentiunt.

Si igitur instrumentum uirtutis expulsuæ est humiditas, & frigiditas; quid prohibet quin aquæ humiditas, quæ in infuso est Rheu.^o iuuat ad expellendum? Et quoniam pacto siccitas, quæ in eius substantia reperitur, quæ retentricis potius est instrumentum, nō impedit ipsam expultricem? hæc profectò absurdiora sunt, quàm ut multis alijs rationibus et autoritatibus refelli mereantur. Quare ijs tantū in præsentia breuitati Studentes usos nos esse sit satis. Reliquum uerò est, ut pro exacta ueritatis declaratione hic referamus nonnulla breuissimè tamen, & per capita, quæ malè ab ijs, qui primam positionem suscinere tanquam ueram uolunt, fuerunt assumpta, à quibus prauè intellectus ueritati, experientiæ, & communi usui contradicere ausi sunt.

Primum

Primum quod male assumunt est, quod ab alijs, præterquam à Mesue testimonia de Rheubarbaro male citant, cum nullus Mesue exquisitus, & exactius fuerit de Rheubarbaro loquutus, malè ergo confundunt cum Reupontico Rheubarbarum nostrum.

Secundum quod perperam assumunt est, quod in Rheub^o uim esse solutiua, et ipsam compræstiuam credunt, quæ, ut probatum est, omnino opponitur solutioni, & apertioni.

Tertio quia malè cõceperunt causam in Absinthio & in Oleo rosaceo, quare rosaceum plus aperiat, quàm simplex oleum. Credentes id contingere merito Stipticitatis in rosaceo reperiæ, quod probatum est esse absurdissimum, & potius tenuium partium ratione.

Quarto quod credant indifferenter astrictionem iuuare ad aperiendum, cum probauerimus, quod non quælibet astrictio, sed tantum leuis, qualis est in rosaceo, Absinthio, & Croco, aliquod præstet in aperiendo auxilium. Nam intensior astrictio si sit, eam omnino impedit.

Quinto quod non animaduertunt, quod etiam in infuso sit astrictio quædam, illa scilicet qualis debet esse si apertionem iuuare debeat.

Sexto quod malè item conceperint causam, quare stiptica ad miscere soleamus in medicinis, quæ hepatis ue-

nas obstruclas aperire debent. Nam non ut iuuenius
apertionem, sed in membris principalibus admiscuntur sti-
ptica attenuantibus ne (ut Auicennæ utar uerbis) subtili-
tatis grauamen noceat membro principali ipsum relaxās,
& dissoluens.

Septimo quod non bonam faciunt comparisonem in
applicando regulam dosum medicinarum, dum dicunt, da-
tur Rheubarbarum in minori dosi in substantia, quàm in
fusum, ergo minus erit solutiuum. Nam non seruatur in
hac comparisonem eadem quantitas utriusque, cum in infu-
sione non totum Rheu.^m dissoluatur, sed tantum partes
tenues cum aliquibus astringentibus si enim totum dissol-
ueretur non esset addenda illi dosi imo solum magis ad-
buc solueret.

Octauo quod assumunt falsò. Aquæ humiditatem
infuso ad mixtam, & perfluam, nihil facere ad solutionem
& penetrationem. Vltimo quia dicunt uirtutes medici-
narum se inuicem non impedire, quod non est uerum uni-
uersaliter, nam id contingit tantum in uirtutibus occultis
atque in eisdem non semper. Sed iam his declaratis dicemus
quid sentiendum nobis uideatur per has quatuor posi-
tiones.

Prima compræssiua uis non solum in Rheubarbara:
sed in quibuscumque siue simplicibus, siue cõpositis reperta,
quantum in se est aperitiua et solutiua penitus aduersatur.

Secunda

Secunda positio est, Rheubarbarum cum sua substantia corpore a exhibitum principio quidem leuiter, postea uero uehementer astringit.

Tertia cum partes Rheubarbari quæ in aquam ex infusione transferuntur, sint magis igneæ & acree ac per hoc tenues plus aperiunt, & soluant.

Quarta ideo duplicatur dosi in Rheub.ⁿ infusione; quia non tota Rheubarbari, uis ex infusione elicitur.

Omnium harum positionum ueritas late patet ex superioribus adnotatis. Opportunum igitur iam erit argumenta pro prima parte adducta dissoluere, & tandem finem dicendi facere.

Ad primum igitur argumentum primæ positionis, cum dicitur, quod duplici ui soluat Rheubarbarum.

Respondemus quod uirtus compræssiua impedit quantum ex se est semper uti diximus, tamen iuuat per accides corroborando membra, et comprimendo ad expulsionem, dico tamen quod ea ratione constringit etiam uenas, & cæteras uias angustas unde humores euacuandi debent transire, & ea ratione impedit regressum ad stomachum, ut dicit Gal. præsertim cum ualida sit ista uirtus cōpræssiua in Rheub.^o ut dicit Conciliator. Ad hæc in infuso etiam est duplex uis. Nimirum lubrificatiua, & humectatiua, quæ ut diximus est instrumentum proprium deseruiens ipsi expulsionem quæ merito humiditatis, & fr

D ij giditatis

gilitatis celebratur, non siccitatis aliquo pacto, quæ in Rheubarbari substantia reperitur, infirmum ergo argumentum eorum est.

Ad secundum cum dicitur, quòd dosis Rheubarbari in substantia cum sit minor, arguit quòd magis soluat, quàm ea, quæ in decocto est, quæ duplicatur.

Respondendo, ut in quarta positione, quòd ideo duplicamus dosim in infusione, quia non possumus elicere totam uim solutiua in Rheub.^o diluendo ipsum, nam si possemus, utiq; dosim eius non augeremus: sed quia inquit Gal. semper aliquid remanet in ipsa substantia diluta, quam si ter et quater decoquas magis in dilutū ipsum illā trāsferes. Id circo duplicamus dosim, ut suppleamus vicem illius portionis, quæ post dilutionem substantiæ medicamento relicta est, & sic non ualet argumentum ad uersariorum.

Ad Tertium cum probant Rheuⁱ substantiā ideo plus euacuare, quia maiorem moram trahens in stomacho, maius ocium euacuandi habet.

Respondendum quòd argumentum hoc reflecti potest contra ipsos, nam tarditas illa potius uidetur arguere debilitatem uirtutis solutiue, cum illa uirtus censenda fortior & ualentior in agendo sit, quæ citius suam perficit operationem uincendo reagens passum, & cito assimilians sibi ipsum; hinc solent Medici dicere Rheubarba-

rum,

rum; & Mannam tardæ operationis esse quoniam leues sunt medicinæ, leuius est igitur in substantia Rheubarbarum; atq; id, quoniam Rheub.^m in substantia propter suam crassitiem condensat poros, nec ita penetrat ad loca, unde fieri debet euacuatio, quod non contingit in infuso.

Ad quartum cum dicitur quod difficiliore ad euacuandum humores trahat in substantia.

Respondendum quod ideo dicitur euacuare difficiliore humores, non quia efficacius, sed quia lento modo, et sensim euacuat. Nam a forti medicamento propter lentorem humorum potius conuelleretur corpus quam educeretur humores. Nam & infusum etiam duceret crassos humores, si tam longo tempore retineretur in Stomacho, uel si humores obedirent euacuationi eius citæ, tarditas igitur illa in euacuando, & debilitas utriusque, facit ad faciliorem crassorum humorum educationem, nam lentus humor lento modo trahendus est, & sic aduersariorum ratio nulla est.

Ad Quintum, quod probabat plus ducere substantiam, quia fortioribus naturis dabatur, quam infusum,

Respondendum quod medicamenta aliqua licet sint debilia in euacuando, sunt tamen aliquando ualida in laedendo, exempli causa. Illud dicitur Medicamentum magis lædens alio, cum post operationem illius adhuc potest.

Q V A E S T. D V A E.

testē lādere corpus adherendo intestinis, & aliquam noxam inferendo, licet igitur Rheub.^m sit lenius quantum ad uim solutiūam, tamen quia non ita cito pertransit, ut infusum, sed diutius in corpore remanens aliquid medicamentosum relinquit, quod omnino lādit corpus; Et licet dicant isti, quod relinquit Rheub.^m uestigium stupefactionis, ac per hoc roboret naturam, tamen si credimus Gal. in lib. de optima secta. nullum medicamentum usq; adeo benignum est, ut aliquam noxam in se non habeat, datur ergo naturis debilibus infusum, ut minus noceat nihil noxæ relinquens, fortibus uero in substantia, quia possunt melius ferre noxas relictas à medicamentis.

Ad sextum quod corrupta integritate medicamenti corrumpitur & symetria, & forma illius.

Respondemus negando assumptū, quod infusio licet separet formas alias, non separat tamen indiuisibilem illam quæ resilit ex perfecta elementorum commixtione, alioquin perirēt multiplices modi exhibendi medicamenta; et tunc cogeremur omnia exhibere in substantia, præterea sequeretur, quod succi medicamentosi minoris efficaciae essent, quā ea, ex quibus educerentur, id quod uerè absurdum est.

Ad Septimum de Coloquintida, quæ infunditur tanquam lenius medicamentū in diluto, quā in substantia.

Respondendum ut superius, quod nō ideo Colocyn-

is exhibetur in diluto ab *Auicenna*, quòd minus soluat,
sed quia leuius idest nō tantam intestinis inferat noxam,
nam si in substantia datur, post solutionem etiam relin-
quit noxam abradendo intestina sua adherentia, & cor-
pulentia, nam aliud est plus soluere, aliud plus lædere.

Ad Octauum, quòd amaritudo fundetur in substā-
tia sicca ideo magis abstergat substantia.

Respondendum, quòd in diluto etiam est insignis
amaritudo, quæ cum sit in subiecto fluxiliori, aptior erit
ad abstergendum, & aperiendum non solum superficies,
sed internas etiam partes, ac per hoc maiorem faciet solu-
tionem, quoniam ut probatum est in decocto amaritudo
tollitur à substantia, ita ut remaneat omnino insipida, ut
patet experientia, & sic non ualet ratio eorum: Atq;
hæc sint, quæ ad primæ positionis argumenta dissoluen-
da sunt satis. Iam uerò ad alterius positionis deuenien-
tes eodem modo rationes refellere tentemus.

Ad primum cum dicitur, abstergit magis, ergo ape-
rit magis, quia abstergere, & aperire non differunt.

Respondeo, quòd amaritudo cuius proprium est ab-
stergere, & radere superficies corporum, reperitur etiā
in infuso *Rheubarbari*: quamobrem quantum spectat ad
operationem, amaritudo, quæ est in infuso, longe præstat;
nam ipsa non solum adhæret superficiei, sed etiam al-
tius penetrat, in substantia uerò tantum hæret orificijs,

nec simul tunicas uasorum abstergit, & aperit ut infusum, inualida igitur ratio illorum est, ut paulo ante dictum est.

Ad secundum in quo dicit de absinthio ex authoritate Auerrois, quod iuuat iuncta stipticitas donec suo fundæ fuerint aperiendi munere.

Respondemus, quod non est par ratio, nam Absinthium non habet tantam adstrictionem, quantam habet Rheub.^m in substantia, & propterea potest aliquo modo iuuare adhærendo superficiei, & retinendo uim aperiuiam, quousq; suo fungatur munere, qualem etiam leuē adstrictionem non auferimus nos à Rheubarbaro infuso, imò in illo est stipticitas aliqua leuis, quæ idem præstat, quod præstat leuis adstrictio in absinthio, & oleo rosaceo, quæ si esset intensior, & uinceret partes tenues, tunc nullo pacto penetraret, imò antequam partes tenues penetrarent, adstrictio illa intensa præuenteret astringendo, & occluderet (ut inquit Gal.) poros, ac nō modo regressum, sed ingressum illum prohiberet, atq; ita non est par ratio, neq; similitudo de Rheubarbaro, quod intense astringit; & male imaginantur isti, quod in infuso non sit aliqua adstrictio, quæ tanta est; quæ iuuat eo modo, quo dicit Gal. de rosaceo, & sic cessat argumentum illorum,

Ad tertium Auicennæ, qui dicit, quod si in aperiuiis

ius medicinis stipticitas, & subtilitas coniungatur erit melius &c.

Respondemus, quod uerba Auicennæ, in eo loco longè aliud uolunt, quàm id quod isti probare intendunt. Nam Auicenna in eo loco dans regulas in obstructionibus aperiendis obseruandas; inquit caue ne tu des nimium aperiencia, nam illa nimium resoluunt partes tenues, & quod reliquum est in lapidem uertunt, propterea si tu habes nimium resoluencia, & subtiliatiua, addenda sunt illis stiptica, ut remoueant à membro subtilitatis grauamen, quod est nimia resolutio, & apertio; ergo non uult Auic. hic ostendere, quod stipticitas iuncta cum subtilitate magis aperiat, imò totum oppositum, hoc est ut prohibeat grauamen hoc est noxam, quàm inferunt nimium attenuantia, & aperiencia, ut patet ex uerbis Auicennæ, quæ hæc sunt.

“ Cum ergo resolutio fortis est necessaria, succedat et
 “ lenificans subtile cum materia, in qua non sit grossities,
 “ sed sit in ea calor temperatus, qui uiuet in resoluendo to-
 “ tum illud, quod est oppilatiuum, & ex oppilationibus
 “ quidem peiores sunt oppilationes uenarum, & deterio-
 “ res eis sunt illæ, quæ in membris existunt principibus,
 “ ergo cum in aperitiuis stipticitas, & subtilitas cōgiungen-
 “ tur erit melius; quoniam stipticitas remouebit à mem-
 “ bro subtiliatiui grauamen.

E

Ad

*Ad Quartum de oleo rosaceo, quod magis ingredi-
tur poros quàm oleum simplex, ut dicit Gal.*

*Respondemus, quod iam solutum est hoc argumen-
tum, & diximus quod non est par ratio in adstrictione
Rheub.^m & olei rosacei; nec uerum est, quod penetra-
tio, quæ est in oleo rosaceo magis quàm in simplici oleo
sit merito adstrictionis rosæ; Nam illa potius impedit
dicit Gal. ad penetrandum, sed est ratione partium te-
nutum, quæ reperiuntur in rosa, quæ uincunt (ut dicit
Gal.) adstrictionem in rosaceo, nam si tenues partes uin-
cerentur nullo modo fieret penetratio olei. Præterea ut
diximus illa leuis adstrictio rosacei, quæ facti non ut pe-
netret, sed id, quod penetrauit, retineatur, reperitur etiã
in infuso Rheub.^m & propterea non solum Rheu.^m infu-
sum aperit penetrando, sed etiam ex leui adstrictione, quæ
in illo neganda non est, si credimus Galeno, qui dicit,
quod in aquam per decoctionem transfertur non solum
acredo, & salsedo, sed etiam acerbitas ipsa, ut in tertio
adnotandum diximus. Quare inutilis est hæc argumen-
tatio.*

*Ad Quintum ubi dicitur, quod in maiori obstructio-
ne nos damus in substantia, ut quando damus pilulas in
morbis chronicis.*

*Respondemus, quod iam solutum est argumentum,
cum declarauimus, quod ad obstructions ob materiam
crassam*

crassam, & lentam, utimur istis medicamentis solidis, et quæ diu retineantur in stomacho, non quòd ista medicamenta magis penetrent, sed quòd maiorem moram trahentia in stomacho lentius trahunt, ac humores lenti, & crassi, qui non ferunt uehementem, & citam solutionem, quia non sunt facile propter suum lentorem obsequiosi, lento modo trahantur, & non conuellantur, & ea est potissima causa, quare in cronicis morbis utimur pilulis; sic nihil facit ratio illorum aduersus nostram opinionem.

Ad Sextum cum dicis quod Rheubarbarum eo quod plus moretur in stomacho, maius octum habens plus aperiet.

Respondemus, quod tam solutum est argumentum, quòd scilicet (ut uerbis Conciliatoris utar) cum fortem habeat adstrictionem maiori sit futurum impedimento in apertione, semper magis astringendo, & occludendo poros præsertim angustos, et impediendo in eis et ingressum & regressum; Nam nescio quomodo imaginentur isti quòd Rheubarbarum constingat intestina, & cauitates maximas sua compressione manifesta, ac non etiam uenas, & arterias, & meatus alios tenuiores non astringat, leuis ergo est & ratio hæc

Ad Septimum de Euphorbio, & spica, quæ exhibentur insubstantia non in infusione.

Respondendum, quòd cum Euphorbium sit ex his, quæ sunt calida in quarto, et habeat propter caliditatem,

et tenuitatem partium facillimam Euaporationem, si daretur in infusione nimium aperiret, ac nimium resolveret partes tenues. Hoc etiam patet apud Mesue, qui in capite de Scamonea dicit, quòd non terendum, ne nimium exiccet, & penetret magis, sed in substantia ut possit abluī citius. Quare immineret periculum, quod superius adnotauimus ex Auicenna nimirum, quòd remanerent partes lapidosæ, & redditæ crassiores post nimiam resolutionem; substantia igitur exhibitum propter crassitiam, & partium soliditatem, non ita aperiens, & vires resolvens, atq; igitur ea ratione argumentum nullius est roboris. De spica. item primo negamus quod semper datur in substantia imò damus etiam, & frequentius infusam, quando scilicet uolumus maiorem apertionem. Cæterum cum corroborare magis intendimus, damus ipsam in substantia ut omnes docti practici communiter utuntur, & sic cessat ratio eorum.

Ad Octauum et ultimum ubi habetur quod in membris principalibus melius damus in substantia quam in infusione, eo quod uix aliquis morbus sit, in quo non lædatur aliquod principale membrum, debemus ergo illud corroborare.

Respondemus, quòd non ea est ratio Auicennæ, & Medicorum quam isti imaginantur, quare stiptica admiscenda sunt cum istis medicinis ut diximus, sed ut om-

nes uolunt Docti Medici, ut non relaxentur membra principalia, & dissoluantur eorum uires ab aperientibus, & relaxantibus. Hæc igitur ratio potius contra Aduersarios est, quàm contra nos. Rheubarbarum igitur in substantia longè minus aperit propter suam intensam astrictionem quàm infusum illius. Cuius rei si quis uile clarissimè certior fieri, legat apud Mesue caput de infusione in Theoremate secundo libri primi de Canonibus uniuersalibus, ubi quam absurda falsa & periculosa isti scribant, dilucide declarantur. Atq; hæc sunt quæ quàm breuissimè potui super his duobus quæ sitis asserre in præsentia libuit, nō ut aliquem læderem, sed ut ea, quæ sentimus, & docemus, non penitius a ratione aliena esse ostenderem, & nos à calumnijs pro uiribus defenderemus longiori uerò sermone, & pluribus rationibus id ipsum in nostris publicis lectionibus aliàs declarauimus. Cæterum opinionem hanc nostram ita mordicus retinere non est animus quin illam deponere, & aliam meliorem induere simus parati, si qui aliquando sint, qui id nobis firmitioribus rationibus persuadeant. Iterim tuas nos à multiplici experientia, et communi Doctissimorum Medicorum usu non recedere.

F I N I S.

Q V A E S T. D V A E.
E I V S D E M C A E S A R I S O D O N I

Quaestio brevis an in quouis Humore
euacuando expectanda sit coctio.



*V*M maxima uersetur lis inter nostri tem-
poris Medicos de exhibitioe medicinarum
in principijs morborum. Nam aliqui nullas
uolunt admitti Medicinas purgantes, seu soluentes in
principio, sed asseuerant in omnibus expectandam esse
coctionem. Alij rursus in omnibus morborum princi-
pijs statim credunt utilem futuram medicinam purgan-
tem, ut materiam minorem redant, nec desunt qui sint in-
ter hos medij, Nam aliquando dandum pharmacum cen-
sent, aliquando omnino abstincendum: opere precium no-
bis uisum est fore, si horum rationes quam breuissimè di-
fcutiamus, ut cui magis opinioni inherendum sit elicientes
meliozem & tuttozem medendi modum sequi ualeamus.

Primo igitur uidendum est de Bile, de qua inter alios
humores maior est lis, utrū si bilis, peccet, euacuāda sit, an
eius expectanda coctio sit, & primo asseremus authori-
tates, & rationes quibus, probari potest expectandam
coctionem esse. Secundo uerò proparte negatiua, mul-
tas etiam authoritates & rationes adducemus. Postre-
mo declaratis non nullis suppositis, opinionem nostram
aperiemus, & rationes in contrarium facientes pro ui-
ribus

ribus dissolvere tentabimus.

Primo autoritas est Hippocratis qua manifeste ut detur probari in omnibus expectandam esse coctionem præterquam in materia turgenti, iuxta illud prima Aphor. uigesimo secundo, Cœcocta medicari &c. Vbi clarissime uidetur tubere expectandam coctionem unicū tantū casum excipiendo nimirū in turgenti materia, quæ tamen rarissima est, ut plurimū ergo expectanda coctio.

Secunda autoritas est eiusdem Hipp. in prima Aphor. uigesimo quarto, In acutis passionibus raro, & in principijs medicinis purgantibus uti, & hoc cum præmeditatione faciendum; ex qua autoritate apparet, quòd idem uelit, quod in prima uolebat, nimirum quod in sola turgenti materia debet dari pharmacum, atq; illud itē non semper, sed cum præmeditatione faciendum, hoc est quod conditiones oēs obseruentur quas requirit purgatio.

Tertia autoritas est in quarta Aphor. uigesimo secundo in comento, ubi habet Galenus, quòd natura in principio non euacuat, sed post coctionem, nos autem debemus imitari naturam nec euacuare prius quàm coctio facta sit.

Quarta autoritas in secundo de symptomatum causis. Si bilis retinetur propter obstructionem, attenuanda: Si uero propter crassitiem incidenda, ergo nullo pacto euacuanda, nam aliud est attenuare & incidere, aliud est

est euacuare.

Quinta autoritas est Gal. quod primo de diff. febr. cap. quarto inquit quicquid corruptum est potest tempore spacio per coctionem ad benignum reduci, ergo si corruptum potest reduci ad benignum bilis etiam potest coqui, & reduci ad benignum ergo expectanda coctio eius ut ad benignum reducatur, priusquam euacuetur.

Sexta autoritas est item Gal. in arte medi. octuagesimo nono, qui dicit quod concoctio est alteratio quae finit putredinem manente substantia, ergo coctio conuenit bili etiam si corrupta esset, quia debemus, alterare quousque finiat per coctionem putredo in bile.

Septima autoritas est, quod centies habemus tum ab Hippocrate, tum a Galeno primo pronosticorum com. ultimo & secundo Aphor. com. decimo septimo, et trigesimo septimo, quod pus, excrementa, urina, bilis, modo dicitur cocta modo cruda ergo necessum est, quod coquantur, expectanda ergo coctio, etiam in bili.

Octaua autoritas Alexan. Tralliani in primo suo libro cap. decimo septimo qui iubet adhiberi lauacra, infusiones, & cibaria humedantia, ad humorem biliosum concoquendum ergo bilis concoquenda.

Nona autoritas Aristotelis, qui quarto Meteorum cap. secundo inquit, quod coctionis finis alijs est ipsa natura, alijs alia quaedam forma, ut in tuberculis pus, in lachrymis

lachrymis sordes, ex qua sententia habetur quòd aliud sit, quod coquatur præter alimentum, & aliud sit finis coctionis quàm assimilatio.

Decimo adhuc idem firmatur etiam rationibus, quia si in febre pestilentiali Rasis et alij Doctores, non dant pharmacum ad soluendum humorem, maximè uenenosum & prauum, sed dimittunt opus naturæ, ergo tanto minus licebit dari pharmacum pro bile, cum non sit tantæ prauitatis, nec de ea immineat tātum ex mora periculum.

Vndecimo si iubet Auicenna quarta primi cap. de Phlebotomia, & Gal. in libello de missione sanguinis cap. sexto, quod in missione sanguinis expectanda digestio quāto magis in dando pharmacum expectanda cum sanguis semper fere paratus sit ad sui euacuationem.

Duodecimo arguunt Omne pharmacum calefacit, quod habet uim attractiuam ut Gal. prima aphor. uigesimo quarto, ergo in humore calido, non est securum dare pharmaci nisi postquam refrigeratus est humor, hoc est post decimam quartam, ne calidum calido additum ut dicunt faciat furere.

Tertio decimo in principio si datur pharmacum cum humores nō sint separati, periculum est ne cum malo attrahatur etiam bonum et sic fiat noxa maior aegro, nō dandū igitur aliquo pacto pharmacum in principio, sed expectandum quousq; natura secreuerit a bono malum & ad

expulsionem illud præparauerit.

Pluribus etiam alijs rationibus hæc opinio posset cō
probari, sed hæc modo mihi ualidiores uisæ sunt, iam ad
oppositæ partis argumenta afferenda deueniamus & il-
la etiam per capita tantum attingamus ut breuitati quan-
tum possumus studentes ueritatem paucis inueniamus.

In Oppositum sunt & Authoritates, & rationes
hæc. Prima autoritas est Gal. in lib. de constitutione
artis medi. cap. decimo nono, qui inquit quod pituita a-
cida, et dulcis alteranda per coctionem, serosa uerò pi-
tuita, & utraq; biles euacuandæ, ergo biles non conco-
quuntur.

Secunda Authoritas est eiusdem in secundo de na-
turalibus facultatibus. insine ubi inquit, quod natura non facit
propriū receptaculū pituitæ propterea quod sola esset
coctionis capax, ergo cæteri non concoquuntur humores.

Tertia Authoritas itē est in secundo de ratione uic.
in acu. cap. trigesimo, cum inquit, quod pituita coquitur,
& in sanguinem facile conuertitur. utraq; uerò biles ne
quaquam coquuntur, quia amara ex superflue cocto sū san-
guine, atra uerò ex adusto, non ergo expectanda eius
coctio, sed statim euacuanda.

Quarta Authoritas ab eodem Galeno est, tertio,
prognost. qui expresse hæc habet uerba, humores tenues,
ut sæpe dictum est paratissimi sunt ad expulsionem, si er-

go paratissimi sunt, quid expectandum amplius non concoquendi igitur sed euacuandi: bilem autem tenuem esse humorem, nemo est, qui neget igitur &c.

Quinta authoritas eiusdem Galeni in libello quos et quando purgare oportet idem apertissimis declarat uerbis, nimirum, quod atra bilis, & pituita, & frigidi humores sint coquendi, calidi uero nequaquam.

Sexta authoritas quarto de ratione uict. com. trigesimo ubi habet Gal. biles non concoquantur, quia si coquerentur conuerterentur in sanguinem non ergo in his expectanda est coctio, ex quibus uerbis duo habentur primum quod bilis non coquitur, secundum, quod coctio est uersio in sanguinem.

Septima est undecimo methodi cap. octauo ubi iubet Gal. id quod corruptum est prius euacuari debere quod reliquum est ad exaclam si metriam reduci, sed cum super accensus est humor uel massa sanguinea in biliosum humorem, iam non potest ulteriorem coctionem recipere, ergo non expectanda coctio.

Octaua, Gal. dat pharmacum in primo, secundo, tertio, quarto die, in quarto de ratione uictus in acutis, ergo non uidetur sentire coctionem expectandam, quæ in primis diebus non uidetur posse contingere ergo.

Nona Hippocrates secunda par. ap. l. or. uigesimo nono & Gal. in com. iubet in principijs euacuandam ma-

teriae partem, ut scilicet natura reddita ualidior potentius agat in materiae residuum ergo non debemus expectare.

Decima ratione probatur, quia si tu quæris bilem, reddere aptiorem ad euacuationem, non debes coquere illam quia coctio procedit incrassando quod autem crassum est ineptius est ad expulsionem igitur non debet coqui.

Vndecima ratione id etiã probatur quia si quantitas cogit euacuare in principio, quanto magis & qualitas? quæ magis actiua est quam quantitas, primum patet ex Athletis, secundum patet, quia alteratio fit ratione qualitatum non quantitatum igitur &c.

Duodecima etiam ratione, si tu non euacuabis bilẽ in principio, ergo nunquam euacuabis, non enim in declinatione, quia ex se tunc natura facit, non in statu, quia in statu quietem habere oportet, non in augmento, quia est prope statum, ergo uel nullo modo, uel in principio.

Tertia decima ratio. est quia, si in morbis frigidis: ut apoplexia et huiusmodi licet in principio uti pharmaci ualidis, cum tamen humores sint crassi, et minus pharmaco obsequiosi quanto magis biliosi, & tenues faciliè parentes pharmacis, euacuabuntur, ergo &c.

Sed plures aliæ possent adductæ ad hoc ipsum probandum rationes, uerum hæc in præsentia sufficiant. Iam uerò

uerò ut huius quæstiei claram solutionem habeamus, consideranda nonnulla.

Primum est, quòd coctio non dicatur nisi de crudis ut manifestè declarat Gal. in libell., quos & quando purgare oportet. Nam quæ cocta sunt hoc est, quæ sanguinis caliditatem excesserunt, qui terminus est coctionis; coqui amplius non possunt, ut apparet manifestè ex argumentis secundo loco adductis, quod corroboratur etiam hoc ualidissimo fundamento Galeni in quarto de simp. med. sumpto à Platone in timeo, quòd saporibus dulces dicuntur temperati & benè cocti qui si intendantur in caliditate fiunt uel falsi, uel amari, uel acuti, qui amplius (quoniam dulcescere non possunt) coqui nequeunt coquuntur autem acerbis, acidi, et austeri, tantum. Atque ut de saporibus dictum est, idem intelligendum in humoribus, qui citra sanguinem, qui dulcis est, coqui possunt, post uerò sanguinem nequaquam, nam amarescunt, & acrescunt, quibus coctio nullo pacto conuenire potest.

Secundo considerandum, quòd coctio apud medicos & philosophos est tantum unius speciei hoc est respectu alimenti tantum, quòd si pus coctum uel urinam coctam, uel excrementa, uel biles aliquando dicimus non ratione ipsorum, id est quod ipsa coctionem recipere possint, sed ratione alimenti uel succi eis admixti, sanguinei, uel pituitosi in quem natura coquendo operata est assimilatio-

nem

nem tentatis pro nutrimento; quam si non est assequuta in substantia saltem in colore huiusmodi excrementa sibi assimilauit hinc dicimus modo in colore modo in substantia concoctam urinam, ut manifestè habetur ex Galeno in primo pronosticorum com. ultimo, & secunda aphor. decimo septimo, & trigesimo septimo.

Tertio adnotandum est, quod adnotat Gal. in quarta par. aphor. uigesimo primo & secundo com. quod differt humor biliosus à bile, et humor melancolicus ab atra bile. Nam in humoribus sunt quædam humiditates seu succi; qui sunt reducibiles ad benignum hoc est ad sanguinem, et illæ faciliè possunt coqui, licet humores sinceri, qui sunt supra sanguinem non concoquantur, Si qua ergo coctio humoribus conuenit, conueniet ratione istarum humiditatum uel succorum, quatenus sunt conuertibiles, & assimilabiles; hoc notandum potest manifestari ex eo quod semper in corpore nostro in massa sanguinea reperiuntur huiusmodi humiditates in humoribus, quæ benignitate caloris reducuntur ad benignum; & ad naturam sanguinis, ut possint nutrire corpus quam si excedant iam non humiditates, sed mera excrementa appellanda sunt, ut probatum est. Hinc est quod doctores applicare non solent medicamenta concoquentia tumoribus præter naturam præterquam inflammationi, quoniam sola inflammatio admixtum habeat sanguinem, ceteri tumores quoniam

niam ex sincerioribus humoribus sunt (ut Herisypelas
œdema, et scyrus) si ex sincerioribus humoribus sunt nō
concoquuntur, sed discutiuntur, uel alio modo curantur.

Ultimo etiam considerandum, quod in euacuatione
humorum non solum attendenda est natura ipsorum, sed
etiam locorum, per quæ debent euacuari facienda est
præparatio, & propterea in quolibet humore educen-
do sunt duæ conditiones perpetuò seruandæ. Prima ut
uiæ sint apertæ, & non obstructæ. Secunda ut humor
non sit crassus & viscidus, hinc est, quod tã frequenter
Galenus iubet uti attenuantibus, & incidentibus, nimirum
cum timet uel obstructionem uel humorum lictorem
& crassitiem; quæ quidem conditiones si obstant etiam
in ipsa materia turgente non licet euacuare nisi post sub-
latas obstructiones,

Ex quibus declaratis nostram sententiam explicemus
per has positiones, quæ erunt numero quatuor.

Prima Bilis amara, Bilis uisita, pituita serosa, &
& salsa euacuandæ sunt nulla expectata concoctione.

Secunda in morbis pendentibus à pituita, uel ab atra-
bile frigidis non tentanda euacuatio nisi post conco-
ctionem.

Tertia in nullis morbis tentanda euacuatio nisi uiæ sint
reseratae, & humores attenuati.

Quarta coctio est unius speciei apud medicos & phi-
losophos

Iosophos.

Probatio autem harum conclusionum patet ex consideratis, ideo iam ad soluenda argumenta pro prima parte aduēta accedamus.

Ad Primum cum tu dicis concocta medicari &c. Respondeo, quod concocta medicari oportet, quæ concoquibilia sunt, & Aphorismus nihil habet contra nostras positiones, nam nos concedimus cruda non medicanda esse, sed coquenda, nam credimus nos coctionem non dici debere, nisi de quodquibili.

Ad secundum incipientibus morbis Rarò, & in principio &c. Respondeo, quod ideo iubet Aphorismus quod raro incipiamus à medicamentis purgantibus, quia rarius id contingit, ex eo, quod cum sint quatuor in nostro corpore humores, qui continue peccantes morbos pariunt neq; sanguis purgandus medicamento est, sed per uenæ sectionem euacuandus si peccet, neq; pituita acida & dulcis, & crassa, neq; humor melancholicus, quia possunt coqui, neq; ipsa bilis semper, sed tantum cum uenæ sunt apertæ, & ipsa non lenta est, relinquitur, ergo quod raro debeat fieri euacuatio, id est cum cessant omnes hæ exceptiones, & hoc est, quod dixit cum præmeditatione faciendum, hoc est cum conditionibus obseruatis, non immerito ergo dicit Rarò.

Ad Tercium cum dicis, quod natura non euacuat in principio

in principio. Dico quòd non euacuat crudas, & crassas materias, sed expectat in his coctionem, eam ob causam Aphorismus loquitur de atra bile, quam nos concedimus non euacuari debere in principi, ocum tamen sæpe uideamus in principijs morborum biliosorum naturam excernere bilem modò per uomitum, modò per deiectiones nulla noxa in agris remanente.

Ad quartum cum dictis si bilis retinetur propter obstructionem est expectanda quousq; apertio fiat.

Concedo antecedens, nego autem consequentiam, quia potest retineri bilis tenuis nulla obstructione etiam existente in portis.

Ad quintum Galeni primo de differ. feb. cap. quarto quicquid corruptum est &c.

Respondeo, quòd dictio corruptum malè in græco uersa est, nam græcè habetur διαφθαρτον, quæ uox duo significat corruptum & uitiatum, nam non negamus nos, quod id quod corruptum est absolute possit aliquo pacto ad benignum reduci, sed dicimus, quod id quod mixtum est, & uitiatum, idest quod proximum est, ut corruptatur, illud est, quod potest reduci ad benignum, ut exacte declarat Gal. in fine primi pronosticorum & decimo septimo, & trigésimo septimo secundæ par. aphor. & in arte medici. cap. octuagesimo nono, cum dicitur, quòd coctio finit putredinem manentis substantiæ idest

G prohi

prohibet substantiam uitiatam mox corrumpendam putrefieri dū coquit natura, et assimilat sibi ^{duplex quatuor} hoc est uitiatum corrumpendum, & sic reducit ad benignum spatio temporis non corruptum, sed uitiatum.

Ad Sextum est eadem solutio, nam concoctio quæ est alteratio finiens putredinem intelligitur, quod finiat id est non per mittat id quod erat uitiatum aptum ad putrescendum amplius corrumpi, sed a coctione terminetur.

Ad Septimum Bilis Urina. Pus & cætera dicuntur cocta. Huic dubitationi respondet longo sermone Gale. in secundo de ratione uict. quadragesimo quarto ubi docet, quod coctio propria dicatur de alimento, & aliquando generaliori uocabulo dicatur de huiusmodi excrementis, non quidem ut ipsa coquantur, sed quia ex ipsis habeamus coctionis naturæ inditia, & cruditatis, quod etiam declarat Gale. in ultimis uerbis com. ultimi primi lib. pronosticorum. Cum ergo dictur pus coctum album & æquale significatur ex albedine, & ex eo quod non male oleat, quod natura de albauerit partes illas quæ erant concoquibiles non potuit tamē assequi ueram assimilationem substantiæ, In urina item sed imentum album indicat quod nutrimentum mixtum in massa sanguinis & elicium per urinam, fuit à natura per coctionem alteratum in colore, licet in substantia non potuerit exacte sibi assimilare hinc est, quod
in urinis

In urinis eorum qui sunt exacte sani pauca apparent nebulae, quoniam omnia ferè assimilantur, & conuertuntur in substantiam nutriti.

Ad Octauum Tralliant, quod humor biliosus concoquendus.

Respondemus, quod magna est differentia ut declaratum est in adnotandis inter humorem biliosum & bilem, & dicimus nos, quod bilis non est concoquenda, humor uero biliosus ratione admixtionis succi, & humiditatis, quæ ad naturam sanguinis facile potest reduci, est concoquendus ratione cuius rectè applicat Trallianus lauacra &c.

Ad Nonum Aristotelis, qui dicit, quod coctionis duplex est finis alius a natura alius à causa præter naturam.

Respondeo ex sententia Gale. & Aristotelis eiusdem, quod pura excrementa per se coctionem separatam non suscipiunt, aut per se euincuntur, sed indicant euictos iam esse intus humores, & propterea statim subiungit Aristot. Urinæ alui sedimena, & excrementa sanitatis sunt inditia, & cocta ideo dicuntur, quod à calore uinci significant.

Responde item de fine, quod finis uerus, & unicus naturæ est assimilatio. Sed quia aliquando in pure & alijs fluxionibus non sola natura agit sed etiam alia cau-

Q V A E S T. D V A R.

sa præter naturam, hinc est, quòd sint accide compositus partim à natura assimilante partim à causa corruptente.

Ad Decimum respondetur, quòd non est uerum simpliciter, quod in febre pestilentiali non euacuemus, sed est uerum ut in pluribus, nam ut in pluribus ab initio concidunt uires quæ prohibent euacuationes. Ceterum si in principio uires sint ualidæ, licet & sanguinem mittere, & Pharmachum exhibere, quod admixtum habeat antidotum aliquam, quæ ueneno occurrat, ut est in communi usu apud optimos medicos, nam si euacuationes in principio dimittantur uix aliqui euadunt, ideo argumentum nullum erit istorum.

Ad Undecimum de Phlebotomia in qua iubent expectandam coctionem facilis est responsio, ex Galeno desumpta in libell. de missione cap. sexto ubi dicit, quòd etiam stante plenitudine non possumus mittere sanguinem neq; euacuare cum sunt obstructi meatus, quod nos non negamus, in aliis enim casibus falsum esset, quod dicit Auicenna de mittendo sanguine.

*Ad Duodecimum de calefactione pharmaci, quod augeat febrem bifariam respondeo. Primo ut respondet Auerr. quòd possum ad miscere medicamenta frigida, quæ retundunt caliditatem Pharmaci. Vel tutius & melius dico, quòd matus est iuuamentum ex Pharmaco
calido*


calido quàm noxa quæ sequitur, quæ post euacuationem humoris prauis facile remittetur.


Ad Tertium decimum, & ultimum, cum dicitur, quod cum malo euacuabitur bonus humor, si detur pharmacum in principio, quia mixtus est, cum bono prauus humor. Resp. quod bilis pro ut bilis est, semper est separata à natura; Præterea pharmacum quod bilem respicit, non ducit alium humorem nisi bilem, quod si supponis illam mixtam, iam responsum est, quod concoquenda ratione humoris, qui ad benignum reduci possit, propter admisionem sui ipsius, qui tantum coquitur non bilis. Atq; hæc mihi per capita, et quàm breuissimè dicta sint pro quæstionis huius declaratione, de qua longè Fustus in scholis aliis sermonem habuimus.

F I N I S.



Ego Fra. Vincentius Spargianus Eononienfis Vicarius
Reuerendi Inquisitoris concedo hunc
Librum Imprimi.







S. N. IV. 3

